Mat. med. 1107m



ADALBERTI VINCENTII
ZARDA
AA. LL. PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ
DOCTORIS

PHARMACA
VEGETABILIA
JUXTA
PHARMACOPOEAM
AUSTRIACO PROVINCIALEM.

PRAGÆ,
Apud Wolfgangum Gerle 1782.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

PRÆFATIO.

Cum cognitio Pharmacorum vegetabilium basim sternat Materiæ Medicæ, atque hæc ultima Medici sit desideratum: hinc Pharmaca Vegetabilia juxta Pharmacopœam Aust. Provincialem ordine Systematico pertractare malui; idque præprimis: quoniam novi plurimos Studentium deficere aut Ill. Linnæi Systemate aut Celebratissima Bergii & Murray Materia Medica.

Superest vero, ut tenuibus & invalidis ingenii mei viribus veniam flagitem. Non enim Eruditis, sed Erudiendis hocce opusculum decrevi, & hi si emolumenti, aut utilitatis quid ceperint, gaudebo.

CLAS-

CLASSIS I.

MONANDRIA
ORDO
MONOGYNIA.

AMOMUM ZINGIBER. L.

Zingiber. Ph. Imber, Ingwer. Zázwor.

Amomum. Corolla 4 — fida: lacinia prima patente.

A. Zingiber. Scapo nudo, ſpica ovata.

Exoticum. Perennans.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Fruſta radicis circiter bipollicaria, ramoſa, ſubdichotoma, utrinque compreſſa, nodoſo maniliformia, leviuſcula, pallide cinerea: nodis ovatis. *Parencyma* albidum, ſubreſinoſum; tranſverſaliter ſectum æquale, variegatum maculis luteſcentibus; ad nodos fragile: fractura filamentoſa.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* fragrans. *Sapor* acris, pungens, fervidus, aromaticus, linguæ inhærens, Radix ſiccata recente paullo fortior.

PRÆPARATA. (*a*)

COMPOSITA. Aqua Embryonis.

Electuarium Diascordii. — Elect. seu Theriaca Andromachi, hoc pro spiritu Theriacali, & hic pro Spiritu Diatricon.

Pulvis specierum Aromaticarum pro morsulis Imperatoris. — Vitæ.

AMOMUM CARDAMOMUM. L.

Cardamomum minus. Ph. Kardamömlein. Kardamomum menssj.

A. Cardamomum. Scapo simplicissimo brevissimo, bracteis alternis laxis.

Exotico — Perenne.

Off. Semen.

FORMA. *Capsula* turbinato — subrotunda, unguicularis, vel oblonga, subpollicaris, triquetra, obtusa (sæpe cum acumine), undique striata, pallida, trilocularis, dissepimentis membranaceis. *Semina* plurima, compacta, angulata, rufescentia. *Parencyma* album, submucilaginosum.

PROPRIETAS. *Odor* gratus, aromaticus. *Sapor* aromaticus, subcamphoratus, dein subnitrosus. *Masticata* comminuuntur semina, corticali parte inter dentes subcrepula.

COM-

a) Olim Radix condita.

COMPOSITA. Electuarium, seu Theriaca Andromachi.

Emplastrum de Meliloto.

Pulvis specierum Aromaticarum pro morsulis Imperatoris. — Vitæ.

AMOMUM GRANA PARADISI. L.

Paradisi Grana. Ph. Große Kardamomen, Paradeiskerner. Rágská Zrna.

A. Grana Paradisi. Scapo ramoso brevissimo. Exotico — Perenne.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* brunea, turbinata, angulata, truncata, rugosa, lucidiuscula, magnitudine seminis Raphani, *parencymate* niveo subfarinoso.

PROPRIETAS. *Odor* aromaticus. *Sapor* aromaticus, calidus, pungens, inhærens: *masticata* hæc grana comminuuntur, pungunt in lingua, & faucibus, cum calore, Piperis instar.

COMPOS. Aqua seu Balsamum Embryonis.

Spiritus Aromaticus.

MARANTA GALANGA. L.

Galanga. Ph. Galgant. Balkán.

Maranta. Corolla ringens, 5 — fida; laciniis 2 alternis patentibus.

M. Galanga. Culmo ſimplici, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc. Radix* teres, ramoſa, craſſitie digiti vel ultra, rufeſcens, annulis parallelis elevatis undique cincta; *Parencymate* cinereo — rufeſcente, ſolido.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* aromaticus, minus gratus. *Sapor* ſubacris, leviter aromaticus dein fervidiuſculus, inhærens.

COMPOSITA. Aqua Embryonis. — Hyſterica fœtida.

Elixir Vitrioli.

Eſſentia Carminativa.

Pulvis ſpecierum Aromaticarum pro morſulis Imperatoris.

CURCUMA LONGA. L. (*a*)

Curcuma. Ph. Gilbwurz. Galgant.

Curcuma. Stamina 4 ſterilia, quinto fertili.

C. Longa. Foliis lanceolato — ovatis; nervis lateralibus rariſſimis.

C. Rotunda. Foliis lanceolatis : nervis lateralibus numeroſiſſimis.

Exotica. Perennis. Off.

a) Teſte Vindobonenſium Jacquinio Autopta una eademque planta utramque largitur Curcumæ radicem & longam, & rotundam.

Off. Radix.

FORMA. *Siccatæ* radicis binæ varietates in pharmacopoliis occurrunt, longa ſcilicet, & rotunda, quæ commixtæ ſunt. Utraque dura, lutea, annulis parallelis cincta; *longa* cylindrica, digitalis; *rotunda* ovata, utrinque acutiuſcula, pollicaris, ſæpe magnitudine Pyri fructus. *Parencymate* luteo rubicundo, facie gummoſa, ſplendente; tranſverſaliter ſecto centro medullari orbiculato, diſco æquali.

PROPRIETAS. *Odor* unguentaceus. *Sapor* ſubamaricans, ſubcalidiuſculus, debiliter aromaticus. *Maſticata* radix comminuitur, emollitur, fere ſolvitur, ſalivam croceo colore tingens.

COMPOSITA. Emplaſtrum Malacticum.
Unguentum Altheæ.

KÆMPHERIA ROTUNDA. L. (*a*)

Zedoarica. Ph. Zitwerwurzel. Cycwar.

Kæmpheria. *Corolla* 6 — partita: laciniis tribus majoribus patulis, unica bipartita, *Stigma* bilamellatum.

K. Rotunda. Foliis lanceolatis petiolatis.

Exotica, Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Cinerea, cylindrica, craſſitie di-

a) Bergio Amomum ſcapo nudo, ſpica laxa truncata. Author poſſidet plantam; hinc mirum quod Pharmacopeæ Svecicæ editio altera emendata Kæmpheriam retinuerit,

digiti minoris, ſubtoruloſa. In officinis ſæpe occurrit tranſverſaliter ſecta, unde fruſta orbicula-ta.

Proprietas. *Sicc. Odor* graviuſculus, ſubzingiberinus. *Sapor* aromaticus, fere Roſmarini, amaricans, calidus.

Composita. Aqua Cinnamomi vinoſa. — Embryonis. — Hyſterica Fœtida. Theriacalis.

Eſſentia Abſinthii compoſita. — Carminativa.

Pulvis Vitæ.

Syrupus Emeticus.

CLASSIS II.

DIANDRIA
ORDO
MONOGYNIA.

OLEA EUROPEA. L.

Olea. Ph. Oelbaum. Olſwa prawá.

Olea. Corolla. 4 — fida : laciniis ſubovatis. *Drupa* monoſperma.

O. Europea. foliis lanceolatis.

Exotica. Arborea.

Off. Oleum (olivarum vulgo) preſſum ex fructu.

Forma. *Drupa* exquiſite ovalis, utrinque obtuſo rotundata, magnitudine glandis Quercus, glabra, virideſcens. *Nux* ovali oblonga, rugoſa, utrinque acutiuſcula, ſulcis longitudinalibus, & rugis ſcabrida, cineraſcens. *Nucleus* albus, compreſſus, obvelatus tunica virideſcenti venis albis reticulata, intra teſtam craſſam oſſeam.

Proprietas. *Fructus* recens immaturus valde acerbus, ſalſugine vero conditus aſſuetis ſapidus. *Oleum* expreſſum blandum, album vel ſubflavum *odore* vix ullo, *ſapore* miti. Ætate ran-

ceſ-

eſſit, atque acre fit. Reſpectu gradus rancoris. Cicius ranceſcit, ſi in loco calido ſervetur, vel in balneo digeratur. Oleum olivarum ſi genuinum, frigoris impatiens eſt, atque id cogitur ad gradum circiter duodecimum ſupra punctum congelationis in Thermometro Suecico; hinc quoque diutius ſe conſervat abſque rancore; illud vero oleum olivarum quod non cogitur niſi circa punctum congelationis aquæ, rancidum eſt.

PRÆPARATA. Oleum Philoſophorum.

COMPOSITA. Balſamum Sulphuris Rulandi. Ex hoc adhuc Aniſatum, & Terebinthinatum.

Cerata pro cereolis in quantum recipiunt Emplaſtra Diachylon cum gummatibus, aut de cicuta ſimplex.

Emplaſtrum Album coctum. — de Cicuta compoſitum & ſimplex. — Diabotanon. — Diachylon ſimplex & cum gummatibus. — Diapompolygos. — de Labdano. — de Minio. — Noricum. — Saponatum. — Veſicatorium.

Olea cocta ſive infuſa. *Compoſita.* Oleum colocinthidis compoſitum ſive Habacucinum vulgo dictum. — Hyperici. — Viride

Sim-

Simplicia. *Herb*. Abſinthii. — Anagalidis. — Anethi. — Hyoſciami. — Florum chamomille — Liliorum alborum. — Verbaſci.

Fruct. Momordicæ. Scorpionum.

Sapo Venetus.

Unguentum Baſilicum. — Diapompolygos. — Fuſcum. — Lithargyrii ſive Nitratum.

VERONICA OFFICINALIS. L.

Veronica. Ph. Ehrenpreis. Weronyka.

Veronica. *Corolla* limbo 4 — partito: lacinia infima anguſtiore. *Capſula* bilocularis.

V. *Officinalis*. Spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA *Rec*. *Caulis* ſpithamæus, procumbens, filiformis, teres, ſimplex, pubeſcens, geniculatus. *Folia* ad genicula oppoſita, ſubſeſſilia, pubeſcentia, ſerrata, policaria, dilute viridia, concaviuſcula, patentia; inferiora cuneiformia; ſuperiora ovali — oblonga, obtuſa, paulo majora, remotiora.

PROPRIETAS. *Rec*. *Odor* debilis. *Sapor* amaricans. *Sicc*. odor nullus. *Sapor* amaricans, ſubadſtringens.

PRÆ-

PRÆPARATA. Conſerva.

COMPOSITA. *Herb.* Pulvis Vitæ.
Species pro Thee Germanico.
Conſerv. Electuarium Pectorale.

VERONICA BECCABUNGA. L.

Beccabunga. Ph. Bachbungen, Waſſerbungen. Potočnjk.

V. Beccabunga. Racemis lateralibus, fol. ovatis planis, caule repente.

Indigena. Perennis.

Off. Herba virens.

FORMA. *Caulis* repens, cylindricus, teres, glaber, ſucculentus, ſpithamæus, vel ultra, ſimplex vel ſubramoſus: *ramis* oppoſitis, brevibus. *Folia* oppoſita, ſubcarnoſa breviter petiolata, ovato — oblonga, obtuſa, ſerrata, dilute viridia utrinque glabra, punctata pollicaria vel ultra, patentia. *Petioli* breves, concavi, baſi amplexicauli connati.

PROPRIETAS. *Odor rec.* foliorum contuſorum debilis. *Sapor* amaricans, ſtypticus, acriuſculus. *Maſticata* folia tenera, ſapore naſturtii obſcure imbuta, adſtrinctionem ſtypticam in ore relinquentia, ſatis diu inhærentem. Caules maſticati foliis congruunt.

GRATIOLA OFFICINALIS. L. (*a*)

Gratiola. Ph. Wildaurin. Konj trud.

a) Deſiderata in Pharmacopea noſtra hæc planta, recenſetur, quoniam uſus ejus eſt in præceptis chirurgicis.

Gratiola. Corolla irregularis, reſupinata. *Stamina* 2 ſterilia. *Capſula*, 2 — locularis. *Cal.* 7 — phyllus: 2 exterioribus patulis.

G. Officinalis. Foliis lanceolatis ſerratis, floribus pedunculatis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix. Herba.

FORMA. *rec. Radix* cylindrica, alba, geniculata, oblique horizontalis, inſtructa fibris filiformibus, deſcendentibus. *Caulis* ſpithamæus, erectus, glaber, ſubramoſus, teres, geniculatus; internodiis alternatim oppoſite canaliculatis. *Folia* adgenicula, alternatim oppoſita, internodiis longiora, ſeſſilia, lanceolata, obtuſa, glabra, margine ſuperne utrinque ſerrata, inferiora minora, integerrima, ovali — oblonga, apice revoluta; ſuperiora ſenſim majora, carinata.

PROPRIETAS. *recent. Odor* nullus. *Sapor* intenſius amarus, ingratus, inhærens. *Sicc.* conſimilis.

PRÆPARATA. Extractum.

* VERBENA OFFICINALIS. L.

Verbena. Ph. Eiſenkraut. Wrbynka.

Verbena. Cor. infundibulif. ſubæqualis, curva. *Calycis* unico dente truncato. *Semina* 2. ſ. 4. nuda. (ſtam. 2. ſ. 4.)

V. Officinalis. Tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, fol. multifido — laciniatis, caule ſolitario.

Indigena. Annua. Off.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* rectus, brachiatus, cubitalis, quadrangularis, lineatus. *Folia* patentia, rugosa, pleraque tripartita, lateralibus lobis minoribus, medio longiori, nonnunquam tripartito: ora profunde dentata, pene semipinnata; suprema folia simplicia sunt & ovata.

PROPRIETAS. Inodora & fere insipida.

ROSMARINUS OFFICINALIS. L.

Rosmarinus Hortensis. Ph. Roßmarin, Rosmaryn.

Rosmarinus. Corolla inæqualis, labio superiore bipartito. *Filamenta* longa, curva, simplicia cum dente.

Hortensis. Frutex.

Off. Folia. Flores cum calycibus, atque summitates.

FORMA. *rec. Folia* opposita breviter petiolata, linearia, obtusa, pollicaria, supra dilute viridia, rugosa, scabra, lucidiuscula, subtus pariter rugosa, albido — tomentosa, patentia, internodiis longiora. *Carymbuli* florum in ramulis terminales, breves, simplices, vix foliis longiores, erecti, minutim tomentosi, nudiusculi. *Bracteæ* ovatæ, acutiusculæ, concavæ ad pedicellos solitariæ, extus tomentosæ, intus glabræ, pedicellis breviores. CAL. *Perianth.* breviter tubulatum, tomentosum, bilabiatum: labiis subæqualibus, emarginatis

natis; ſuperiore paullo breviore. COROLLA monopetala, dilute violacea. *Tubus* longitudine calycis, poſtice gibbus. *Limbus* ringens; labium ſuperius oblongum, bifidum, erectum, margine utrinque revoluto; inferius trifidum, patens: laciniis lateralibus ovatis, obtuſis, margine revolutis; intermedia duplo majore, pateriformi, concava, obtuſo — rotundata margine minutiſſime crenato. STAM. *Filamenta* 2. ſubulata, fauci corollæ inſerta, adſcendentia, longitudine corollæ; ſingula poſtice notata denticulo recurvo. *Antheræ* lineares, incumbentes. PISTILL. *Germen* quadripartitum, viride obtuſum. *Styllus* ſubulatus, violaceus, corolla longior, recurvatus. Stigma acutum, bifidum: mucrone ſuperiore breviore.

PROPRIETAS. *recent*. *Odor* fragrans, gratus, cephalicus. *Sapor* odori conformis, aromaticus, calidus.

PRÆPARATA. *Fl. cum calycibus*. Spiritus Roſmarini ſive Aqua Reginæ Hungariæ.

Fol. Aqua deſtillata.

Conſerva.

Oleum deſtillatum.

COMPOSITA. *Fol.* Aqua vulneraria cum vino.

Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Pulvis Specierum pro Cucupha. — Sternutatorius variegatus.

Spe-

Species cephalicæ reſolventes pro fomentatione.
Spiritus Balſamicus, vulgo Balſamum Schauerianum.
Unguentum Nervinum.

Summit. Acetum Antiſepticum ſeu Cardiacum.

Ol. Balſamum Apoplecticum. — Saxonicum.

SALVIA OFFICINALIS. L.

Salvia. Ph. Salwey, Salver. Sſalwég.

Salvia. *Corolla* inæqualis. *Filamenta* tranſverſe pedicello affixa.

S. Officinalis. Foliis lanceolato — ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis calycibus acutis.

Hortenſis. Suffruticoſa.

Off. Folia.

FORMA. *Folia* oppoſita, petiolata, ovali oblonga, obtuſa, pollicaria, utrinque minutim villoſa, ſupra rugoſa: rugis convexiuſculis; ſubtus reticulatim lacunuloſa, margine crenulata, patentia; ſumma brevius petiolata, ſæpe ſeſſilia. *Petioli* teretes, villoſi, ſupra canaliculati, foliis breviores.

PROPRIETAS. *rec.* *Odor* fragrans, validus, graviuſculus. *Sapor* amaricans, calidus, aromaticus. *Sicc.* conſimilis.

PRÆ-

Præparata. Aqua ſimplex. Oleum æthereum. (*a*) Conſerva, Syrupus (*b*)

Composita. *Herb.* Aqua vel Balſamum Embryonis. — Vulneraria cum aceto & vino.

Elixirium Vitrioli.

Pulvis Specierum pro Cucupha. — Vitæ.

Species pro Thee Germanico. — Decocti pro gargariſmate adſtringente.

Herb. Ungmentum Nervinum.

Summit. Acetum Anticepticum.

Aq. Tinctura Laccæ.

Ol. Balſamum Saxonicum.

ORDO

TRIGINIA.

PIPER NIGRUM. L.

Piper rotundum. Ph. Schwarzer Pfeffer. Czerný pepř.

Piper. *Cal.* o. *Cor.* o Bacca monoſperma.

a) Quoniam cum ceteris componit Balſamum Saxonicum.
b) Juxta Præcepta chyrurgica.

P. Nigrum. Foliis ovatis ſubſeptem nerviis glabris, petiolatis, ſimpliciſſimis.

Exoticum. Frutex.

Off. Fructus.

FORMA. *Sicc. Semina* ſemimatura, ſphærica, nigricantia, rugoſa, magnitudine fere ſeminis minoris Piſi. *Parencymate* albido.

PROPRIETAS. *Odor* aromaticus, validior. *Sapor* fervidus, acris, inhærens. *Maſticata* ſemina comminuntur, ferventque in ore & faucibus.

COMPOSITA. Electuarium, ſeu Theriaca Andromachi.

PIPER LONGUM. L.

Piper Longum. Ph. Langer Pfeffer, Dlauhý pepř.

P. Longum. Foliis cordatis petiolatis ſeſſilibuſque.

Exoticum. Frutex.

Off. Fructus.

FORMA. *Amentum* frutiferum, integrum, ſemimaturum, pollicare vel ultra, cylindricum, obtuſum, ſeminibus undique tuberculatum.

PROPRIETAS. *Sicc.* & ut apud nos obvenit. odore & ſapore debilior præcedenti. (*a*)

COMPOSITA. Electuarium Diaſcordii. Elect. ſeu Theriaca Andromachi.

Pi-

a) *Si* Piper longum in officinis Pharmaceuphticis Sueciæ occurrens communiter ſitu debilitatum ſit, juxta Bergium, quid noſtrum erit?

Piper caudatum. L. *Phar. Suecicæ.*
Cubebæ. Ph. Cubeben, Schwindelkerner. Kubeby. (*a*)
Exoticum.

Off. Fructus.

Forma. *Baccæ* ſubrotundæ, magnitudine ſeminis minoris Piſi, fuſcæ, pedunculatæ, venis elevatis undique reticulatæ, vix acutiuſculæ; *parencimate* ex nucleo albido, ſuboleoſo.

Proprietas. *Odor* fragrans. *Sapor* aromaticus, acris, fervidus (ſed Pipere nigro debilior) Maſticatæ comminuuntur, calent in ore, & faucibus, ſalivam alliciunt. Nucleus corticali parte longe acrior.

Composita: Aqua Embryonis.
Elixirium Vitrioli.
Pulvis Specierum Hieræ Picræ. — Sternutatorius viridis. — Vitæ.
Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.

(*a*) Hujus characterem ſpecificum in Ill. LINNÆI Syſtemate invenire non datur nec in recentiſſima ejuſdem editione per REICHARD;

CLASSIS III.

TRIANDRIA
ORDO
MONOGYNIA.

VALERIANA OFFICINALIS. L.

Valeriana vulgaris. Ph. Gemeiner Baldrian. Kozljk obecný.

Valeriana. Cal. o. *Cor.* 1 — petala, baſi hinc gibba, ſupera. Sem. 1.

V. Officinalis. Floribus triandris, foliis omnibus pinnatis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix. Herba. (*a*)

FORMA. *Rec. Radix* alba, trunco cylindrico, cincta geniculis annulatis, ſubciliatis, gemmiferis, apice ſoluta in fibras filiformes, teretes, deſcendentes, albas. *Stolones* ſub terra repentes, ex apice radicis intra fibras exeuntes, albi, filiformi — teretes, geniculati: geniculis inſtructis ſquammis ovatis, acutis ſolitariis. *Parencyma* trunci radicis ſubcarnoſum, album, tranſverſaliter ſectum centro medullari ampliſſimo, margine undulato.

PROPRIETAS. *Recentis radic. Odor*, fragrans gra-

a) Saltem oleum viride recipit. herbam cum radice.

graveolens, fœtidus. *Sapor* ſubduleſcenti — amaricans, gravis. *Siccatæ* rad. odor & ſapor fere intenſiores. *Maſticata* radix comminuitur.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. *Herb.* & *Rad.* Oleum viride.
Pulvis contra vermes, & ex hoc Trochiſci contra vermes.

VALERIANA PHU. L.

Phu. Valeriana Major. Ph. Groſser Baldrian. Kozljk wétřjj.

V. Phu. Floribus triandris, foliis caulinis pinnatis; radicalibus indiviſis.

Hortenſis. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix* craſſa, horizontaliter repens, fibris deſcendentibus extus coloris ſubbruni, interne albidi, vel virideſcentis.

PROPRIETAS. Præcedenti amarior, odore fœtidiore.

COMPOSITA. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

VALERIANA CELTICA. L.

Spica Celtica. Ph. Celtiſcher Nardus. Celtycký Nardus.

V. Celtica. Foliis triandris: foliis ovato — oblongis obtuſis integerrimis.

Indigena. Perennis.

Off.

Off. Radix.

Forma. *Sicc. Radix* cylindrica, craſſitie pennæ anſerinæ, undique involuta ſquamis membranaceis, lineari oblogis, carinatis, glabris, laxinſculis; inferne obliqua, fibriloſa.

Proprietas. *Odor* fragrans, fortis, graviuſculus, præcedentium odore gravior. *Sapor* aromaticus, amaricans, ſatis gratus.

Composita. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Pulvis Specierum Hieræ Picræ.

Tamarindus indica. L.

Tamarindus. Ph. **Tamarinden. Tamaryndy, Indyánſké daktyle.**

Tamarindus. Cal. 4 — partitus. *Petala* 3. *Nectarium* ſetis 2. brevioribus ſub filamentis. Legumen pulpoſum.

Exotica. Arbor.

Off. Fructus.

Forma. *Legumen* digitale, oblongum, compreſſum, ad ſemina toruloſum, læviuſculum. extus ferrugineo— cineraſcens, nebuloſum: punctis planis, ſquamoſis, quibus undique adſperſum; bilamellatum. *Pulpa* inter lamellas ligamentoſa; ſubuniloculare, ſubtriſpermum. *Semina* magna, ſubtetragona, cortice cartilagineo brunneo, nitido, nucleo albo; ſingula obvoluta aril-

arillo proprio tenuiore. Fructus Tamarindorum, ubi ad nos apportatur, ſemper contuſus eſt, ſeparatis lamellis leguminis, unde pulpam nigram & ſicciorem refert, ſeminibus mixtis.

PROPRIETAS. *Odor* ſubvinoſus. *Sapor* intenſius acidus, gratus.

PRÆPARATA. Pulpa.

COMPOSITA. Electuarium Lenitivum ſeu Tamarindorum.

CROCUS SATIVUS. L.

Crocus. Ph. Safran. Sſaffrán.

Crocus. *Cor.* 6 — partita, æqualis. *Stygmata* convoluta.

C. Sativus. Spata univalvi, corolla tubo longiſſimo.

Parce indigemus. Perennis. Auſtriacus nobis præſtantiſſimus.

Off. Floris ſtilus.

FORMA. *Rec. Stigmata* tria pollicaria filiformi — cuneiformia, inferne attenuta, lutea, in ſtylum deſinentia, ſuperne ſenſim incraſſata, ſaturate rubra, apice truncata, crenata: crenis albido — luteſcentibus.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* fragrans, ſimilis alcali volatili urinoſo mediocriter aromatico. *Sapor* aromaticus, ſubamaricans. *Maſticatus* tenaciuſculus, emolleſcit, ſaliva rubro — lutea, ſaturate tincta. Tritu contumax. PRÆ-

PRÆPARATA. Eſſentia.
Extractum.
COMPOSITA. Bacilli Liquiritiæ.
Electuarium, ſeu Theriaca Andromachi.
Emplaſtrum de Galbano Crocatum.
— Oxicroceum.
Eſſentia Anodina, ſeu Laudanum liquidum Sydenhami.
Oleum Hyperici.
Pilulæ Balſamicæ Mortoni. — Ruſſi.
— de Stirace.
Pulvis infantum abſorbens. — Specierum Confectionis Hyacinthinæ. — Specierum Hieræ Picræ. — ad Tuſſim.
Syrupus Emeticus. — de Liquiritia, ſeu Diacodii crocatus.

IRIS FLORENTINA. L.

Iris Florentina. Ph. Veigelwurz. Fialowý kořen.

Iris. Cor. 6 — partita: Petalis alternis reflexis. *Stigmata* petaliformia.

I. Florentina. Corollis barbatis, caule foliis altiore ſubbifloro, floribus ſeſſilibus.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix* tuberoſa, oblonga, craſſitie

ſitie digiti vel ultra, compreſſiuſcula, luteſcenti — rubicunda, ſubtus fibrilloſa. In officinis occurrit ſiccata, decorticata, undique ſciſſa, alba, ponderoſa.

Proprietas. *Recens* acris. Sapore acri, inhærente. *Siccata* leviter amaricans, *maſticata* tandem ſubacris; *odore* grato, violaceo.

Composita, Bacilli Liquiritiæ.

Electuarium, ſeu Theriaca Andromachi.

Emplaſtrum Diabotanon. — Diachylon cum gummatibus. — de Meliloto.

Hydromel Infantum.

Pulvis dentifricius albus. — Specierum pro Cucupha. — Specierum Diaireos. — Sternutatorius variegatus. — Sternutatorius viridis. — ad Tuſſim.

Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.

Trochiſci Bechici albi & nigri.

* Iris germanica. L.

Iris noſtras. Ph. Blauſchwertel. Koſatec.

I. Germanica. Corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis.

Indigena. Perennis.

Off.

Off. Radix recens.

Forma. *Rec. Radix* tuberosa, horizontalis subarticulata: articulis obovato — oblongis, obtusis, transversaliter sulcatis, læviusculis, cinerascentibus, pollicaribus vel ultra, supra punctis obsoletis adspersa, infra radicans fibris plurimis, sparsis, filiformibus, albidis, descendentibus fibrilosis; apice ramosa: articulis 3 vel 4 tuberosis, ipsi radici conformibus, germinantibus. *Parencyma* carnosum, firmum, album, transversaliter sectum centro medullari amplissimo, subrotundo vel oblongo, adsperso punctis ferrugineis sparsis.

Proprietas. *Rec. Odor* subnauseosus. *Sapor* leviter amaricans, substypticus, acriusculus. *Masticata* comminuitur, fauces constringit, & acris sentitur, faucibus inhærens.

Cyperus longus & rotundus. L. (a)
Cyperus. Ph. Cypernwurzel. Planý galgan.
Cyperus. Glumæ palleaceæ distiche imbricatæ. *Cor.* 0. *Sem.* 1. nudum.
C. Longus. Culmo triquetro folioso, umbella foliosa, supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis.
C. Rotundus. Culmo triquetro subnudo, umbella decomposita: spicis alternis linearibus.

a) In nostris Pharmacopoliis longus & rotundus commixtim occurrunt, licet Linneus & post eum Bergius adhuc distinguant.

Exoticus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Longi : ſicca. Radix* ſublignea, tenax, teres, ramoſa, geniculata: annulis frequentibus circumeuntibus, tecta cortice rufeſcente, ſtriato, glabro, ſæpius in ſquamas ſoluto. *Rotundi: ſiccat.* Bulbi ſ. tubera ovata, magnitudine vix ovi columbini, cortice rufeſcente, glabriuſculo, undique cincta annulis frequentibus circumeuntibus concatenata, ſæpe libera; parencymate ſolidiuſculo, albo, friabili.

PROPRIETAS. *Longi: ſicc. Odor* fragrans, gratus. Recens debilius odorata: *Sapor* amaricans, balſamicus, inhærens faucibus. *Rotundi: recens* acris, ſapore acri, inhærente. *Siccata* læviter americans, *maſticata* tandem ſubacris; *odore* grato, violaceo.

ORDO
DIGYNIA.

SACCHARUM OFFICINALE. L.
Saccharum. Ph. Zucker. Cukr.
Saccharum. Cal. lanugo longa extra calicem.
Cor. 2 — valvis.

S. Officinale. Floribus paniculatis, foliis planis. Exoticum. Perenne.

Off. Sal essentialis dulcissimus.

Forma. Saccharum albissimum, solidum, durum, subfriabile atomis micantibus, vix diaphanum. *Cantum* crystallisatum, album vel rubrum: crystallis columna tetraedra, lateribus planis, duobus oppositis latioribus, utraque extremitate cuneatis, obtusiusculis.

Proprietas. Sal essentiale dulcissimum, sapidissimum, solubile. Solvitur in aqua, dificilius in vino, dificillime in spiritu vini, nisi per calorem ignis, vel mediante aquæ pauxillo. In igne funditur: fusione limpida, sublutescente sub refrigeratione in fila ductili, refrigerata vero solidescente, subdeliquescente. In igne clauso, pariter ac in vase ferreo supra ignem funditur, spumescit cum bullis sponte delinquentibus, fumo copioso, fusco, grato; tandem in carbonem vertitur nigricantem, spongiosum, splendentem, friabilem, non inquinantem, sub refrigeratione subdissilientem, calcinatione subsequente parum alcali reddentem. Ignis flammæ addmotum accenditur, spumescit, flagrat cum strepitu: flamma cœrulea, fere saphirina, fumo grato relictis carbonibus. Saccharum in aqua solutum, lege artis fermentescit: fermentatione spirituosa, vinosa vel acida. Saccharum uti reliqua salia essentialia,

lia, quiete & mora tarde cryſtalliſatur, unde ſyrupi ſaccharini temporis tractu & quiete cryſtallos ad fundum deponunt. Sed calore ſacchari cryſtalliſatio acceleratur. Ergo cum ſaccharum ad cryſtalliſationem perducendum erit, idem in aqua decoquatur, uſque dum decoctum, in aera projectum, veluti fila araneoſa referat; tum vaſis cupreis ſubcylindricis, læviſſimis, filis tranſverſalibus pertuſis, calidiſſime immittatur, & in hypocauſto perquam calido reponatur per nonnullos dies, ſub quibus cryſtalli, ſumma ſub quiete, filis inaſcuntur, quæ denique ſiccandæ.

Præparata. Spiritus ſacchari, Tafia vulgo, aut Rum.

Composita. Aqua carminativa Regia.

Baccilli Liquiritiæ.

Conſervæ omnes.

Eleoſacchara.

Electuaria quatenus ſyrupos recipiunt.

Elixirium Vitæ. — Vitrioli.

Hydromel Infantum.

Infuſum ſeu Tinctura Papaveris eratici

Morſuli Imperatoris.

Paſta de Althæa.

Pulpa Caſſiæ. — Tamarindorum. — Prunorum,

Pulvis Anodinus. — Haly. — Infantum abſorbens. — Sternutatorius

va-

variegatus. — Specierum Aquæ Perlarum — Specierum Diaireos. — Sqecierum Diatragacanthæ. — Stomachicus Birckmanni. — ad Tussim. — Contra Vermes. — Vitæ.

Roob. Ebuli. — Iuniperi. — Mororum. -- Ribium. — Sambuci de Spina Cervina.

Rotulæ Berberum.—Menthæ Piperitæ.

Spcies Decocti Avenæ.

Syrupi omnes.

Tabulæ de Althæa.

Trochisci omnes.

Vinum Cydoniorum. — Granatorum.

Spir. Saccb. Essentia Guajaci.

AVENA SATIVA. L.

Avena. Ph. Haber. Owes.

Avena. Cal. 2 valvis, multiformis: arista dorsali contorta.

A. Sativa. Paniculata, calycibus dispermis, seminibus lævibus altero aristato.

Colitur in agris. Annua.

Off. Semen integrum, & degluptum.

FORMA. *Semina* cylindrica unguicularia, tecta cortice nigro vel albo, lævi, hinc sulcato inde angulato; *nucleo* libero villoso, pallide cinereo, apice barbato; *parencymate* niveo farinoso.

PROPRIETAS. Farinacea, mucilaginosa, insipida, vix dulcescens.

COM-

COMPOSITA. Species decocti avenæ.

SECALE CEREALE. L.

Secale. Ph. *Cal.* oppositus, 2 — valvis, 2 — florus, solitarius.

S. Cereale. glumarum ciliis scabris.

Colitur in agris. Annuum vel Bienne.

Off. Seminis Farina.

FORMA. *Semina* cinerascentia, conica, lineas 2 longa, acuta, glabra, dorso convexa, antice longitudinaliter sulcata, basi obtusa, versus apicem notata cicatrice ovata, carinata. *Parencyma* album, farinaceum. Farina pura e parencymate pulverato, sepatatis omnibus furfuribus, alba, subinsipida; *mixta* vero cinerascens, e corticali parte simul contrita.

PROPRIETAS. Farinacea, viscosa.

PRÆPARATA. Fermentum. Panis. Spiritus Frumenti. (*a*)

COMPOSITA. *Farin.* Suppositoria composita.

HORDEUM DISTICHUM. L.

Hordeum. Ph. Gerste. Geemen.

Hordeum. *Cal.* lateralis. bivalvis, uniflorus, ternus.

H. Distichum. Flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexfariam positis. (*b*)

Colitur in agris. Annuum.

Off. Semen crudum & decorticatum.

For-

a) Hæc omnia non raro in pharmacopoliis præsto esse debent.

b) Nobis officinale hordeum vulgare.

Forma. *Semina* ovali — oblonga, utrinque attenuata, pallide citrina, ſemiunguicularia, undique obſolete angulata, antice ſulcata, apice terminata ariſta lineari, retrorſum ſcabra, ſæpius difracta; *parencymate* albo, farinaceo.

Proprietas. Farinacea, mucilaginoſa.

Præparata. An Maltum? (*a*)

Compositа. *Crud.* Species pro Potu ordinario.

Mund. (*b*) Species decocti Pectoralis.

Triticum hybernum. l.

Triticum. Ph. Weizen. Pſſenice.

Triticum. Cal. bivalvis, ſolitarius, ſubtriflorus. *Flos* obtuſiuſculus, obtuſus.

T. Hybernum. Calycibus quadrifloris ventricoſis lævibus imbricatis ſubmuticis.

Colitur in agris. Bienne. (*c*)

Off. Seminis Farina. Seminis Fœcula.

Forma. *Semina* flaveſcentia, ovato — gibba utrinque obtuſa, lineas 2 longa, glabra, dorſo convexa, verſus apicem notata cicatrice ovata prominula, antice longitudinaliter ſulcata, baſi tomentoſa; *parencymate* albo, farinaceo. *Farina* nivea, ſubluteſcens, ponderoſa. *Amylum* albiſſimum

a) Cum hodie magni æſtimetur in medicis, & Potum nobis largiatur maxime Provincialem.

b) Quod decorticati Synonymon eſt.

c) Promiſcue adhibetur annuum aut bienne.

mum, friabile, inquinans, tactu moliusculum, inter digitos fricatum crepulum.

PROPRIETAS. Farinacea, subinsipida, glutinosa.

PRÆPARATA. Amylum. Panis albus non raro.

COMPOSITA. *Amyl.* Baccilli Liquiritiæ.
Pulvis Haly. — Specierum Diatragacanthæ, & hic pro Pulvere Specierum Diaireos.
Trochisci Bechici albi.

TRITICUM REPENS. L.

Gramen. Ph. Quecken, Graswurzel. Peyr, tráwa.

T. Repens. Calycibus quadrifloris subulatis acuminatis, foliis planis.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. Herba. (*a*)

FORMA. *Radix recens* filiformis, teres simpliciuscula, subramosa, glabra, lævis, repens, longissima, centro perforato, geniculata: geniculis distantibus, vaginatis, emittentibus fibrillas capillares, ramosas.

PROPRIETAS. *Recent. & siccat. Sapor* debiliter dulcescens. *Odor*, ubi in thecis pharmacopolii concisa servatur, exacte idem ac ex acervo frumenti.

COM-

a) Quoniam ingreditur compositionem olei viridis.

PRÆPARATA. Extractum? (a)
COMPOSITA. *Herb.* Oleum viride.
Rad. Species decocti Althææ Fernelii. — Antifebriles.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.
ORDO
MONOGYNIA.

SCABIOSA SUCCISA. L.
Morſus Diaboli. Ph. Teufelsabiß. Czertkus.
Scabioſa. *Cal.* communis polyphillus: proprius duplex ſuperus. *Recept.* paleaceum, ſeu nudum.
S. Succiſa. Corollis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, lanceolato — ovatis.
Indigena. Perennis.
Off. Radix.

FORMA. *Rec.* *Radix* fibroſa: fibris plurimis

a) Cum ſæpius præſcribitur.

mis filiformibus, verticillatis, descendentibus, lævibus; trunco radicis cylindrico, præmorso, intra fibras descendente, illisque breviore; *Parencymate* albo.

PROPRIETAS. *Odor* debilis; *Sapor* amaricans.

COMPOSITA. *Rad. rec.* Unguentum Mendicorum.

SCABIOSA ARVENSIS. L.

Scabiosa. Ph. Apostemkraut, Scabioße. Kawiao.

S. Arvensis. Corollis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* pedalis vel ultra teres, simplex, scaber, superne nudus, pubescens, inferne nigro — punctatus, hispidus. pilis albidis. *Folia* opposita, hispida, acuta; inferiora integra, ovali — oblonga, spatulato petiolata, remote serrata; superiora sessilia, amplexicaulia, pinnatifida: laciniis linearibus, oppositis, subserratis; intermedio duplo majore lanceolata, utrinque attenuata, in medio serrata.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* herbaceus amaricans.

COMPOSITA. Species pro Thee Germanico.

RUBIA TINCTORUM. L.

Rubia. Ph. Färberröthe. Marena.

Rubia- *Cor.* 1 — petala campanulata. *Baccæ* 2, monoſpermæ.

R. *Tinctorum.* Foliis annuis, caule aculeato. Colitur. Perennis.

Off. Radix.

Forma. *Rec. rad.* cylindrica, teres, craſſitie pennæ anſerinæ, repens, fibrilloſa, parce ramoſa, geniculata: geniculis diſtantibus, ſubgemmiferis; extus dilute ſanguinea ſeu pallide rubra, glabra vel fuſca, membranis emortuis laxe obvelata, pro gradu ætatis, ſurculos plures cauleſcentes proferens, ubi ſub terra latent ſanguinei. *Parencyma junioris* radicis ſanguineum; corticali parte carnoſa, fragili, ſeparabili; fibra centrali tenaci medullata; tranſverſaliter ſectum centro medullari ovali, atomis punctato, cincto annulo concentrico, tenuiore opaco, obducto umbone concentrico, dilutiore, & corticali parte ſaturatiore; *Senioris* radicis: corticali parte ſubcarnoſa, fragiliuſcula, facile ſecedente, bitunicata: tunica exteriore fuſca, interiore ſanquinea, magis carnoſa; fibra centrali lignea, luteſcente, medulla parva; tranſverſaliter ſectum, centro medullari orbiculato, parvo, cincto lignea parte latiore, citrina, porulis pluribus undique pertuſa; obducta umbone concentrico, ſanguineo, & corticali parte fuſca. In annoſis radicibus medulla aut fuſco — nigricans eſt, aut penitus exeſa, unde radices hæ

in

in centro plerumque longitudinaliter perforatæ sunt.

PROPRIETAS. *Rec. odor* contusæ radicis remissior; fere corticis Sorbi. *Sapor* amaricans, leniter stipticus, ingratus. *Masticata* tenaciuscula; saliva phœnicea. *Sicc.* consimilis, sed odor fortior; presertim ex radice comminuta.

PENÆA SARCOCOLLA. L. (*a*)

Sarcocolla. Ph. Fleischleim. Sarkokolla.

Penæa. Cal. 2 — phyllus. *Cor.* campanulata, *Stylus* 4 — angularis. *Caps.* tetragona, 4 — locularis, 8 — sperma.

P. Sarcocolla. Foliis ovatis planis, calycibus ciliatis folio majoribus.

Exotica.

Off. Gummi — resina.

FORMA. *Gummi — resina* lutescens, subrubicunda, granulata: granis areniformibus, nitentibus; sive in frustis solidiusculis, ponderosis, subpolicaribus, sæpe magnitudine Pisi, vel Lentis seminis; friabilis, fragilis; fracturis subgranulatis, nitentibus.

PROPRIETAS. *Odor* debilis. *Sapor* primum subdulcescens, tum amaricans, acriusculus; *masticata* solubilis. In igne candelæ accenditur, intumescit, flagrat, nigrescit. In aqua frigida omnino solubilis; in spiritu vini autem non nisi qua partem.

a) Bergius statuit Penæam mucronatam L.

Plantago media. L.

Plantago. Ph. Wegbreit, Wegerig. Gitrocel prostředný neb ssiroký.

Plantago. *Cal*. 4 — fidus. *Cor*. 4 — fida limbo reflexo. *Stamina* longiſſima. *Caps*. 2 — locularis, circumſciſſa.

P. Media. Foliis ovato — lanceolatis, pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. (*a*)

Indigena. Perennis.

Off. Herba. (Semen raro.)

Forma. *Folia* omnia radicialia, palmaria, petiolata, erecto — patentia, ovato — lanceolata obtuſa, ſubſuculenta, margine ſubundulata, minutim atque remotiſſime dentata, utrinque pubeſcentia, ſupſeptemnervea : nervis elevatis; quorum 5. validiores; laterali utrinque minora, in medio folii evaneſcente. *Petioli* foliis multo breviores, pubeſcentes, ſubtus convexi, ſulcato — ſtriati, ſupra concavi, baſi latiores, ſubvaginati : vagina ſubſuculenta, alba, concava.

Proprietas. *Folior*. *Odor*. herbaceus; *Sapor* rancidus; *maſticata* ſalivam rubro tingunt.

Composita. *Herb*. Species Decocti Althææ Fernelii. — Decocti pro Gargariſmatæ adſtringente.

Plan-

a) Aliis cum pauco diſcrimine officinalis eſt Plantago latifolia; juxta Præcepta Chyrurgica etiam Plantago acuta,

PLANTAGO PSYLLIUM. L.

Pſyllium. Ph. Flöhſamenkraut. Chmelik, Bleſſ-nik.

P. Pſyllium. Caule ramoſo herbaceo, foliis ſubdentatis recurvatis capitulis amphyllis. (*a*) Indigenum. Perenne.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* parviuſcula, ovali — oblonga, utrinque obtuſa, hinc convexa, fuſca, nitida, inde concava.

PROPRIETAS. *Odor* nullus. *Sapor* nullus. *Maſticata* mucilaginoſa.

PRÆPARATA. Mucilago? (*b*)

FAGARA OCTANDRA. L. (*c*)

Tacamahaca. Ph. Tacamahakharz. Gummi Takamahaka.

Fagara. *Cal.* 4 — fidus. *Cor.* 4 — petala *Caps.* 2 — valvis, monoſperma.

F. Octandra. Foliolis tomentoſis.

Exotica. Arbor.

Off. Reſina.

FORMA. *Reſina* ſolida, in fruſtis majoribus vix diaphana, fuſca, variegata: maculis luteſcentibus, rubeſcentibus, friabilis: fracturis planis, nitentibus.

PRO-

a) Sveci depromunt ſemen ex Plantagine Cynope.

b) Cum ſæpe uſualis.

c) Juxta Bergium; juxta Pharmacopeam noſtram Arbor adhuc ignota, an Papuli balſamiferæ reſina ſit? quæritur.

Proprietas. *Odor* gratus, ambrosiacus; *Sapor* nullus; *masticata* inter dentes friabilis. In ignis flamma fusibilis, accenditur, flagrat cum susurro: flamma alba, fumo copioso, odore resinoso.

Composita. Emplastrum Diabotanon, = de Ladano.

Dorstenia contrajerva. L. (a)
Contrajerva. Ph. Giftwurzel. Gedhogg.
Dorstenia. *Receptacul.* commune 1 — phyllum, carnosum, in quo semina solitaria nidulantur.
D. Contrajerva. Scapis radicatis, foliis pinnatifido — palmatis serratis receptaculis quadrangulis.
Exotica. Perennis.
Off. Radix.

Forma. *Sicc. Radix*, fusiformis, solida, pollicaris vel ultra sæpe digitalis, extus fusco — cinerea, rugis transversalibus, undique fibrosa, præcipue inferne: fibris filiformibus, longissimis, descendentibus. *Parencyma* albidum, duriusculum, compactum; post sectionem transversalem annulo medullari notatum.

Proprietas. *Odor* fragrans, gravis: *Sapor* subamaricans. *Masticata* in ore non solubilis, verum compages tenax. *Recens* radix acris.

Præparata. Essentia.
Syrupus. Com-

a) Juxta Bergium Dorstenia Drakena; juxta Pharmacopeæ Svecicæ vero editionem alteram Drakena Contrajerva.

Composita, Aqua Theriacalis.

ALCHIMILLA VULGARIS. L.

Alchimilla. Ph. Sinau, Frauenmantel. Husy-nůjka,

Alchimilla. Cal. 8 — fidus. *Cor.* o. *Sem.* 1.

A. Vulgaris. Foliis lobatis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

Forma. *Folia* reniformi — orbiculata, concava plicata, novem nervea, minutim venulosa, supra pubescentia, subtus villosa, novemlobata: lobis obtuso — rotundatis, serratis; radicali longius petiolata, alterna, pauca distantia. *Petioli* radicales teretes, palmares caulis crassitie. *Stipulæ radicales* duæ, in petiolum decurrentes, membranaceæ, apice obtusæ, pilosæ, inciso — serratæ, acutæ.

Proprietas. *Herbæ rec. Odor* debilis, herbaceus. *Sapor* herbaceus.

ORDO

DIGYNIA.

CUSCUTA EUROPEA. L.

Cuscuta. Epithymum. Ph. Flachsseide. Thymseide. Kokotice.

Cus-

Cuscuta. *Cal.* 4 — fidus. *Cor.* 1 — petala. *Caps.* 2 — locularis.

C. Europea. Floribus seſſilibus.

Indigena. Annua. Paraſitica in ſtirpibus.

Off. Herba.

Forma. *Caules* filiformes, ſubdichotomi, nudi implexi. *Folia* nulla. *Glomeres* florum ſubrotundi, ſeſſiles, diſtantes.

Proprietas. *Sicc.* *Odor* debilis. *Sapor* vix amaricans, acriuſculus. *Maſticata* leniter rodens in lingua & faucibus.

Compoſita. Species Decocti Aperitivi.

CLASSIS V.

PENTANDRIA

ORDO

MONOGYNIA.

Cynoglossum officinale. L.

Cynogloſſum. Ph. Hundszunge. Pſý gazyk.

Cynogloſſum. *Cor.* infundibuliformis, fauce clauſa

ſa fornicibus. *Semina* depreſſa, interiora tantum latere ſtylo affixa.

C. Officinale. Staminibus corolla brevioribus, foliis lato — lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus.

Indigenum. Annuum.

Off. Radix.

Forma. *Rec. radix* majuſcula, extus rubro nigricans; inferne ſimplex, ſuperne ramoſa; *Parencymate* albo, ſubcarnoſo; tranſverſaliter ſecto, centro medullari orbiculato, ampliſſimo, circumdato annulo ſubſpongioſo.

Proprietas. *Recent. Odor* fœtido — hircinus. *Sapor* ſubdulceſcens, hircinus.

Composita. Pilulæ de Cynogloſo Catharrhales.

Symphytum officinale. L.

Conſolida Major. Symphytum. Ph. Schwarzwurzel, große Wallwurzel. Koſtiwal, Swálnjk, wyſoký traňk.

Symphytum. Corollæ limbus tubulato — ventricoſus: fauce clauſa radiis ſubulatis.

S. Officinale. Foliis ovato — lanceolatis decurrentibus.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

Forma. *Rec. Radix*. adulta magna, extus nigricans, ramoſa: ramis cylindricis, *Parencymate* albo carnoſo; tranſverſaliter ſecto, centro medul-

dullari orbiculato, amplo, obſolete ſtellato, punctis adſperſo.

Proprietas. *Radix recens* ſubdulceſcenti — inſipidi, ſucco tenaci, glutinoſo abundans; fere magis glutinoſa quam radix Althææ; *maſticata* comminuitur, ſed ſub maſticatione glutinoſum copioſe extrahitur; *ſiccata* (in taleolas longitudinales ſecta) duriuſcula, fragilis, ſubinſipida; maſticata pariter mucilaginoſa; *Odor* nullus.

Composita. Emplaſtrum ad Rupturas.

Onosma echioides. L.

Anchuſa Lutea. Ph. Färber: Ochſenzunge. Wolowý gazyk čerwený.

Onoſma. *Corolla* campanulata: fauce pervia. *Semina* 4.

O. Echioides. Fol. lanceolatis hiſpidis, fructibus erectis.

Indigena. Biennis.

Off. Radix.

Forma. *Radix* ſemipedalis, ſæpe multo longior, digitum craſſa, intus ſordide pallens, cortice veſtitur nigro, ſublaceroque, ſub hoc eleganter rubra, ſimilique tingens colore.

Proprietas. *Odor* nullus; *ſapor* nauſeoſus, ſtipticus, non nihil adſtringens; *maſticata* arenuloſa ſentitur, ſalivam profunde rubro tingens colore.

Composita. *Rad.* (loco Alcannæ) Unguentum

tum Potabile rubrum. — de Uvis, seu ad Labia rubrum.

✠ CYCLAMEN EUROPEUM. L.

Cyclamen. Arthanita. Ph. Sau = oder Schweinbrod. Swinſký wořech neb chléb.

Cyclamen. *Cor* rotata, reflexa, tubo brevissimo; fauce prominente. *Bacca* tecta capsula.

C. Europeum. Corolla retroflexa.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. (*a*)

FORMA. *Radix recens*, instar Rape, subrotunda, majuscula, depressa, extus nigricans, basi radicans; fibris filiformibus; *parencymate* carnoso.

PROPRIETAS. *Recentis Odor* nullus. *Sapor* acris, pungens, fervidus, amaricans, ingratus. *Recenter siccata* adhuc acris; diu servata, fere insipida.

COMPOSITA. *Rad. rec.* Unguentum de Arthanita, sive contra Vermes.

MENYANTHES TRIFOLIATA. L.

Trifolium Fibrinum. Ph. Fiberklee, Bitterklee. Hořký, wodnj getel.

Menyanthes. *Cor.* hirsuta. *Stigma* 2 — fidum. Caps. 1 — locularis.

M.

a) Hæc radix raro in usum vocatur a pharmacopeis nostris, ita, ut locum ejus occupaverit persæpe Solani tuberosi aut Scrophulariæ nodosæ radix, imo & alia.

M. Trifoliata. Foliis ternatis.
Indigena. Perennis.
Off. Herba.

FORMA. *Folia* cuncta radicialia, petiollata, ternata: foliolis ovatis, obtusis, utrinque glabris, venosis, margine repandis, bipollicaribus vel ultra, æqualibus, tenerioribus, oblongis. *Petioli* teretes, striati, basi vaginati.

PROPRIETAS. *Rec.* & *sicc.* *Odor* nullus. *Sapor* amarissimus.

PRÆPARATA. Conserva.
Essentia.
Extractum.

COMPOSITA. *Herb.* Essentia Absinthii.
Extractum Amaricans, & hoc pro Tinctura amaricante.
Conserv. Electuarium Antifebrile.
Extract. Liquor visceralis.
Pilulæ Balsam. Stahlii.

† ANAGALLIS ARVENSIS. L.
Anagallis. Ph. Hünerdarm, Gauchheil. Kurimor, žabj střewce.
Anagallis. *Cor.* rotata. *Caps.* circumscissa.
A. Arvensis. fol. divisis, caule procumbente.
Indigena. Annua.
Off. Herba.

FORMA. *Cauliculi* teneri, succulenti, quadrangulares, ramosi. *Folia* conjugata, ex ovatis lanceolata, succi plena. PRO-

PROPRIETAS. *Odor* nullus. *Sapor* leniter acidulus & adstringens, succus inspissatus amarus, acris.

PRÆPARATA. Oleum coctum.

CONVOLVULUS SCAMMONIA. L.
Scammonium. Ph. Scammonie. Skammonia.
Convolvulus. *Cor*. campanulata, plicata. *Stigm*: 2. Capsula 2 — locularis: loculis dispermis.
C. Scammonia. Foliis sagitatis postice truncatis, pedunculis teretibus subtrifloris.
Exotico — Perenne.

Off. Gummi — Resina.

FORMA. *Gummi — Resina* in frustis, fusca, levis friabilis: fracturis nitidiusculis.

PROPRIETAS. *Odor* fœtidiusculus. *Sapor* subvitriolicus, nauseosus. *Masticata* hæc gummi — resina in ore difficulter solubilis, emollitur, & adhæret dentibus, sæpe arenosa. Solvitur in aqua pura: solutione lactescente, subviridescente; lactescit etiam frictione digiti humidi. Resinosa pars solvitur in spiritu vini.

PRÆPARATA. Diagrydium præparatum, i. e. pulvis Scammonii subtilissimus. Resina.

COMPOSITA. *Diagryd*. Extractum Catholicum, hoc pro Pilulis Mercurialibus.

Unguentum de Arthanita sive contra Vermes.

Resin.

Resin. Electuarium Catharcticum Regium, hoc pro Pilulis Anethinis & Cochiæ.

CONVOLVULUS TURPETHUM. L.

Turpethum. Ph. Türbith. Turbit.

C. Turpethum. Foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris.

Exotico — Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Radix recens* longissima, cylindrica, flexuosa, ramosa, extus fusca, succo lacteo turgida; *Siccata* vero, qualis in officinis occurrit, secta in frusta digitalia, teretia subfragilia, corticali parte cinereo = fuscescente, *parencymate* transversim secto, poris plurimis pertuso.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* nullus. *Sapor* debilis subnauseosus.

COMPOSITA. Extractum Panchymagogum. Pilulæ Cochiæ.

CONVOLVULUS JALAPA. L. *(a)*

Jalapa. Ph. Jalappe. Galapa.

C. Jalapa. Foliis difformibus, cordatis angulatis oblongis lanceolatis, caule volubili, pedunculis unifloris.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA *Radix siccata* prout in pharmacopoliis occurrit, in taleolas transversales scissa, so-

(*a*) Mirabilis Dichotoma juxta Bergium & Phar. Svecicam.

lida, ponderosa, sectione trasversali eodem modo picta ac in recente. Ceterum variat communiter in nostris officinis, ut nunc magis pallida, nunc prorsus nigrescens obveniat; præstantissima censetur, quæ maxime resinosa.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* debilissimus. *Sapor* acriusculus, diutius inhærens, haud ingratus. *Masticata* & deglutita pungit in faucibus. Quando contunditur, pulvis in auram ascendens valde titillat in naso & faucibus, atque irritat adusque sternutationem. Jalapæ frustum in candelæ flamma accenditur, & resinosa ejus funditur; sed simul ac flammam removeris, extinguitur; fumat: fumo graveolente.

PRÆPARATA. Extractum Jalapæ Gummosum, & Resinosum, seu Resina, aut Magisterium.

COMPOSITA. *Rad.* Electuarium Purgans, sive Hydragogum.

Pulvis Purgans.

Resin. Pilulæ Anethinæ. — Mercuriales.

CONVOLVULUS MECHOACANA. *Berg. Mat. Med.*

Mechoacana. Ph. Weiße Jalappe, Mechoakannewurzel. Bjla Galapa.

C. *Mechoacanna.* Caule volubili, foliis cordatis, fructibus maxime tomentosis. Berg. *Mat. Med.*

Exotico — Perennis, luxurians.

Off.

Off. Radix.

Forma. *Radix* magna, carnoſa, recens lactescens, alba. *Siccata* in talleolas ſciſſa leves, extus pallide cinereas, *parencymate* albo fragili, friabili. (*a*)

Proprietas. Inodora, ſubinſipida. *Maſticata* primum læviter dulceſcens, deinde acriuſcula ſubnauſeoſa.

Præparata. Reſina vulgo Magiſterium, aut Extractum Spirituoſum.

Cinchona officinalis. L.

China Chinæ. Ph. Fieberrinde, Chinarinde. Chyna.

Cinchona. *Cor*. infundibuliformis apice lanata. *Capſ.* infera, 2 locularis, diſſepimento parallelo.

Exotica. Arbor excelſa.

Off. Cortex.

Forma. *Cortex* duriuſculus, brunneo — rubeſcens, extus cineraſcens, rugoſus, ſulcis tranſverſalibus interuptis, ſæpe lichenibus deformatus, ſectus in fruſta ſemidigitalia, convoluta vel concava; fragilis: fractura leviuſcula vel fibroſa ſcabra.

Proprietas. *Odor* mucidus. *Sapor*. amarus, auſterus inhærens.

Præ-

a) Maxima analogia inter talleolas Mechoacanæ, & talleolas radicis Mirabilis Jalapæ obſervari valet dempta tantum magnitudine.

Præparata. Eſſentia.
Extractum Aquoſum & Spirituoſum.
Syrupus.
Sal eſſentialis chinæ. (*a*)
Composita. *Cort.* Electuarium Antifebrile.

Verbascum thapsus. L.

Verbaſcum. Ph. Wüllkraut, Königskerze, Himmelbrand. Diwizna.

Verbaſcum. Cor. rotata, ſubinæqualis. *Caps* 2 — locularis, 2 — valvis.

V. Thapſus. Foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici,

Indigenum. Bienne.

Off. Herba. Flores.

Forma. *Folia* ſparſa, ſeſſilia, decurrentia, ſpithamæa, oblonga, inferne attenuata, acutiuſcula, undique tomentoſa, albido — virideſcentia, margine crenata, erecta, ſupra rugoſa, ſubtus nervoſo — venuloſa; inferiora petiolata; ſuperiora ſenſim minora. *Spica* cylindrica, terminalis, ſubſeſſilis, palmaris vel ultra, conſtans bracteis & floribus tempore inæqualibus. *Bracteæ* lanceolatæ, terminatæ apice lineari, anguſto; ſubtus tomentoſæ, ſupra glabræ, calyce fere longiores. Cal. *Perianth.* tomentoſum, ovato — oblongum, baſi angulatum, quinquefidum: laciniis lineari — lanceolatis, ſubæqualibus, intus

D læ-

a) Cum non deſint, qui cum maximi eſtiment; ſi prætium ſpectetur, ſaltem non abs re.

lævibus, erectis. COROLLA infundibuliformis, calice longior. *Tubus* glaber, crassus, breviusculus. *Limbus* luteus, tomentosus, quinquefidus: laciniis ovato — oblongis, obtuso rotundatis, subæqualibus; 4 erectis, apicibus inflexiusculis; infima patente. STAM. *Fil.* 5, filiformia, tubo inserta, limbo breviora; 3 superiora paullo breviora, superne lanata, erecta; 2 inferiora longiora, glabra, declinata. *Anth.* oblongæ, didymæ, erectæ. PIST. *Germen.* subrotundum, tomentosum, obtusum. *Styllus* filiformis, inferne tomentosus, superne glaber, longitudine corollæ. *Stigma* capitatum, compressum.

PROPRIETAS. *Folior. rec. Odor* debilis subnarcoticus non gratus. *Sapor* herbaceus, subamaricans, in folia Raphani incidens, sed longe debilior; *Flor. rec.* debilior; subnarcoticus, vix gratus. *Sicc. Folior. Odor* debilis non ingratus. *Sapor* subrancidus. *Flor. Odor* svaveolus, fere Iridis Florentinæ; *sapor* gratus violaceus.

PRÆPARATA. *Flor.* Oleum Coctum.
Unguentum.

COMPOSITA. *Herb.* Species pro Gargarismate Emolliente. — Decocti Pectoralis.
Flor. Species Decocti Pectoralis.

DATURA STRAMONIUM. L.

Datura sive Stramonium. Ph. **Dollápfel. Geſſkowá palice, bodlawé gablko.**

Datura. *Cor*. infundibulif. plicata. *Cal*. tubulosus, angulatus, deciduus. *Caps*. 4 – valvis.

D. Stramonium. Pericarpiis spinosis, erectis ovatis, foliis ovatis glabris.

Indigena. Annua.

Off. Herba, etiam recens.

Forma. *Caulis* subbipedalis, erectus, teres, glaber, lucidiusculus, inferne simplex, superne dichotomus. *Rami*. patuli, minutim pubescentes. *Folia* alterna subsucculenta, petiolata, vix spithamæa, ovata, acuta, utrinque glabra, lucidiuscula, supra obscure viridia, venis lineata, subtus pallidiora, nervis validis, subalternis, margine undique inæqualiter sinuato – dentata, patentia. *Petioli* foliis breviores, teretes, supra superne canaliculati.

Proprietas. *rec*. *Odor* narcoticus, fortior, præcipue e foliis fricatis. *Sapor* amarus. Folia *masticata* tenera. Odor recentis herbæ narcoticus, adeo fortis & afficiens, ut, cum plantam describeret, ex odore narcotico, & ex eo quod masticaverat folii frustum, temulentus quasi evaserit, haud secus ac si insvetus fumum Tabaci hausisset BERGIUS.

Præparata. Extractum ex Herba recenti. (*a*)

a) Hujus superficies frequenter nitro efflorescente obducitur, quod & per totam substantiam reperitur in vetustiori.

HYOSCYAMUS NIGER. L.

Hyoſcyamus. Ph. Bilſenkraut. Blyn.

Hyoſcyamus. Cor. infundibulif. obtuſa. *Stam.* inclinata. *Caps.* operculata, 2 – locularis.

H. Niger, Follis amplexicaulibus, ſinuatis, floribus ſeſſilibus.

Indigenus. Biennis. (*a*)

Off. Herba etiam recens. Semen.

FORMA. *Caulis rec.* (ſecundi anni) erectus, teres, bipedalis, villoſo — lanatus, ſubglutinoſus, ſuperne ramoſus. *Rami* alterni, erecti. *Folia* alterna, ſeſſilia, amplexicaulia, ovato — oblonga, accuta, minutim tomentoſa, mollia, pinnatifido — dentata: laciniis lanceolatis, acutis integris. *Semina* numeroſa cinerea, ovata, obtuſa, utrinque compreſſa, undique foveolis reticulata.

PROPRIETAS. *Herbæ rec. Odor* narcoticus, ingratus, contuſorum foliorum tabacinus; *maſticata* folia lubrica, ſubmucilaginoſa, *ſapore* fatuo. *Folia ſiccata* ſubinſipida, vix acriuſcula, odore debili; carbonibus ignitis immiſſa ſcintillant, fremunt, & fulgurant ut Nitrum fumant: fumo narcotico, tabacino.

PRÆPARATA. *Herb. rec.* Extractum.
Oleum coctum.
Semin. Oleum preſſum.

CoM-

a) Nobis & annua & biennis, & etiam diutius durans obſervatur ſubinde,

Composita. *Herb.* Unguentum Populeum.
Sem. Pilulæ de Cynogloſſo.
Extract. Ceratum pro Cereis exſiccantibus, & ad dolores leniendos.

Nicotiana rustica. L.

Nicotiana. Petu. Tabacum. Ph. Taback. Tabák.

Nicotiana. *Cor.* infundibulif. limbo plicato. *Stam.* inclinata. *Capſ.* 2 — valvis, 2 — locularis.

N. Ruſtica. Foliis petiolatis ovatis integerrimis, floribus obtuſis. (*a*)

Colitur. Annua.

Off. Herba etiam recens.

Forma. *Folia* magna, alterna, pedalia vel ultra pro ingenio ſoli, patentia, ovali — lanceolata, acuta, inferne attenuata, ſeſſilia, paullulum decurrentia, utrinque glabra, ſupra obſcure viridia, ſubtus pallidiora, coſta & nervis albido — virideſcentibus, pubeſcentibus; ſupræma minora ſeſſilia, non decurrentia.

Proprietas. *Recent.* *Odor* debilius narcoticus. *Siccat.* vero fortior. *Sapor recent.* amaricans, acriuſculus; *maſticata* folia recentia, ſubglutinoſa, linguam fauceſque leviter mordentia; ſaliva virideſcente. Folia Tabaci recentia manibus tractata, digitos inquinant glutinoſa quadam

d 3

a) Bergius & Pharmacopea Svecica indicant Nicotianam Tabacum officinalem; an quia hæc ſpecies cedere in uſus œconomicos?

dam materia, fusco — brunea. In flamma candelæ flagrant folia siccata: fumo narcotico asvetis grato cinere albido relicto. Folia concisa, carbonibus ignitis injecta, fulgurant, & fremunt adinstar Nitri, nervi potissimum, & petioli.

PRÆPARATA. *Herb. rec.* Extractum.

COMPOSITA. Pulvis sternutatorius variegatus.

* ATROPA BELLA DONNA. L.

Solanum Furiosum. Ph. Dollkraut. Lilek blázowý.

Atropa. Cor. campanulata. *Stam.* distantia. *Bacca* globosa, 2 — locularis.

A. Bella Donna. Caule herbaceo, foliis ovatis integris.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* herbaceus 4 — vel 6 — pedalis, erectus, teres minutissime pubescens, ramosus. *Folia* alterna, gemina: altero minore, petiolata, ovata, utrinque acuta, spithamæa vel ultra, molliuscula, integerrima, nervosa: nervis a costa alternis, obliquis.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* foliorum vix ullus; *Sapor* herbaceus, acriusculus subnarcoticus. *Baccæ recent.* sapore dulcescente, fatuo subadstringente.

PRÆPARATA. Extractum.

So-

SOLANUM DULCAMARA. L.

Dulcamara. Ph. Hinschkraut, Bittersüß. Sladká hořká.

Solanum. Cor. rotata. *Antherea* ſubcoalitæ, apice porogemino dehiſcentes. *Bacca* 2 — locularis.

S. Dulcamara. Caule intermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis.

Indigena. Sufrutex.

Off. Caules. (ſtipites vulgo.)

FORMA. *Caulis* (h. e. ſtipites) ſufruticoſus, flaccidus, teretiuſculus, ſubangulatus, minutim rugoſo — ſcabridus tuberculis ſparſis exaſperatus, ramoſus. *Rami* pauci, alterni, erecti *Folia* alterna, petiolata, ovata acuta, utrinque glabra, patentis; inferiora integra; ſuperiora haſtata. *Petioli* glabri, ſubtus convexi, ſupra canaliculati.

PROPRIETAS. *Stipit. rec. Odor* gravis, nauſeoſus; *Sapor* amaricans, poſtea ſubdulceſcens. *Sicc. Odor* nullus; *ſapor* magis amarus; *maſticati* dein dulceſcunt.

SOLANUM NIGRUM. L.

Solanum. Ph. Nachtſchatten. Pſý wjno.

S. Nigrum. Caule intermi herbaceo, foliis ovatis dentato — angulatis, racemis diſtichis nutantibus.

Indigenum. Annuum.

Off.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, pedalis, teres, viridis nodoſus, inter nodos angulatus: angulis 2 ſcabris, oppoſitis, a ſingulo pedunculo ad proximum decurrentibus; undique ramoſus: ramis alternis, e nodis exeuntibus, erectis. *Folia* ad nodos, infra ramos, pariter alterna petiolata, ovata, acuta, angulata, ſubcarnoſa, utrinque glabra, margine minutim ciliata, bipollicaria vel ultra, pro ingenio ſoli, patentia. *Petioli* ſemiteretes, ſupra biangulati; *Umbellæ* laterales, ex ipſo caule, & ramis infra folia, ſed latere oppoſito, enatæ, pedunculatæ, minutim pubeſcentes, ſimplices cernuæ, nudæ, ſubſexflore.

PROPRIETAS. *Rec.* Herbæ: *Odor* fœtidus; *ſapor* herbaceus, ſubfatuus. *Maſticata* folia tenera, ſaliva viridi.

PRÆPARATA. Succus.

COMPOSITA. *Succ.* Emplaſtrum Diapompolygos. Hoc pro Unguento Diapompolygos.
Herb. rec. Unguentum Populeum.

RHAMUS CATHARCTICUS. L.

Spina Cervina. Ph. Kreuzbeere. Pſý gahody, křeſſetlák.

Rhamnus. *Cal.* tubuloſus: ſquammis ſtamina munientibus. *Cor.* nulla *Bacca.*

R. Catharcticus. Spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis. In-

Indigena. Arbor.

Off. Fructus recens.

Forma. *Rec.* *Baccæ* immaturæ virides; maturæ magnitudine ſeminis Piſi, ſubrotundæ, apice depreſſiuſculæ puncto elevato, loco umbilici, undique læves, nitidæ, nigricantes; *parencymate* viridi, pulpoſo-ſuccoſo, tetraſpermo. Utut pulpa ipſa viridis, cortex tamen baccæ latere interiore obducitur ſuccoſa ſubſtantia, velut in baccis Ribium nigrorum, violaceo tingente. Semina ovata obtuſa, dorſo convexa, antice carinata, hinc ſubtrigona, fuſca, læviuſcula.

Proprietas. *Recent. baccarum*: *Odor* Padi. *Sapor* primum dulceſcenti—nauſeoſus, odori congruens, dein ſubſtypticus. *Maſticatæ* ſalivam viridi—purpuraſcente tingunt. *Seminum* ſapor amaricans; *maſticata* ſalivam luteſcenti colore inficiunt,

Præparata. Roob.
Succus. ex hoc
Syrupus.

Composita: *Syrup.* Electuarium Purgans, ſive Hydragogum.

Rhamnus zizyphus. L.

Jujubæ. Ph. Bruſtbeerlein. Guguby.

R. Zizyphus. Aculeis geminatis: altero recurvo, floribus digynis, foliis ovato—oblongis.

Indigenus. Arbor.

Off.

Off. Fructus.

Forma. *Drupa* ovalis, utrinque obtuſa, magnitudine fructuum Olivæ fere excedens, rubra. *Nux* ovali — turbinata, utrinque acuta, rugoſa, bilocularis. *Parencyma* drupæ : Pulpa molis, alba ; ſpongioſa in ſiccata.

Proprietas. *Odor* nullus. *Sapor* dulcis, ſubviſcoſus.

Ribes rubrum. L.

Ribeſium Rubrum. Ph. Rothe Joannesbeeren, Ribeſel Rybes, neb wjno S Jána čerwené.

Ribes. Petala 5 & *ſtamina* calyci inſerta. *Stylus* 2 — fidus. Bacca poliſperma infera.

R. Rubrum. Inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis.

Hortenſe. Frutex.

Off. Fructus recens pro ſucco.

Forma *Baccæ rec.* globoſæ, magnitudine ſeminis Piſi, rubræ, glabræ, nitentes, apice umbilicatæ : umbilico emarcido, convexo, nato e calyce marceſcente, & contracto uniloculares ; *parencymate* ſuccoſo, poliſpermo. *Semina* intra pulpam baccæ, pedicellata, altera receptaculi extremitate ſingula afixa, ovata, obtuſa arillata : arillo membranaceo, diaphano, turgido ſucco aqueo, limpidiſſimo, intenſius ſtyptico, a vitriolo martis ſubito nigreſcente.

Proprietas. *Rec. Odor* vix ullus. *Sapor* ſubvinoſus, dulceſcenti — acidus.

Præ-

PRÆPARATA. Roob.
Syrupus.

✠ RIBES NIGRUM. L.

Ribeſium Nigrum. Ph. Schwarze Ribeſel. Rybes, neb wjno S. Jána černé.

R. Nigrum. Inerme racemis piloſis, floribus oblongis.

Hortenſe. Frutex.

Off. Folia.

FORMA. *Folia rec.* alterna bipollicaria, petiolata, ſubcordata, trilobata, utrinque glabra, ſupra lineata, dilutius viridia, ſubtus pallidiora, punctis elevatis areis adſperſa, venuloſa, margine minutim ciliata, undique groſſius ſerrata: ſerraturis puncto calloſſo terminatis. *Petioli* teretes, longitudine foliorum, minutim pubeſcentes, ſupra ſulcati, baſi clavati, concaviuſculi, ſuperne notati dentibus 4 ſubulatis, opoſitis.

PROPRIETAS. *Rec. & ſicc. Odor* fragrans; *Sapor* ſubauſterus.

HEDERA HELIX. L.

Hedera Arborea. Ph. Epheu, Epheů, Břečtan.

Hedera. Petala 5, oblonga. Bacca 5 — ſperma, calyce cincta.

H. Helix. Foliis ovatis lobatisque.

Indigena. Frutex arboreſcens.

Off. Reſina (Folia raro.)

FORMA. *Gummi:* maſſa *reſinoſa* in glebu-

lis, duriuſcula, uniformis, ſcabra, fuſco — nigricans, inſtar mineræ ferri tophaceæ, fragilis: fracturis ſplendentibus, purpuraſcentibus, granulis difractis, ſubdiaphanis. *Folia* alterna, petiolata, utrinque glabra, firma, venoſa, junioris fruticis quinqueloba: lobis acutis; intermedio productiore; mediæ ætatis fruticis triloba; ſenioris vero cordata ſeu ovata, acuta, integerrima, ſupra lucida, ſubtus pallidiora.

PROPRIETAS. *Gummi* potius *Reſina* maſticata arenacea, friabilis, ſicca in ſaliva non ſolubilis. *Sapor* debilis, reſinoſus. *Odor* debilis, ſubfragrans, reſinoſus. In candelæ flamma accenditur, flagrat: flamma albido — luteſcente, fumo graviuſculo, reſinoſo. Candela remota, flammam ſponte ſuſtinet, In oleo expreſſo non ſolvitur, ſed tingit oleum colore lacteſcente, & emollitur; nec in oleo ſtyllatitio ſolvitur, ſed tingit oleum colore aureo.

COMPOSITA. Pilulæ Balſamicæ Stahlii.

VITIS VINIFERA. L.

Vitis. Ph. **Wein, Weinrebe. Winný kmen, neb keř, rýwj winné.**

Vitis. Petala apice cohærentia, emarcida, *Bacca* 5 — ſperma, ſupera.

V. Vinifera. Foliis lobatis ſpinatis nudis.

Hortenſis. Frutex.

Off.

Off. Integra Planta exſiccata. Fructus recens & paſſus, vulgo Paſſulæ Majores. Groſſe Weinbeeren, Zibeben. Welké rozynky. Paſiulæ Minores. Kleine Weinbeeren. Malé rozynky. Vinum generoſum, album, rubrum. Spiritus. Tartarus crudus. Acetum.

Forma. *Cyma* nuda, pendula, ovata, obtuſa, pedunculata: pedunculo inſtructo *cirrho* ſolitario. *Bracteæ* ſolitariæ, lineares, obtuſiuſculæ, concavæ, ad ramos cymæ ſuæ. *Pedicelli* baccis fere breviores, teretes, adſperſi punctis parvis, callolis, apice margine incraſſato. *Baccæ* ovato — globoſæ, colore, ſapore & magnitudine variantes, ſubdiaphanæ, baccis uvæ criſpæ vix majores, undique glabræ rore glauco tinctæ, quo abraſo nitidiuſculæ, apice inſtructæ puncto parvo, elevato, umbilici loco; *parencymate* molliſſimo, pulpoſo — ſuccoſo; poſt ſectionem tranſverſalem æquali, annulo tenui ſolitario, interupto, ſubflexuoſo; uniloculari, pentaſpermo. *Semina* obcordato -- cylindrica, baſi emarginata, glabra receptaculo cylindrico intra baccam inſidentia, breviter pedicellata.

Proprietas. Baccar. *recent. Odor* nullus. *Sapor* acidulus, humectans. Baccar. *recent.* Unc. 1 dat drachm. 6 ſucci expreſſi tenuis, virideſcentis

tis (e baccis viridibus,) aciduli. *Passular.* *Sapor* dulcis, subacidulus.

PRÆPARATA. *Ex Planta integra.* Sal vitis alcalinus.

Ex Tartaro. Tartarus depuratus vulgo Cremor, aut Cryſtalli, ex hoc iterum Sal Segnette. Tartarus Tartariſatus. Tartarus emeticus.

Spiritus Tartari.

Oleum Tartari fœtidum.

Sal Tartari & inde Liquor Salis Tartari ſeu Oleum Tartari per deliquium,

Ex Aceto. Acetum deſtillatum.

Syrupus Aceti.

COMPOSITA. *Uv. recent.* Unguentum de Uvis ſeu ad labia.

Uv. paſſ. Major. Elixirium Salutis.

Hydromel Infantum.

Species decocti Althææ Fernelii.

Minor. Species decocti Aperitivi.

Vin. generoſ. Elixirium Stomachicum-Temperatum.

Syrupus Chinæ Corticis.

Alb. Syrupus Corticum Aurantiorum. — Citri.

Rubr. Unguentum Potabile rubrum.

Spirit. Vin Acetum Antiſepticum.

Aqua Caſtorei. — Cinnamomi vinoſa.

Tinctura Martis Tartarisata.

Spiritus Tartari. Spiritus Diatrion seu Mixtura simplex.

Sal Tartari. Electuarium sive Confectio Kermesina, vulgo Alkermes.

Elixirium Salutis. — Stomachicum Temperatum.

Essentia Castorei.

Extractum amaricans, & hac pro Tinctura Amaricante.

Hepar Sulphuris.

Infusum sive Sanguis Cichorei simplex & cum Rheo.

Kermes minerale.

Lapis Causticus.

Sal Digestivus seu Febrifugus Silvii.

Syrupus Cichorei cum Rheo. — Kermesinus, & hic pro Electuario sive Confectione Kermesina.—Manatus.

Tartarus Vitriolatus, & hic pro Pulvere Antispasmodico communi, & stahlii. — Deoppilante sive digestivo.—Purgante.—Stomachico Birkmanni.

Tinctura Antimonii Anisata, simplex.—Balsamica.- Rebarbari aquosa ex tempore paranda. — Salis Tartari.

Spiritus Anisi. — Aromaticus. — Baccarum Jniperi viridium. — Balsamicus vulgo Balsamum Schauerianum. — Carvi seminum. — Cochleariæ. — Formicarum. — Lavendulæ. — Menthæ. — Matricalis. — Nitri dulcis. — Rosmarini seu Aqua Reginæ Hungariæ. — Salis Ammoniaci Anisatus. — Salis Ammoniaci Lavendulatus vulgo Aqua Anodyna. — Salis ammoniaci vinosus. — Salis dulcis. — Serpilli. — Theriacalis Camphoratus. — Vini Camphoratus.

Tinctura Aloes. — Anodina. — Antimonii anisata. — Balsamica. — Tinct. seu Balsamum Commentatoris. — Benzoes. — Martis cum succo Pomorum. — Salis Tartari. — Tartari Aurantiata, quatenus priorem recipit.

Tartarus crudus. Regulus Antimonii simplex.

Tartarus depuratus seu Cremor aut Crystalli.

Electuarium Catholicum Regium. — Lenitivum seu Tamarindorum.

Globuli Martiales.

Infusum sive Aqua Angelica. — Laxativum.

Pulvis dentifricius albus, & ruber. — Deoppilans sive digestivus. — Vitæ.

Tin-

Tinctura Martis Tartarisata.

Spiritus Tartari. Spiritus Diatrion seu Mixtura simplex.

Sal Tartari. Electuarium sive Confectio Kermesina, vulgo Alkermes.

Elixirium Salutis. — Stomachicum Temperatum.

Essentia Castorei.

Extractum amaricans, & hac pro Tinctura Amaricante.

Hepar Sulphuris.

Infusum sive Sanguis Cichorei simplex & cum Rheo.

Kermes minerale.

Lapis Causticus.

Sal Digestivus seu Febrifugus Silvii.

Syrupus Cichorei cum Rheo. — Kermesinus, & hic pro Electuario sive Confectione Kermesina.—Manatus.

Tartarus Vitriolatus, & hic pro Pulvere Antispasmodico communi, & stahlii. — Deoppilante sive digestivo.—Purgante.—Stomachico Birkmanni.

Tinctura Antimonii Anisata, simplex.—Balsamica.— Rebarbari s quossa ex tempore paranda. — Salis Tartari.

 Cum

Cum Sale Tartari adhuc parantur: Spiritus Salis Amoniaci Lavendulatus vulgo Aqua Anodina. — Vinoſus.

Oleum Tartari per deliquium, ſeu Liquor Salis Tartari.

Terra foliata Tartari.

Unguentum ad ſcabiem.

Acetum. Acetum Antiſepticum. — Colchici. — Lavendulæ. — Lithargirii. — Roſarum. — Rutæ. — Sambuci — Squilliticum.

Aqua vulneraria cum Aceto.

Emplaſtrum Diabotanon. — Diachylon cum gummatibus. — de Galbano crocatum. — Malacticum. — Noricum. — Oxycroceum. — Saponatum.

Oxymel Colchicum. — Simplex. — Squilliticum.

Sacharum Saturi.

Syrupus Aceti. — Emeticus.

Terra foliata Tartari ſicca, & deliqueſcens, unde Liquor Terræ foliatæ Tartari.

Unguentum Ægyptiacum.

Cum Aceto Vini adhuc parantur: Magiſterium vel Lac Sulphuris.

Sulphur Auratum Antimonii.

Tar-

Tartarus Tartarisatus. Infusum sive Aqua Angelica.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. L.

Hirundinaria. Ph. Schwalbenwurzel. Lasstowičnjk.

Asclepias. Contorta. *Nect.* 5, ovata; concava, corniculum exserentia.

A. Vincetoxicum. Foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis.

Indigeno — Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix* oblonga, cylindrica, seu planiuscula, horizontalis, repens, breviuscula, bipollicaris, superne cinerea, scabra, notata cicatricibus, callosis, truncatis, rugosis, subtus obsessa fibris numerosis, aggregatis, filiformibus, albis, subcarnosis, glabris, descendentibus, elongatis. *Gemmæ* e radice progerminantes, incarnatæ, sparsæ, undique imbricatæ: squamis ovatis, obtusis adpressis. *Parencyma* radicis solidiusculum, transversaliter sectum variegatum; parencyma vero fibrarum album, transversaliter sectum puncto centrali, subrotundo.

PROPRIETAS. *Rad. rec. Odor* graveolens. *Sapor* graviusculus, vix amaricans; *fibrarum sapor* subdulcescens; *Odor* fortis, graveolens, validior quam radicis. *Siccatæ radicis Odor* intensius graveolens, quam recentis; *sapor* amaricans, gravis.

CHENOPODIUM BOTRYS. L. (*a*)
Botrys. Ph. Traubenkraut. Hroznowá bylina, neb hroznjček.

Chenopodium. *Cal.* 5 — phyllus, 5 — gonus. *Cor.* o. *Sem.* 1, lenticulare, ſuperum.

C. Botrys. Foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidi.

Hortenſis. Annua.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis rec.* erectus, vix pedalis, ramoſus, angulatus, ſtriatus, hirto — ſcaber. *Rami* alterni, erecti. *Folia* alterna, petiolata, oblonga, obtuſa, glabriuſcula, runcinata; lobis alternis, obtuſis, angulatis; ſinubus obtuſe excavatis.

PROPRIETAS. *Herb. rec. Odor* fragrans, fortis, graviuſculus, balſamicus, non ingratus. *Sapor* odori congruens, aromaticus. Recens planta manibus tractata, leviter viſcida eſt, manus inquinans; diutius olfacta, temulentiam excitat. *Sicc. odor* & *Sapor* conſimiles.

*CHENOPODIUM VULVARIA. L.
Vulvaria Ph. Stinkende Melte. Lebeda ſmradlawá.

C. Vulvaria. Fol. integerrimis romboideo — ovatis, flor. conglomeratis axillaribus.

Indigena. Annua. Off.

a) Chenopodium Ambroſiades loco Botryos potiſſimum uſurpatur, quod multi inſuper præſtantius æſtimant.

Off. Herba.

Forma. *Caulis* ramoſus & folioſus, procumbens. *Folia* lanceolata margine integro aut rariter dentato, polline farinaceo adſperſa, & albicantia. In ſumma planta ramuli florigeri breves ex aliis foliorum erecti, ad quos glomeruli rotundi florum ſeſſiles adhærent.

Proprietas. *Odor* & *Sapor* vehemens piſcium ſalſorum, ſubputridorum, qui digitis tenax adhæret.

Salsola sativa. L.

Salſola Col. 5 — phyllus. *Cor.* 0. *Caps.* 1 — ſperma, *Sem.* cochleatum.

S. Sativa. Herbacea diffuſa, fol. teretibus glabris, flor. conglomeratis.

Exotica. Annua.

Off. Soda Hiſpanica. Alicantiſches Aſchenſalz. Sůl alikantſká laubowá.

Forma. Maſſa ſolida, duriſſima, griſeo — nigricans, ſubcæruleſcens, ponderoſa, ſicca, ſonora fragmentis poris pertuſis.

Proprietas. *Odor* non ingratus; cum ſalivia fricata Souda, odor excitatur violaceus, alcali urinoſo mixtus. *Sapor* intenſe ſalſus, acris.

Præparata. Sal Soudæ depuratus.

 Gen-

Souda ex plurimis plantis marinis parari poteſt, ſed optima habetur e Salſolis & ſpeciatim e Salſola Kali & Sativa; at præ-

Gentiana lutea. L.

Gentiana. Ph. Enzian. Horec.

Gentiana. Cor. 1 petala. *Caps.* 2 — valvis, 1 — locularis; Receptaculis 2, longitudinalibus.

G. Lutea. Corollis subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis.

Indigena. Perennis.

Off.

præstat Salsola sativa, quoniam hæc planta verum alcali minerale semper præbet, etiam ubi locis a mari remotis conseritur, modo id in climate calido fiat, ut expertus est Cl. Abbas Mazeas; tametsi non diffitendum, ut Cel. Duhamel etiam observat, cum alcali vegetabili commixtum iri, si nimis longe a mari seratur. Ea vero Souda, quæ ex aliis plantis marinis conficitur, vix semper punctum fert. Ægyptii tamen satis bonam parant e Mesembryanthemo nodifloro, & Reaumuria vermiculata; Angli vero suam Soudam, sub nomine Kelp notam, e Fuco Ceranoide aliisque Fuci speciebus vesiculosis. Souda, quam præbet Salsola Kali. communissima nobis, estque illa massa uniformis, sicca, fragilis, sapore salso, obscure cærulea, nigricans; adulteratur, si loco Salsolæ Kali, Salsola Tragus sumatur. Salicornia Soudam dat griseo — cærulescentem, cineream, poris pertusam, fragilem, vix persistentem. Ceterum præstantissima censetur Souda alicantina, quæ e salsola sativa perficitur; hanc excipit Souda e Carthagena; Souda vero Bourdina mala est, ut recte observat Cl. Marcorelle, est vero hæc massa nigra, maculis viridibus variegata, humida, odore fœtido, deterrima tandem Souda, Varec dicta, quæ in Normandia ab omnibus plantis marinis, indiscrete sumptis, præcipue Fucis, paratur; immo illa in eo damnosa est, quod lintea maculat. Ita Bergius. Mat. Med.

Off. Radix.

Forma. *Sicc. Radix*. pedalis vel ultra crassitie digiti, sæpe pollicis, vel longe ultra, cylindrica, rugosa: rugis annularibus approximatis, fusca, subannulata. ramosa; *Parencymate* rubrolutescente.

Proprietas. Essentia.
Extractum.

Composita. *Radic*. Electuarium Diascordii. — Elect. seu Theriaca Andromachi. — Elect. seu Theriaca Diatesseron. Oleum Colocynthidis compositum, vulgo Habacucinum.

Extract. Elixirium Stomachicum Temperatum.

Gentiana centaurium. l.

Centaurium Minus. Ph. Tausendguldenkraut. Zemé zluč menssj.

G. Centaurium. Corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo pistillo simplici.

Indigenum. Annuum.

Off. Herba. Summitates floridæ.

Forma. *Folia* radicalia congesta, cuneiformi — oblonga, obtusa, integerrima, subsucculenta, in petiolos breves, desinentia, glabra, vix pollicaria, patentia; *caulina* opposita, sessilia, linearia, obtusa, erecta internodiis breviora.

Proprietas. *Siccat*. *Odor* debilis, vix ullus. *Sapor* amarissimus.

PRÆPARATA. Extractum.
Sal Alcalinus & Medius.
COMPOSITA. *Flor.* Extractum Amaricans.
Flor. c. Fol. Electuarium s. Theriaca Andromachi.
Herb. Essentia Absinthii composita. Pulvis Vitæ.
Herb. c. Flor. Oleum Viride.
Summit. Species Decocti Antifebriles.
Extract. Elixirium Stomachicum Temperatum.

ERYNGIUM CAMPESTRE. L.

Eryngium. Ph. Manstreuwurzel. Máčka hornj, mužská wjra.

Eryngium. *Flores* capitati. Receptaculo paleaceo.
E. Campestre. Floribus radicalibus amplexicaulibus pinnato — lanceolatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Radix* cylindrica, crassitie vix digiti, geniculis annularis, fuscescens; *parencymate* albo. *Siccata* fragilis.

PROPRIETAS. *Odor* leviter aromaticus; *Sapor* recentis dulcescens; *Sicc.* leniter aromaticus, parum dulcescens, subamaricans.

TORDYLIUM OFFICINALE. L.

Seseli Creticum. Ph. Cretischer Sesel, Sesel. Lomikámen řecký, salezowé, neb olesnikowé semeno.

Tor-

Tordilium. *Cor.* radiatæ, omnes hermaphroditæ. *Fructus* ſuborbiculatus, margine crenatus. *Involucra* longa, indiviſa.

T. Officinale. Involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis.

Indigenum. Annuum.

Off. Semen. *(a)*

FORMA. *Semina* linearia, craſſa, utrinque obtuſa, 3 lineas longa, hinc concava, angulis tribus parallelis, inde convexa, angulis 4 alatis, interjectis angulis 3 aliis, longe minoribus, ſingulo intra ſingulam alam.

PROPRIETAS. *Odor* aromaticus, gravis. *Sapor* aromaticus, amarus, fortis, in ſemina Cymini incidens.

DAUCUS CAROTA. L.

Daucus Sylveſtris. Ph. Gemeiner ≈ Vogelneſt. Dewworec domácý, oleſſnjk.

Daucus. *Cor.* ſubradiata. *Floſculi* diſci abortivi. *Fructus* pilis hiſpidus.

D. Carota, Seminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis.

Colitur. Biennis.

Off. Semen.

FOR-

a) Semen Seſeli Cretici, quod vulgo proſtat in officinis apud mercatores venale plurimum differt a ſemine Tordilli officinalis, licet utrumque ſemen ex planta umbellifera, quod etiam Murray in Aparat. Medic. T. I. jam adnotavit.

FORMA. *Semina rec.* ovalia, longitudine 1 vel 2 linearum, utrinque obtuſa, hinc plana, lineis tribus elevatis, minutim ciliatis, inde convexa margine & angulis 2 ſpinoſo — ciliatis, lineis 3 elevatis minutim ciliatis, ſingulis inter ſingulum angulum interjectis.

PROPRIETAS. *Semina* aromatica, calidiuſcula, amaricantia.

COMPOSITA. Semina IV Calida minora.

CONIUM MACULATUM. L.

Cicuta vulgaris. Ph. Schierling. Bolehlaw.

Conium. Involucella dimidiata, ſubtriphylla. *Fructus* ſubgloboſus, 5 — ſtriatus, utrinque crenatus.

C. Maculatum. Seminibus ſtriatis.

Indigenum. Bienne. (*a*)

Off. Radix. Herba. Flores.

FORMA. *Radix rec.* fuſiformis, craſſitie radicis Dauci, palmaris, ſæpe dotrantalis, alba ſtriis annularibus approximatis undique rugoſa, fibris & fibrillis ſparſis, odore inter Daucum & Chærophyllum, junior radix lacteſcit. *Caulis* tri vel quadripedalis, erectus, teres geniculatus, craſſitie digiti minoris, ſæpe pollicis, maculatus, ramoſus, diffuſus. *Rami* alterni, axillares e foliis, erecti, ramuloſi, folioſi. *Folia* ad genicula, alterna, utrinque glabra ſaturate viridia, lucidiuſcula, li-

nea

a) Etiam annua ſi Semina primo vere terræ comittantur.

neata, subtus pallidiora, erecto — patentia, tripinnata: pinnis oppositis, pinnulis pinnatis, pinnulis secundariis oppositis; inferioribus distinctis, sessilibus, pinnatifidis: laciniis oblongis, obtusis, inciso — seratis: superioribus confluentibus, simplicibus, inciso pinnatifidis: laciniis lanceolatis, obtusis; *folia* ramea minora, vaginis petiolata. *Petioli* communes teretiusculi, fistulosi, striati, glabri compressiusculi, latere superiore maculati, & inter pinnas infimas carinati; inter pinnas vero superiores sulcati: sulco longitudinali; basi vaginati: vagina concava, amplexicauli extus undique sulcata. *Umbellæ* terminales, pedunculatæ; priores axillares e ramulis; *universalis* 12 — vel 14 partita, concava, glabra; *partialis* plana, circiter 16 — partita. *Involucrum universale* tetraphyllum: foliis parviusculis, lanceolatis, acutis, margine inferne utrinque membranaceis, glabris deflexis; *partiale* triphyllum, latere exteriore situm, foliolis ovato — acutis, margine membranaceis, patentibus. *Perianth.* proprium vix ullum. Margo superus. COROLLA *universalis* æqualis, uniformis; flosculi omnes fertiles; *propria* alba, *petalis* 5, obcordatis, supra carinatis, sinu inflexo, patentibus. STAM. *Filam.* 5 subulata, alba patentia longitudine corollæ. *Anth.* didymæ. PIST. *Germen.* subrotundum, compressiusculum, viride, undique striato — angulatum:

an-

Forma. *Semina rec.* ovalia, longitudine 1 vel 2 linearum, utrinque obtuſa, hinc plana, lineis tribus elevatis, minutim ciliatis, inde convexa margine & angulis 2 ſpinoſo — ciliatis, lineis 3 elevatis minutim ciliatis, ſingulis inter ſingulum angulum interjectis.

Proprietas. *Semina* aromatica, calidiuſcula, amaricantia.

Composita. Semina IV Calida minora.

Conium maculatum. L.

Cicuta vulgaris. Ph. Schierling. Bolehlaw.

Conium. Involucella dimidiata, ſubtriphylla. *Fructus* ſubgloboſus, 5 — ſtriatus, utrinque crenatus.

C. Maculatum. Seminibus ſtriatis.

Indigenum. Bienne. (*a*)

Off. Radix. Herba. Flores.

Forma. *Radix rec.* fuſiformis, craſſitie radicis Dauci, palmaris, ſæpe dotrantalis, alba ſtriis annularibus approximatis undique rugoſa, fibris & fibrillis ſparſis, odore inter Daucum & Chærophyllum, junior radix lacteſcit. *Caulis* tri vel quadripedalis, erectus, teres geniculatus, craſſitie digiti minoris, ſæpe pollicis, maculatus, ramoſus, diffuſus. *Rami* alterni, axillares e foliis, erecti, ramuloſi, folioſi. *Folia* ad genicula, alterna, utrinque glabra ſaturate viridia, lucidiuſcula, linea

a) Etiam annua ſi Semina primo vere terræ comittantur.

neata, ſubtus pallidiora, erecto — patentia, tripinnata: pinnis oppoſitis, pinnulis pinnatis, pinnulis ſecundariis oppoſitis; inferioribus diſtinctis, ſeſſilibus, pinnatifidis: laciniis oblongis, obtuſis, inciſo — ſeratis: ſuperioribus confluentibus, ſimplicibus, inciſo pinnatifidis: laciniis lanceolatis, obtuſis; *folia* ramea minora, vaginis petiolata. *Petioli* communes teretiuſculi, fiſtuloſi, ſtriati, glabri compreſſiuſculi, latere ſuperiore maculati, & inter pinnas infimas carinati; inter pinnas vero ſuperiores ſulcati: ſulco longitudinali; baſi vaginati: vagina concava, amplexicauli extus undique ſulcata. *Umbellæ* terminales, pedunculatæ; priores axillares e ramulis; *univerſalis* 12 — vel 14 partita, concava, glabra; *partialis* plana, circiter 16 — partita. *Involucrum univerſale* tetraphyllum: foliis parviuſculis, lanceolatis, acutis, margine inferne utrinque membranaceis, glabris deflexis; *partiale* triphyllum, latere exteriore ſitum, foliolis ovato — acutis, margine membranaceis, patentibus. *Perianth.* proprium vix ullum. Margo ſuperus. COROLLA *univerſalis* æqualis, uniformis; floſculi omnes fertiles; *propria* alba, *petalis* 5, obcordatis, ſupra carinatis, ſinu inflexo, patentibus. STAM. *Filam.* 5 ſubulata, alba patentia longitudine corollæ. *Anth.* didymæ. PIST. *Germen.* ſubrotundum, compreſſiuſculum, viride, undique ſtriato — angulatum;

an-

angulis tuberculis. *Nectarium* ſuperum, album, planum, germen ſuperne tegens, crenatum. *Styli* 2, albi, erecti; patentes. *Stigmata* obtuſa.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* plantæ totius fœtidus, murinus; *ſiccat.* fortior. *Sapor. rec.* leniter aromaticus, herbaceus, ſubnauſeoſus.

PRÆPARATA. Aqua.
Conſerva.
Extractum.

COMPOSITA. *Pulv.* & *Succ.* Emplaſtrum de Cicuta ſimplex & compoſitum.
Extract. Emplaſtrum Diabotanon.

ATHAMANTA CRETENSIS. L.

Daucus Creticus. Ph. Cretiſch = Vogelneſt. Deywotec kretſký.

Athamanta. Fructus ovato — oblongus, ſtriatus, *Petala* flexa, emarginata.

A. Cretenſis. Foliolis linearibus planis hirſutis, petalis bipartitis, ſeminibus oblongis hirſutis. Indigena. Perennis.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* ſubulata, 2 lineas longa baſi obtuſa, apice ſtilo perſiſtentia coronata, hinc ſulco concavo notata, inde ſemiteretia, tomentoſa.

PROPRIETAS. *Odor* aromaticus, gratus, fere Origani. *Sapor* gratus aromaticus, in Daucum incidens, calidiuſculus.

COMPOSITA. Electuarium ſeu Theriaca Andromechi.

FE-

FERULA ASA FOETIDA. L.

Asa Fœtida. Ph. Stinkender Asand, Teufels-dreck. Cjerrowo howno.

Ferula. Fructus ovalis, compresso — planus, striis utrinque 3.

F. Asa fœtida. Foliis alternatim sinuatis obtusis.

Exotica. Perennis.

Off. Gummi — Resina.

FORMA. Gummi — Resina in glecis, plastica, conflata e variis gummis lucidis, albidis, lutescentibus vel rubicundis.

PROPRIETAS. *Odor* fœtidissimus, aliaceus. *Sapor* amaricans, acris, mordens, diutissime inhærens, etiamsi os faucesque compluries eluantur aceto vini vel spiritu vini diluto. *Masticata* primum plastica, dein sensim soluta: saliva lactea, instar cremoris lactis, linguam & palatum albo tingente.

COMPOSITA. Aqua Hysterica fœtida.

LIGUSTICUM LEVISTICUM. L.

Levisticum. Ph. Liebstöckel. Apich welikỳ, libecek.

Ligusticum. *Fructus* oblongus, 5 — sulcatus, utrinque. *Corollæ* æquales. *Petalis* involutis integris.

L. Levisticum. Foliis multiplicibus: foliolis superne incisis.

Colitur. Perenne.

Off.

Off. Radix. Semen.

FORMA. *Radix rec.* fusiformis, dodrantalis vel ultra, extus feruginosa, undique notata rugis parvis reticulatis, apice fusco — rugosa, fibrosa. *Parencyma* carnosum, album, transversaliter sectum centro medullari ampliore, lutescente, ovato undique dentato, versus marginem striato: striis obsoletis; cinctum corticali parte alba, obsolete striata; succo limpidiusculo. *Semina* ovalia, lineas fere 2 longa, subincurva, basi truncato — retusa, apice tuberculo piramidali terminata, glabra, hinc plana, carina obsoleta, inde convexa, dorso angulis tribus parallelis, latere undique margine subulato.

PROPRIETAS. *Radic. rec. Odor* fragrans, fortis, gravis in odorem Meliloti cærulei incidens sed longe gravior, & ingratior. Sapor fortis, gravis, calidus, Angelica ingratior. *Semin.* siccat. *Odor* fortis aromaticus, graviusculus fere Angelicæ. Sapor fortior calidus, aromaticus Angelicæ ingratior.

COMPOSITA. *Rad.* Aqua Hysterica Fœtida.

ANGELICA ARCHANGELICA. L.

Angelica Sativa. Ph. Angelike, Heil. Geistwurzel. Angelika, archangelika.

Angelica. Fructus subrotundus, angulatus, solidus, stilis reflexis. *Corollæ* æquales: petalis incurvis.

A. Archangelica. Foliorum impari lobato.

Indigena. Biennis.

Off. Radix. Semen.

Forma. *Radix rec.* fusiformi — cylindrica crassitie pollicis vel longe ultra pro varietate soli & ætatis, rugosa, cinereo — rufescens, undique instructa fibris elongatis, teretibus, descendentibus, crassis. *Parencym. rec.* carnosum, albidum, lactescens: succo lutescente; *sicc.* subspongiosum. *Semina* ovalia, utrinque obtusa, 2 vel 3 lineas longa, pallido cinerea, hinc plana sulco longitudinali, inde convexa, dorso elevato: angulis tribus parallelis, latere undique marginato.

Proprietas. *Radic. Odor* aromaticus, fragrans, gratus. *Sapor* aromaticus, fortis. *Masticata* primum subdulcescens, mox graviusculus, calidus acris; sub masticatione salivam sollicitat, mordet in lingua & faucibus cum calore. *Seminum Odor* aromaticus, fragrans, gratus. *Sapor* calidus, aromaticus.

Præparata. Extractum Spirituosum.

Compositа. *Rad.* Aqua Melissæ composita — Theriacalis.

Electuarium, seu Theriaca Andromachi.

Spiritus Aromaticus

Sem. Tinctura, sive Balsamum Comentatoris.

Syrupus Emeticus.

Sison ammi. L.

Ammi Verum. Ph. Ammey. Ammi.

Sison. Fructus ovatus, ſtriatus. *Involucra* ſub 4—philla.

S. Ammi. Foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis ſetaceis: ſtipularibus longioribus.

Indigenum. Annuum.

Off. Semen.

Forma. *Semen* linea breviora, ovata, utrinque obtuſa, undique ſtriata, bipartibilia; plerumque partita occurrunt, hinc plano—concava, inde convexa, quinquangulata.

Proprietas. *Odor* aromaticus, gratus. *Sapor* aromaticus, amaricans, calidus.

Composita. Electuarium, ſeu Theriaca Andromachi.

Semina IV. Calida minora.

Sison amomum. L. (*a*)

Amomum. Ph. Amömlein. Wſſecko kořenj.

S. Amomum. Foliis pinnatis, umbellis erectis.

Exoticum. Arbor.

Off. Semen.

Forma. *Semen* rotundum ex fuſco nigricans; piperis imo piſi ſæpe magnitudine, in

Pro-

a) Semen Amomi, quod officinæ noſtræ habent omnino differt a ſemine plantæ umbeliferæ, qualis eſt Siſon Amomi Linnei; probabilius ad Myrti ſpeciem refertur ab aliis.

ſummo umbilicatum, includens ſub tenui pellicula & ſubſtantia fungoſa, binos acinos nigros, parvos tenui membrana veſtitos.

PROPRIETAS. *Odor* & *Sapor* ad caryophyllum accedit.

COMPOSITA. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

BUBON GALBANUM. L.

Galbanum. Ph. Gummigalban. Galbánum. ꝗ

Bubon. Fructus ovatus, ſtriatus, villoſus.

B. Galbanum. Foliolis rhombeis dentatis glabris ſtriatis, umbellis paucis.

Exoticum. Frutex.

Off. Gummi — Reſina.

FORMA. Gummi — reſina in maſſa, plaſtica inter digitos ductilis inſtar ceræ, digitis tenaciter adhærens, facie reſinoſa, fuſco — cineraſcente, fragmentis ſplendentibus inſtar colophonii. Occurrit *varietas* magis pallida, ſicca fragilis: fragmentis maculoſis, parum ſplendentibus, digitis, quibus tractatur, vix adhærens.

PROPRIETAS. *Odor* gravis, ad Ammoniacum accedens. *Sapor* gravis amaricans. *Maſticata* plaſtica vix ſolubilis, ſed fere ut cera cum ſaliva circumvolubilis, & diutius in ore retenta palato adhæret.

COMPOSITA. Aqua Hyſterica Fœtida.

Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Emplastrum Diabotanon. — Diachylon cum gummatibus. — de Galbano Crocatum. — Malacticum. — Oxycroceum. — Filii Zachariæ a vulgo de Spermate Ceti.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

CUMINUM CYMINUM. L.

Cyminum. Ph. Römischer Kümmel. Kmjn.

Cuminum. Fructus ovatus, striatus; *Umbellulæ* 4: *Involucra* 4 — fida.

Exoticum. Annuum.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* ovali — linearia, hinc plano concaviuscula, inde convexa, undique sulcata, scabrida, duas lineas longa, fusco — cinerea. Sæpe fructus integri occurrunt, h. e. semina duo composita.

PROPRIETAS. *Odor* fortis gravis. *Sapor* aromaticus, in Carum incidens, sed acutior, gravior, ingratus.

PRÆPARATA. Oleum destillatum.

COMPOSITA. *Sem.* Aqua Hysterica fœtida.
Emplastrum Diabotanon.
Semina IV. Calida majora.
Suppositoria Composita.
Ol. Emplastrum de Labdano.
Unguentum Carminativum.

ATHA-

ATHAMANTA MEUM. L. (a)

Meum. Ph. Bärwurzel. Kopernjk.

Æthusa. Involucella dimidiata, 3 — phylla, pendula. *Fructus* striatus.

Æ. Meum. Foliis omnibus multipartito setaceis. Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Radix sicc.* fusiformi — cylindrica apice ramosa, crassitie digiti minoris, fusco cinerea, rugis transversalibus, annularibus approximatis, vertice instructa setis numerosis, fasciculatis, penicelli instar rasorii; *parencymate* ferrugineo.

PROPRIETAS. *Odor* & *Sapor* aromaticus, gravis cum suavitate, fere Dauci Carotæ.

CORIANDRUM SATIVUM. L.

Coriandrum. Ph. Koriander. Koryandr, neb Koliandr.

Coriandrum. Cor. radiata: *Pet.* inflexo — emarginata. *Involucr.* universum, 1 — phyllum. Partialia dimidiata. *Fructus* sphericus.

C. Sativum. Fructibus globosis.

Colitur. Annuum.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* globosa, apice umbilicata, minutim rugosa, undique sulcato — angulata, linea paullo longiora.

a) Hodie Æthusa Meum L.

PROPRIETAS. *Odor rec.* graveolens, fœtidiusculus. *sicc. Odor* aromaticus, graviusculus. subgratus; *Sapor* congruens.

COMPOSITA. Aqua Carminativa communis & Regia. — Melissæ composita.

Elixirium Salutis.

SCANDIX CEREFOLIUM. L.

Cerefolium. Ph. **Kerfelkraut. Kerblik, trebule.**

Scandix. Cor. Fructus subulatus. *Petala* emarginata. *Flosculi* disci sæpius masculi.

S. Cerefolium. Seminibus nitidis ovato — subulatis, umbellis sessilibus lateralibus.

Hortense. Annuum.

Off. Herba. (*a*)

FORMA. *Rami* ad genicula, solitarii, alterni, erecto — patentes, cauli similes, ad singula genicula inferne subpubescentes. *Folia* ad genicula, alterna petiolata, utrinque glabra, tenera, duplicato — pinnata: pinnis remotis: pinnulis propriis ovatis, acutiusculis, inciso pinnatifidis, margine minutissimo ciliatis; costa subtus pubescente: pilis rectis, albis. *Petiol.* comunes striati, canaliculato — vaginati, subamplexicaules, latere utrinque excurrente in membranam tenuissimam, ciliatam; partiales teretiusculi, subtriquetri, supra canaliculati, glabri.

PRO-

a) Herbæ recentis etiam usus copiosus.

PROPRIETAS. *rec. Odor* gratus balſamicus, debilis niſi fricetur; in ſiccata penitus evaneſcit. *Sapor* aromatico balſamicus, ad Aniſum accedens, gratus. *Sicc.* debilior.

COMPOSITA. Pulvis Specierum pro Cucupha.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM. L.

Imperatoria. Ph. Meiſterwurzel. Wſſedobr.

Imperatoria. Fructus ſubrotundus compreſſus, medio gibbus, margine cinctus. *Petala* inflexo emarginata.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec.* carnoſo — tuberoſa, ovalis, bipollicaris, rugis elevatis fuſcis, & ſulcis annularibus glabris profundis, proferens ramos undique excreſcentes, ſimplices, palmares teretes, craſſitie pennæ anſerinæ, geniculatos, ſæpe ramoſos, albos, erectos, apice deſinentes in tuber, primario ſimile, ſubrotundum, vel cylindricum, ſæpe polliferum. Fibræ radicantes filiformes e geniculis exeuntes. Radix ſtolones repentes ſub terra edit, ſæpe pedales, cylindricos, tandem in folia excreſcentes. *Parencyma* carnoſum, tranſverſaliter ſectum centro medulari ampliſſimo, orbiculato, centro ſolido, peripheria punctata: punctis lacunoſis; circumdato annulo fuſco; corticali parte cinerea. Radix recens ſecta *lac.* fun-

fundit albidum, sublutescens, amarum, e punctis lacunosis parencymatis proveniens.

PROPRIETAS. *rec. radicis Odor* gravis. *Sapor* gravis, acris, amarus; *masticata* acris & calida sentitur, fauces & linguam pungit.

COMPOSITA. Aqua Theriacalis.
Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

*PASTINACA SATIVA. L.

Pastinaca. Ph. Pasternak. Passtrnák.

Pastinaca. Fructus ellipticus, compresso—planus. *Petala* involuta, integra.

P. Sativa. Foliis simpliciter pinnatis.

Hortensis. Biennis.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* ovalia, utrinque compresso—plana obtuso—rotundata, utrinque marginata, glabra, hinc concaviuscula, subcarinata, inde striata.

PROPRIETAS. *Rec. Semina. Odor* debilis, gravis; *Sapor* intensius gravis, empyreumaticus.

PASTINACA OPOPANAX. L.

Opopanax. Ph. Gummiopopanax. Opopanax, neb gummi panaxowé.

P. Opopanax. Foliis pinnatis: foliolis basi antica excisis.

Exotica. Perennis.

Off. Gummi—Resina.

FORMA. *Gummi — resina* in glebulis *s.* frustis, rubro — lutescens; massa conglomerata e grumulis & glandibus, friabilis.

PROPRIETAS. *Odor* hujus Gummi gravis ad G. ammoniacum accedens. *Sapor* amaricans, diu inhærens, nauseosus; *masticatum* inter dentes primum friabile, dein solubile, Levisticum referens: saliva lactea.

COMPOSITA. Aqua Hysterica Fœtida.
Electuarium seu Theriaca Andromachi.
Emplastrum Diachylon cum gummatibus.

ANETHUM GRAVEOLENS. L.

Anethum. Ph. Dille. Kopr zahradnj.

Anethum. *Fructus* subovatus, compressus, striatus. *Petala* involuta, integra.

A. Graveolens. Fructibus compressis.

Hortense. Annuum.

Off. Herba, etiam recens. Semen.

FORMA. *Rec.* *Caules* sæpius plures ex una radice, bipedales, glabri, undique striati: striis parallelis, alternis albis, glabris, rore glauco & tenui tinctis, alternis rubicundis, punctatis; geniculatius, parcius ramosus: ramis alternis, erectis, remotis. *Folia* ad genicula, alterna, glabra, petiolata, dublicato — pinata: pinis pinatifidis: laciniis subulatis, acutis, supra planiusculis. *Petioli*

tioli teretes, viridi — rubicundi, ſtriis albis, baſi vaginati: vagina lanceolata, concava ſtriata, arcta, baſi amplexicauli.

PROPRIETAS. *Foliorum rec. Odor* gratus fragrans; contuſæ vero herbæ graviuſculus, vix gratus. *Sapor* aromaticus, odori congruens, gratus; *maſticata* folia calidiuſcula, ſatis tenera, ſentiuntur, ſaliva rubicundo — virideſcente. *Semina* aromate herbæ, odore item & ſapore, at magis calida.

PRÆPARATA. Oleum Coctum. — Deſtillatum. Aqua deſt. (*a*)

COMPOSITA. *Herb. rec.* Oleum Viride.
Unguentum Carminativum. — Nervinum.
Semin. Aqua Carminativa Communis & Regia.
Ol. deſt. Oleum Viride.
Pilulæ Anethinæ.
Unguentum Carminativum.

ANETHUM FOENICULUM. L.

Fœniculum Dulce. Majus. Ph. **Römiſcher Fenchel. Fenykl, Wlaſký neb Rzjmſký, neb ſladký kopr.**

A. Fœniculum. Fructibus ovatis.

Hortenſe. Bienne.

Off. Semen.

FOR-

a) Aquæ Anethi apud nos uſus frequens a vulgo, eam nobis fecit officinalem.

FORMA. *Semina*, ovali—linearia, teretiusćula, undique profunde sulcata, bipartibilia, 2 lineas longa.

PROPRIETAS. *Seminum odor* aromaticus, svavis; *Sapor* aromaticus, dulcescens, calidiusculus, gratus.

PRÆPARATA. Aqua destillata.
Oleum destillatum.
Syrupus.

COMPOSITA. *Sem.* Aqua Carminativa Communis & Regia.
Electuarium Pectorale. — Elect. s. Theriaca Andromachi.
Pulvis Infantum Absorbens. — Vitæ.
Semina IV. Calida Majora.
Species Decocti Aperitivi. — Lignorum. — pro Potu Ordinario.
Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.
Suppositoria Composita.
Trochisci Bechici nigri.
Aq. Looch sanum ac expertum.
Ol. Unguentum Carminativum.
Syrup. Pilulæ Cochiæ.

ANETHUM FOENICULUM, *varietas prioris* L.

Fœniculum vulgare, minus. Gemeiner Fenchel. Kopr.

Hor-

Hortenſe. Perenne ſive Bienne *Phar. Svec.* aut Trienne *Bergi.* (*a*)

Off. Rad. Herba. Semen.

Forma. *Radix rec.* tenera fuſiformis, alba; adulta ramoſa. *Caules* plures ex una radice 3—vel 4—pedales, ſæpe ultra, erecti; teretes, undique ſtriati: ſtriis rubro—viridibus, longitudinalibus, alternis glabris, dilutioribus, alternis punctatis; rore glauco tincti, geniculati, ramoſi: ramis alternis. *Folia* adgenicula ſaturate viridia, glabra, diffuſa, bipinnata: pinnis pinnatifidis: laciniis filiformibus, acutis, ſupra ſulco longitudinali, ſubtus ſtriis tribus remotis. *Petioli* teretes undique ſtriati, baſi vaginati: vagina cylindrica, concava, undique ſulcata, baſi amplexicauli. *Semina* ovali—linearia, teretiuſcula, undique profunde ſulcata, bipartibilia, 2 lineas longa (ſunt exiliora, quam dulcis, bruna magiſque aromatica Murray Mat. Med.)

Proprietas. *Rec. folior. Odor* debilis, niſi fricata fuerint, tunc vero fragrans, aromaticus, gratus. *Sapor* aromaticus, ſubdulceſcens, debilior; maſticata ſubſucculenta, comminuuntur, ſaliva rubro—viridi. *Radix rec.* & tenera, ſecundum aroma & ſaporem, herbæ conformis, ſed gratior & dulcior; *adulta* vero radix debiliter aromatica; *Seminum Odor* aromaticus, dulceſcens, calidiuſculus, gratus. Com-

a) Quod etiam nobis non raro obſervatur.

Composita. *Rad.* Radices V. aperientes, hæ pro Speciebus Decocti aperitivi & Syrupo rad. quinque aperitivo.

Herb. Aqua seu Balsamum Embryonis

—Vulneraria cum Vino.

Herb. rec. Unguentum Carminativum.

Carvum carvi. L.

Carvi. Ph. Kümmel, Küm. Kmjn laučnj.

Carvum. *Fructus* ovato—oblongus, striatus. *Involucrum* 1—phyllum. *Petala* carinata, inflexo—emarginata.

Indigenum. Bienne. (*a*)

Off. Semen.

Forma. *Fructus rec.* ovatus, compressus, utrinque obtusus, glaber, undique sulcatus, coronatus stylis duobus persistentibus, divoricatis; bipartibilis in *Semina* parviuscula, lineæ longitudine, vel paulo ultra, subincurva, hinc plano concaviuscula, carinata, inde convexa, quinquangulata: angulis pallidis glabriuscula, fusco brunea, utrinque obtusa.

Proprietas. *Odor* aromaticus, subgraviusculus. *Sapor* aromaticus, calidus, satis gratus.

Præparata. Aqua.

Oleum destillatum.

Spiritus.

Composita. *Sem.* Aqua Carminativa communis, & Regia. Eli-

a) Sæpe perennat.

Elixirium Salutis.
Essentia Carminativa.
Pulvis Vitæ.
Semina IV. Calida Majora.
Suppositoria Composita.
Ol. Unguentum Carminativum.

PIMPINELLA SAXIFRAGA. L.

Pimpinella Alba. Ph. Weißbibernel. Bedrnjk.

Pimpinella. Fructus ovato — oblongus. *Petala* inflexa. *Stigm.* subglobosum.

P. Saxifraga. Foliis pinnatis: Foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus.

Indigena. Perennis.

Off. Radix. Herba (*a*)

FORMA. *Radix rec.* cylindrica, subfusiformis, bi — vel tripolicaris vel ultra, undique alba, striis anularibus, approximatis rugosa, partius fibrillosa; *parencymate* subcarnoso, albo post sectionem transversalem cetro medullari orbiculato, radiato striato; obducto disco albo, poris pertuso.

PROPRIETAS. *Radicis rec. Odor* fragrans, subgraviusculus. *Sapor* amaricans primum, *masticata* radix subdulcescens, aromatica, calida, fauces linguamque calefaciens.

COMPOSITA. *Rad.* Pulvis Stomachicus Birkmanni. *Herb.*

a) Saltem quoniam cum ceteris componat Aquam Vulnerariam cum aceto.

Herb. Aqua Vulneraria cum aceto.

PIMPINELLA ANISUM. L.

Anisum Vulgare. Ph. Gemeiner Aneis. Anyz.

P. Anisum. Foliis radicalibus trifidis incisis.

Hortense. Annuum.

Off. Semen.

FORMA. Semina pedunculata, exquisite ovata bipartibilia, minutim villosa, striata, linea vix longiora.

PROPRIETAS. *Odor* aromaticus, svaveolens. *Sapor* aromaticus dulcescens, calidiusculus, gratus.

PRÆPARATA. Aqua.
Oleum destillatum.
Spiritus.

COMPOSITA. *Sem.* Aqua Carminativa Communis, & Regia.
Electuarium Pectorale. — Elect. seu Theriaca Andromachi.
Elixirium Salutis.
Pulvis Vitæ.
Semina IV. Calida Majora.
Species Decocti Aperitivi. — Decocti Lignorum.
Spiritus Aromaticus. — Balsamicus vulgo Schauerianus. — Salis Ammoniaci Anisatus.
Trochisci Bechici nigri.
Ol. Balsamum Sulphuris Anisatum.
Pulvis Purgans.

Spi-

Spirit. Eſſentia Carminativa.

Pilulæ Anethinæ. — Balſamicæ Mortoni.

Apium petroselinum. L.

Petroſelinum. Ph. Peterſilie. Petržel.

Apium. Fructus ovatus, ſtriatus. *Involuc.* 1 — phyllum. *Petala* æqualia.

A. Petroſelinum. Foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis.

Colitur. Bienne.

Off. Radis. Semen.

Forma. *Radix rec.* fuſiformis, alba, ſpithamæa, extus rugis annularibus approximatis, *parencymate* albo, carnoſo, poſt ſectionem tranſverſalem centro medullari orbiculato, radiato — ſtriato, obducto diſco obſolete ſtriato — radiato corticali parte teneriore, albidiore. *Semina* lineæ longitudine, hinc plana, inde convexa, quinquangulata.

Proprietas. *Rad. rec. Odor* & *Sapor* leniter aromatici; *ſiccat.* fragilis, ſubfriabilis; *maſticata* in ore emollitur, ſapore dulci, levius aromatico. *Semina* aromatica, calida.

Composita. *Rad.* Radices V. aperientes.

Sem. Electuarium, ſeu Theriaca Andromachi.

Pulvis Vitæ.

Apium graveolens. L.

Apium. Ph. Eppig, Zeller, Apich. Mirjk.

A. Graveolens. Foliis caulinis cuneiformibus. Colitur. Bienne.

Off. Radix. Semen.

Forma. *Radix rec.* alba, fusiformis, subovata; ramosissima: ramis simplicibus; *parencymate* carnoso albo, firmo, fragiliusculo, post sectionem transversalem marmorato. *Semina* parviuscula, hinc plano — concava, inde convexa, quinquangulata: angulis tribus intermediis majoribus.

Proprietas. *Radix rec.* *Odor* aromaticus, intensior, subgraveolens; *Sapor* subdulcescens subaromaticus. *Siccata* radix fragilis, magis calida, magis graveolens: *masticata* duriuscula, tandem emollitur, sapore graviusculo. *Seminum.* odor gravis; Sapor ingratus amaricans, calidus.

Composita. *Rad.* Radices V. aperientes.

Sem. Emplastrum de Meliloto.

Semina IV. Calida Minora.

ORDO

TRIGYNIA.

Rhus coriaria. L.

Sumach. Ph. Sumach, Gärberbaum. Sumach.

Rhus

Rhus. *Cal.* 5 — partitus. *Petala* 5. *Bacca* 1 — sperma.

R. Coriaria. Foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus subtus villosis.

Indigena. Arbor.

Off. Semen.

FORMA. *Semen* unicum lentiforme, subrotundum, compressum, glabrum; capsulæ adnatum hilo.

PROPRIETAS. *Semina sicca* dura.

SAMBUCUS EBULUS. L.

Ebulus. Ph. Attig. Chebdj.

Sambucus Cal. 5 — partitus. *Cor.* 5 — fida. *Bacca* 3 — sperma.

S. Ebulus. Cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix raro. Fructus recens. Semen.

FORMA. *Radix rec.* teretiuscula, repens subcarnosa, elongata, crassitie digiti vel ultra, alba. *Baccæ* orbiculatæ, apice depressæ, umbilico parvo 5 — fido, adpresso, undique glabræ nitidiusculæ, nigricantes, magnitudine seminis Pisi minoris; *parencymate* succoso, purpureo, trispermo. *Semina* undique rugosa, ovata, subtrigona, dorso convexa, antice subcarinata.

PROPRIETAS. *Radicis sicc. Odor* debilis; *Sapor* aromaticus, ingratus, nauseosus; *masticata*

sub-

ſublignea ſentitur. *Baccar. rec. Odor* nullus; *Sapor* acidulo — amaricans; *maſticatæ* ſuccoſæ, ſaliva purpurea. *Succus* baccarum recens, chartæ albæ illinitus, illam colore pulchre violaceo inficit.

PRÆPARATA. *Fruct. rec.* Roob.

COMPOSITA. *Sem.* Extractum Panchymagogum.

Roob. Electuarium Purgans, ſive Hydragogum.

SAMBUCUS NIGRA. L.

Sambucus. Ph. Holder, Holunder, Flieder, Holler. Bez.

S. Nigra. Cymis 5 — partitis, caule arboreo.

Indigenus, Frutex excelſior arboreſcens.

Off. Cortex interior. Flos. Fructus etiam recens.

FORMA. *Caulis rec.* fruticoſo — arborea, *Rami* cinerei, ſcabridi: punctis ſparſis, elevatis: *Ramuli* oppoſiti, teretes, geniculati, virideſcentes erecti, ſcabridi. *Flores* albi, ſeſſiles & pedicellati CAL. *Perianth.* ſuperum, parvum, album, 5 — dentatum: laciniis ovatis, obtuſis. *Tubus* nullus. *Stam. Filam.* 5, alba infra ſinus corollæ adnata, ſubulata, corollæ longitudine, patentiſſima. *Anth.* luteæ, didymæ. PIST. *Germen* inferum turbinatum, glabrum, album; ſuperum ovatum, glabrum niveum, longitudine calycis. *Styli* nulli. *Stigma-*

gmata 3. ſubrotunda, carnoſa, alba. *Baccæ* magnitudine ſeminis Piſi minoris, ovales nigræ, nitidiuſculæ, apice obtuſæ, ſubmucronatæ, umbilicatæ: umbilico convexo, ſtellato: radiis quinque obtuſis; *parencymate* ſuccoſo, triſpermo.

Poprietas. *Corticis intermed. rec. Color* viridis, *Sapor* primum dulceſcens, dein amaricans, acris, nauſeoſus. *Florum rec. Odor* fragrans, fœtidiuſculus, ſubnauſeoſus.; *Sapor* amaricans, odori congruens; *ſicc.* flores conſimiles, fere fortiores. *Baccar. rec. Odor* debilior; *Sapor* acidulus; *maſticatæ* non ingratæ, ſuccoſæ, ſaliva purpuraſcente. *Succus* baccarum virideſcenti — rubicundus, non tingens; ſed pulpa mollis, tenuis, corticem baccæ latere interiore obliniens, charta alba fricatus, illam, pariter ac manus quibus tractatur, violaceo colore inficit pertinaciter inhærente.

Præparata. Acetum.

Aqua florum.

Roob.

Composita. *Flor.* Pulvis Fumalis Arthriticus.

Flor. rec. Unguentum Carminativum.

Fruct. Electuarium Lenitivum, ſive Tamarindorum. — Purgans, ſive Hydragogum.

Ta-

TAMARIX GERMANICA. L. (a)
Tamariſcus. Ph. Tamarisken. Tamaryſſk.
Tamarix. *Col.* 5. — partitus. *Pet.* 5. *Caps.* 1 — locularis, 3 — valvis. *Sem.* papposa.
T. Germanica. Floribus decandris.
Indigena. Frutex.
Off. Cortex radicis.

FORMA. *Cortex ſicc.* extus fuſco — cineraſcens, glabriuſculus, ſemiconvolutus, latere interiore fuſco — rufeſcens, lineolis elevatis, abruptis, undique ſcaber, parum craſſus.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* vix ullus. *Sapor* leviter auſterus; *maſticatus* ſalivam rubro tingit.

COMPOSITA. Species Decocti aperitivi.

ORDO
PENTAGYNIA.

LINUM USITATISSIMUM. L.
Linum. Ph. Lein. Len.
Linum. *Cal.* 5 — phyllus. *Petala* 5 *Caps.* 5 — valvis, 10 — locularis. *Sem.* ſolitaria.
L. Uſitatiſſimum. Calycibus capſulisque mucronatis,

a) Juxta Bergium in Svecia officinalis eſt Tamarix Gallica.

natis, petolis crenatis, foliis lanceolatis, alternis, caule ſubſolitario.

Colitur. Annuum.

Off. Semen.

Forma. *Semina* ovato—oblonga, compreſſa, apice ſenſim attenuata, obtuſiuſcula lævia, nitida, linea paulo longiora, olivacea.

Proprietas. *Odor* vix ullus; *Sapor* fatuus, *maſticata* mucilaginoſa.

Præparata. Mucilago? (*a*)
Oleum Preſſum.

Composita. *Sem.* Emplaſtrum Malacticum
Species Emollientes.
Mucilag. Emplaſtrum Diachylon.
Unguentum de Althæa.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA

ORDO

MONOGYNIA.

✠ *Allium sativum. L.*
Allium. Ph. Knoblauch. Czesnek

Allium

a) Hujus in Pharmacopea uſus.

Allium. *Cor.* 6 — partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congesta. *Caps.* supera.

A. Sativum. Caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis.

Colitur. Perenne.

Off. Radix sive Bulbi recentes.

Forma. *Bulbus rec.* subrotundus obvelatus tunica integra, quadrivalvis, sicca, chartacea, alba; conflatus ex bulbis plurimis, duplici vel triplici ordine fasciculorum: singulo fasciculo propria tunica obvelato. *Bulbili* circiter 5 vel 6 subæquales, paralelli, oblongi, incurvi, acuti, hinc plani, inde convexi, singuli propria tunica involuti, bivalvi: valvula exteriore chartacea; interiorie tenui. Bulbuli in fasciculo supremo, membrana vaginiformi interstincta. *Parencyma* album, carnosum, spongiosum, subvariegatum, succo limpidissimo prægnans.

Proprietas. *Rec. Bulb.* *Odor* fragrans, validus, graveolens. *Sapor* subdulcescens, acris; masticatus comminuitur, habitu oris fragrantissimo diu inhærente.

Compositа. Acetum Antisepticum.

Lilium candidum. L.

Lilium Album. Ph. Weiße Lilie. Lilium bjlé.

Lilium. *Cor.* 6 — petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. *Caps.* valvulis pilo cancellato connexis.

L. Candidum. Foliis ſparſis, corollis campanulatis: intus glabris.
Hortenſe. Perenne.
Off. Flores.

FORMA. *Flores* plures terminales, alterni, pedunculati, cernui. *Bracteæ* lineares, acutæ, carinatæ, in medio pedunculi ſolitariæ. CALIX nullus. COR. nivea, campanulato — turbinata, trigona, hexapetala: petalis lanceolatis, obtuſis, erectis apicibus revoluto—patentibus, inferne attenuatis; tribus alternis paulo anguſtioribus, margine utrinque erecto concaviuſculis; tribus aliis alternis planis, paulo majoribus, extus carinatis, juxta carinam utrinque longitudinaliter ſulcata, intus longitudinaliter canaliculata. STAM. *Fil.* 6, ſubulata, alba, erecta, corolla breviora *Anth.* ſubcylindricæ, incumbentes, luteæ. PIST. *Germen.* cylindrico — trigonum, obtuſum, glabrum, viride, ſexulcatum. *Stylus* cylindricus, albo — virideſcens, apice incraſſatus, trigonus, longitudine corollæ. *Stygma* clavatum, trigonum, obtuſum, tomentoſum.

PROPRIETAS. *Florum rec. Odor* fragrans, validus, temulentus. *Sapor* ſubdulceſcens, glutinoſus; petala rec. *maſticata*, tenera, lubrica. *Sicc.* flores inodori.

PRÆPARATA. Oleum Coctum.

COMPOSITA. *Ol.* Emplaſtrum ad Fonticulos.

SCILLA MARINA. L.
quilla, Ph. Meerzwiebel. Mořſká cybule.

Scilla. Cor. 6 — petala, patens, decidua. *Filamenta* filiformia.

S. Marina. Nudiflora, bracteis refractis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

Forma. *Bulbus rec.* magnitudine pugni vel ultra, conicus, extus veſtitus tunicis membranaceis, aridis, adpreſſis, nervoſis: nervis parallelis; quarum exteriores, tenuiores, interiores baſi ſucculentæ. *Parencyma* albido — luteſcens, tunicatum, conſtans tunicis carnoſis, inæqualibus; tranſverſaliter ſectum ſucco viſcoſo plenum, centro medullari ſubrotundo, laxo. *Siccata* radix in officinis occurrit e ſeparatis tunicis, ſiccatis, oblongis, ſubdiaphanis, neroſis, fragilibus.

Proprietas. *Rec. Odor* vix ullus. *Sapor* intenſius amarus, acris, nauſeoſus, diu inhærens. *Sicc.* pariter amarus, minus acris. Ergo ſiccatione manet amarities, perditur acredo.

Præparata. Acetum.

Oxymel.

Composita. Electuarium, ſeu Theriaca Andromachi.

Asparagus officinalis. L.

Aſparagus. Ph. Spargel. Hromowé kořenj.

Aſparagus. Cor. 6 — partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. *Bacca 3* — locularis, 2 — ſperma.

A. Officinalis. Caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus.

Hortensis. Perennis.

Off. Radix.

Forma. *Radix rec.* junior fibrosa: fibris plurimis cylindricis, simplicibus, crassitie pennæ anserinæ, cinerascentibus, fibrillosis, ex uno capite aggregatis, horizontali — descendentibus, longius exporectis. *Parencyma* carnosum, subsucculentum, album, vestitum corticali parte; transversaliter sectum æquale, puncto centrali parvo.

Proprietas. *Rad. rec. Odor* graviusculus, non ingratus. *Sapor* primum dulcescens, tum amaricans, subgraviusculus; *masticata* pulposa sentitur.

Composita. Radices V. aperientes.
Species Decocti Althææ Fernelii.

Convallaria majalis. L.

Lilium Convalium. Ph. Mayenblümel, Zaucken, Faltrian. Konwalium.

Convallaria. Cor. — fida. *Bucca* maculosa, 3 — locullaris.

C. Majalis. Scapo nudo.

Indigena. Perennis.

Off. Flores.

Forma. *Flores* albi, nutantes. Cal. nullus. Cor. campanulata, alba, magnitudine seminis Pisi,

Pifi. 6 — fida: laciniis ovatis, acutiufculis, revolutis. STAM. *Filam.* 6, brevia, alba, bafi latiora, tubo corollæ bafi adnata. *Anth.* tetragono -- pyramidales, acutæ, in ftylum convergentes, erectæ latere utrinque longitudinaliter hiantes; piftillo duplo breviores. *Glandulæ* germinæ obfoletæ, lineares, fubviolaceæ, bafi filamentorum fingulorum, ubi corollæ adnatæ funt. PIST. corolla brevius. *Germen* fuperum ovatum, albido — lutefcens, defìnens in *ftylum* craffum, cylindrycum, album, fubtrigonum. *Stigma* trigonum, obtufum, minutim villofum, album.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* fvaveolens, gratus; *ficcat.* fubnaufeofus. *Sapor rec.* intenfius amarus, acriufculus, inhærens; *ficc.* minus amarus.

COMPOSITA. Pulvis Sternutatorius Variegatus. — Sternutatorius Viridis.

ALOE PERFOLIATA. L.

Aloe. Ph. Aloe. Aloes.

Aloe. Cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. *Filamenta* receptaculo inferta.

A. Perfoliata. Floribus pedunculatis carymbofis carinis fubcylindricis.

Exotica. Perennis.

Off. Succus infpiffatus. Aloe Succotrina. (a)

FOR-

a) Proftat quidem apud Mercatores Aloe Succotrina, Hepatica, & Cabalina; in ufus autem medicos juxta Pharmacopeam noftram præter Succotrinam nulla habenda.

Forma. *Succus* concretus gummoſo — reſinoſus, in fruſtis ſolidis, compactis, ponderoſis, fragilibus. *Succotrina* aloe puriſſima eſt, fuſco — rubicunda vix ſubdiaphana, undique nitida, maculis & venis aureis immixtis, fragmentis planis hinc convexis, inde concavis.

Proprietas. *Succotrinæ Odor* graveolenti nauſeoſus, in crocum incidens, inhærens, mitior tamen hepaticæ. *Sapor* amariſſimus, fere bilis animalis, diu inhærens.

Præparata. Extractum Aloes aquoſum, ſive Aloe lota.

Tinctura.

Composita. *Succ.* Extractum Catholicum hoc pro Pilulis Mercurialibus. — Panchymagogum.

Oleum Colocynthidis Compoſitum.

Pilulæ Anethinæ. — Rufi. — de Succino Crocatis.

Pulvis Specierum Hieræ Picræ.

Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.

Suppoſitoria Compoſita.

Tinctura, ſive Balſamum Comentatoris.

Unguentum de Arthanita, ſive contra Vermes.

Extract. Pilulæ Balſamicæ Stahlii.

Tin-

Tinctur. Elixirium Proprietatis Dulce.

ACORUS CALAMUS EUROPEUS. L.

Acorus Vulgaris. Calamus Aromaticus. Ph.
Kalmes, Kalmus. Pruſtwovec, pryſnj kořen.

Acorus. Spadix cylindricus, tectus flosculis. *Cor.* 6 — petalæ, nudæ. *Stylus* o. *Caps.* 3 — locularis.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec.* cylindrica, compressiuscula, ramosa, crassitie digiti vel ultra, geniculis vestitis squama fusca, filamentosa; repens: fibris numerosis, filiformibus, albis, descendentibus, e latere inferiore exeuntibus, fibrilis capilaribus instructis. *Parencyma* carnosum, album, post transversalem sectionem porulis minimis undique pertusum; centro medullari ovali, pariter poruloso, adsperso punctis ferrugineis. *Siccata* radix in taleolas longitudinales sicca occurrit, undique alba, extus punctis elevatis scabra, *parencymate* subfarinoso, fragili, solido, transversaliter secto porulis pertuso innumeris.

PROPRIETAS. *Rec.* & *Siccat. Odor* fragrans, fortior, nauseosus, *Sapor* aromaticus nauseosus, acris, leniter amaricans. *Masticata* fauces & linguam stimulat, & calefacit. Recens radix magis acris.

PRÆ-

Præparata Radix condita (*a*)

Composita. Acetum Antisepticum.

Electuarium, seu Theriaca Andromachi.

Elixirium Vitrioli.

Essentia Absinthii composita. — Carminativa.

Pulvis Stomachicus Birckmanni.

Petocarpus draco. L. (*b*)

Draconis Sanguis. Ph. Drachenblut. Dračowá krew.

Calamus. *Cal.* 6 — phyllus. *Cor.* o. *Bacca* exarida, 1 — sperma, retrorsum imbricata.

Exotico — Arborescens. Frutex. *Berg.* Arbor. *Ph. Svec.*

Off. Resina. (*c*)

Forma. *Resina* in frustulis solidis, ovatis, magnitudine fructus Pruni; singulis obvelatis foliis arundinaceis, unde longitudinaliter undique striata est, nigro — rubicunda, opaca, dura, non splendens, subfragilis, dificilius friabilis: fracturis subgranulatis, vix nitidiusculis.

Proprietas. *Odor* nullus. *Sapor* nullus *Mastica-*

a) Uti olim, sic adhuc, hodie in usu est.

b) Juxta Bergium Calamus Rotang. L.

c) Prostat quidem apud Mercatores Sanguis Draconis in lachrimis & in tubulis, cum vero Pharmacopea nostra non distinguat, præstat adhibere eundem in lachrimis sic dictum, tanquam præstantiorem.

cata hæret resina in ore non emollitur, nec solvitur, sed limpidea sentitur, inter dentes friabilis, arenacea, comminuitur absque sapore, saliva rubra. Grossius pulverata abit in pulverem nigricantem, sed si terratur, fit pulvis ruber. Inter digitos comminuta, illos colore pulchre sanguineo inficit.

COMPOSITA. Emplastrum ad Rupturas.

✠ BERBERIS VULGARIS. L.

Berberis. Ph. **Saurach, Weinschädling. Drac, dřišťal.**

Berberis. *Cal.* 6 — phyllus. *Pet.* 6. ad ungues glandulis 2. *Stylus* o. *Bacca* 2 — sperma.

B. *Vulgaris*. Pedunculis racemosis.

Indigena. Frutex.

Off. Fructus recens.

FORMA. *Baccæ* ovali — oblongæ, utrinque obtusæ, lineas 3 vel 4 longæ, sanguineæ, leviusculæ, nitidiusculæ, apice umbilicatæ: umbilico parviusculo, fuscescente, subrotundo, convexo, centro cavo. *Parencyma* carnoso — succosum, sanguineum, tenue, centro cavo, amplo, uniloculari, dispermo. *Semina* inclusa in communi arillo, membranaceo, sicco, laxo, rubro — fusca, ovali — oblonga, undique minutim rugosa, hinc convexa, inde plana, sæpe teretia, inferne sensim attenuata, apice obtusa, subnitidiuscula, 2 circiter lineas longa.

PROPRIETAS. *Baccar.* rec. *Odor* nullus. *Sapor* intensius acidulus; *masticatæ* grossius com-

minuuntur, & insimul exsugitur succus acidus, saliva rubicundo tincta. *Semin.* *Sapor* subamaricans, graviusculus, substypticus.

PRÆPARATA. Rotulæ.

Syrupus.

LORANTHUS EUROPEUS. L. (*a*)

Viscum Quercinum. Ph. Eichenmistel. Dubowé melj

Loranthus. *Germen* inferum. *Cal.* o. *Cor.* 6—fida, revoluta. *Stam.* ad apices petalorum. *Bacca* 1—sperma.

L. Europeus. Racemis simplicibus terminalibus, flor. dioicis.

Indigenus Fruticulus.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum* trunci diametro interdum unciam supernantis, basis loco radicis est, subalbidum, fragile, cortice fusco, æquali, crasso, tuberculis a foliis delapsis magis minusve notatum.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* leviter adstringens, & aquam maceratione inficiens colore rubiginoso.

COMPOSITA. Pulvis Marchionis.

a) Bergio & Ph. Svec, Viscum album. L.

ORDO
TRIGYNIA.

RUMEX ACUTUS. L.

Lapatum acutum. Ph. Grindwurzel. Konſký ſſtowjk.

Rumex. *Cal*. 3 — phyllus. *Petala* 3, conniventia. *Sem*. 1. triguetrum.

R. *Acutus*. Floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato — oblongis acuminatis.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec*. dodrantalis, cylindrica, craſſitie digiti, flaveſcens; *Siccata* extus brunea, *parencymate* pallide flaveſcente, ſtriis gummoſis.

PROPRIETAS. *Odor* nullus. *Sapor* radicis amaricans, ſubauſterus; *maſticata* radix comminuitur, ſaliva crocea.

RUMEX ACETOSA. L.

Acetoſa vulgaris. Ph. Gemeiner Sauerampf. Sſtowjk.

R. *Acetoſa*. Floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis.

Indigena. Perennis.

Off.

Off. Radix. Herba. Semen.

Forma. *Radix rec.* ramoſa, fibroſa: ramis & fibris cylindricis, luteis, glabris deſcendentibus *parencymate* ſubcarnoſo, albo, poſt ſectionem tranſverſalem minutim ſtriato — radiato, annullo medulari amplo. *Caules* plures ex una radice bipedales, erecti, teretes, ſtriato — angulati, glabri, geniculati. *Folia* alterna, ſubcarnoſa, lanceolata, acuta, ſagittata, palmaria, ſæpe ſpithamæa, pro diverſo ſolo, utrinque glabra, margine undulata; auriculis poſtice dentatis; inferiora folia petiolata; ſuperiora ſeſſilia, ſuprema linearia. *Semina* verticillata, pendula, triquetra, ſpadicea, nitida, glabra, obvelata valvulis tribus orbiculatis, planis, rugoſis, margine lævibus, incarnatis, pericarpium triquetrum efformantibus, baſi fulcitum ſquamis calycinis 3 reflexis.

Proprietas. *Radix rec. Odor* nullus; *Sapor* debilis, vix amaricans; *foliorum Odor* nullus *Sapor* intenſius acidus, gratus; *maſticata* folia tenera, ſaliva virideſcente; ſiccata folia ſapore herbaceo vix acidulo.

Composita. *Rad.* Electuarium Diaſcordii.

Species Decocti Antifebriles.

✠ Colchicum autumnale. L.

Colchicum. Ph. Zeitloſe. Ocun, planý ſſafrán.

Colchicum. Spatha. Cor. 6 — partita: tubo radicato. *Capſulæ* 3. conexæ, inflatæ.

C. Autumnale. Foliis planis lanceolatis erectis. Indigenum. Perenne. Off.

Off. Radix recens, ſucculenta non marcida.

Forma. *Bulbus rec.* oblique ſubrotundus, antice gibbus, vix conicus, magnitudine Pomi minoris, veſtitus tunica coriacea, extus brunea, nervoſa; nervis parallelis; obvelatus membrana tenuiore luteſcente; dorſo profunde canaliculatus ſ. longitudinaliter excavatus; latere anectens bulbum parvulum, futuro anno — florentem, ipſi bulbo intruſum. *Parencyma* ſolidum album; tranſverſaliter ſectum æquale, carnoſum ſubſucculentum, præcipue tempore autumnali, poſtquam bulbus annotinus evanuit; hinc ſi tempore vernali bulbi colchici effodiantur, & colligantur, annotini non ſumendi.

Proprietas. *Rec.* tempore æſtivali. *Odor* hircinus; ſed recenter reſectæ radicis odor ſimul irritans, nares fauceſque feriens. *Sapor* acris; *maſticatus* bulbus acris, linguam fauceſque fortius rodens, rigidas faciens, diu inhærens; tempore vero autumnali ſapor longe debilior, ſubfarinoſus. Bulbus reſectus non lacteſcit, ſed ſcatet ſucco albido ex amylo imixto, in cultro ſe deponente.

Proprietas. Acetum.
Oximel.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.
ORDO
MONOGYNIA.

AMYRIS ELEMIFERA. L.
Elemi. Ph. Elemiharz. Elemi.

Amyris. *Cal.* 4—dentatus. *Petala* 4, oblonga. *Stigma* tetragonum. *Bacca* drupacea.

A. Elemifera. Foliis ternatis quinato—pinnatisque ſubtus tomentoſis.

Exotica. Arbor.

Off. Reſina.

FORMA. *Reſina* in maſſa ſolida, ſubponderoſa, diſcolor; variegata, e cinereo—virideſcente & granis albicantibus vel luteis marmorea, immixtis glandulis quartziformibus, ſubdiaphanis, albo virideſcentibus, maculiſque fuſcis; conſiſtentia ceræ, frigore dura, ſubfriabilis, cultro ſectilis: ſecamentis albis.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, ad Galbanum accedens. *Sapor* gravis, amaricans; *maſticata* plaſtica, emollitur, dentibus non adhæret, & non ſolvitur in ore. Inter digitos agitata, emollitur, plaſtica evadit, & tenax illiſque adhæret.

COM-

Composita. Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.

Unguentum ſive Balſamum Arcæi. — de Styrace.

Amyris opobalsamum. L. (*a*)

Balſamum de Mecha. Opobalſamum. Ph. Opobalſam. Opobalſam.

A. Opobalſamum. Foliis pinnatis: ſeſſilibus.

Exoticum. Arbor.

Off. Balſamum.

Forma. *Reſina* liquida, conſiſtentia ſyrupi, vel tenatior, pro diverſa ætate, limpida, luteſcens,; ætate ſpiſſa, tenax fit, vix fluida.

Proprietas. *Odor* Menthæ gentilis. Variat odor pro diverſa bonitate; vidit Cl. Bergius Balſamum Meccæ odore terebinthinato, etiam odore in Macin incidente. *Sapor* aromaticus, amaricans, calidiuſculus, acriuſculus, odori congruens. *Tactu* pinguiuſculum ſentitur balſamamum.

Composita. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Tinctura Balſamica.

Santalum citrinum. L. (*b*)

Santalum Citrinum. Ph. Geldes Sandelholz. Žlutý Santal neb žluté ſantalowé dřewo.

 San-

a) Juxta Pharmacopeæ Svecicæ editionem alteram Amyris Gileadenſis. L.

b) Bergio Santalum album. L.

Santalum. *Cor.* 4—petala: petalis calyci innatis, præter *glandulas* 4. *Cal.* 4—dentatus. B*acca* infera monoſperma.

Exoticum. Arbor.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum* durum, ponderoſum, longitudinaliter fiſſile, nitidiuſculum, ferrugineo—citrinum vel pallidum.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, urinoſus, ſubambroſiacus, pertinaciter inhærens. *Sapor* leniter aromaticus, vix amaricans.

COMPOSITA. Eſſentia Lignorum.

Electuarium ſive Confectio Kermeſina vulgo Alkermes.

Pulvis Specierum pro Cucupha. — Specierum Confectionis Hyacinthinæ.

VACCINIUM MYRTILLUS. L.

Myrtillus. Ph. Heidelbeere. Myrtus, gahody černé, wranj oka.

Vaccinium. *Cal.* ſuperus. *Cor.* 1—petala. Filamenta receptaculo inſerta. B*acca* 4—locularis polyſperma.

V. *Myrtillus.* Pedunculis unifloris, foliis ſeratis ovatis deciduis, caule angulato.

Indigenus. Sufruticoſus.

Off. Fructus recens pro ſucco.

FORMA. *Baccæ rec.* globoſæ, nigro—purpureæ, nitidæ, magnitudine ſeminis Piſi, apice

umbilicatæ: umbilico duplici, depreſſo; exteriore cincto margine parvo, integerrimo, erecto; interiore in centro exterioris, convexiuſculo, margine crenulato, centro concavo, undique cincto margine minuto, adpreſſo, minutim crenulato. *Parencyma* carnoſo — ſucculentum, polyſpermum. *Semina* plurima, rufeſcentia, compreſſa, lineari — reniformia, dorſo convexa, antice acutiuſcula, minutiſſime rugoſa.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* nullus. *Sapor* acidulus. *Maſticatæ* baccæ ſuccoſæ, ſaliva ſaturate purpurea; lingua labiiſque colore cœruleo — purpureo, inhærente, tinctis.

PRÆPARATA. Syrupus.

DAPHNE MEZEREUM. L.

Mezereum. Timelæa. Laureola. Ph. Zeidelbaſt. Polſký wlčj pepř menſſj.

Daphne. *Cal.* o. *Cor.* 4 — fida, corollacea, marceſcens, *ſtamina* includens. *Bacca* 1 — ſperma.

D. Mezereum. Floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.

Exoticum. Frutex.

Off. Cortex. (*a*)

FORMA. *Cortex ſicc.* albidus, ſectus in ſegmenta longitudinalia, tenaciſſimus, ſericeus, quaſi e fibrillis tenuiſſimis contextus, tectus epidermide olivacea, lævi.

a) Hujus ſemina ſub nomine coccumgnidii olim officinalia.

Proprietas. *Odor* nullus. Masticatus indissolubilis, sapore vix ullo, sed si diutius in ore retineatur, valde acris sentitur, faucesque excandefacit, effectu diu inhærente, etiamsi fauces cum aqua frigida bene elutæ fuerint.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

ORDO

MONOGYNIA.

Laurus cinnamomum. L.

Cinnamomum. Ph. Zimmet. Skořice.

Laurus. Cal. o. *Cor.* calycina, 6 — partita. *Nectarium* glandulis tribus, bisectis, germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera *Drupa* 1 — sperma.

L. Cinnamomum. Foliis trinerviis ovato — oblongis, nervis versus apicem evanescentibus.

Exoticum. Arbor.

Off. Cortex. (*a*)

For-

(*a*) Est cortex interior inter lignum & crustam seu peliculam cineream tenuem scabram. Geoffroy. T. II. pag. 166. Cum Cinnamomum quod nobis venale habetur, sæpe fit valde iners, hinc frequenter substituuntur in parandis Præ-

FORMA. *Cortex sicc.* intermedius, tenuis, quarta parte lineæ vix crassior, pallide rubro — bruneus, glabriusculus, in segmentis spithameis vel pedalibus, in cylindrum convolutis, fragiliusculus: *parencymate* paullo pallidiore: fractura fibrosa scabra.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* fragrans, aromaticus, svavissimus. *Sapor* dulcescens, aromaticus, gratus, dein acris, calidiusculus.

PRÆPARATA. Aqua simplex & vinosa.

Essentia.

Oleum destillatum.

Syrupus.

COMPOSITA. *Cort.* Acetum Antisepticum.

Aqua seu Balsamum Embrionis. — Melissæ composita.

Electuarium Diascordii. — Elect. seu Theriaca Andromachi.

Elixirium Vitrioli compositum.

Essentia Absinthii composita.

Pilulæ de Cynoglosso.

Pulvis Specierum Aromaticarum pro Morsulis Imperatoris. — Spec. pro Cucupha.

Aqu.

paratis semina sic dicta Cassiæ, quæ nihil aliud sunt, quam flos Cinnamomi inapertus, imaturus, uti caryophilli aromatici juxta Dissertationes Physico Chymico Medicas Cartheüseri citatas in Bibliotheca Medico — practica Murray T. II. pag. 92.

Aq. ſimpl. Aqua Perlarum.
Emulſio Laxativa.
Syrupus Kermeſinus.
Tinctura Martis Tartariſata.
Aq. vinoſ. Eſſentia Anodina.
Syrupus Cinnamomi.
Ol. Balſamum Apoplecticum.
Electuarium ſeu Confectio Kermeſina.
Eſſentia ſive Balſamum Vitæ Hoffmanni.
Liquor ſeu Sal volatilis oleoſus.

LAURUS CASSIA. L.

Caſſia Lignea. Ph. **Mutterzimmet. Kasſye, wonné kořenj.**

L. Caſſia. Foliis triplinerviis lanceolatis.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex* intermedius craſſus, linea craſſior, glabriuſculus, ſectus in ſegmenta ſpithamæa vel pedalia, in cylindrum convoluta, rubro — brunneus, rigidus, fragilis : fractura plana; parencymate ſolido, fuſceſcente.

PROPRIETAS. *Odor* cinnamomeus, debilis. *Sapor* gratus, dulceſcens, cinnamomeus, debilior, vix acris.

LAURUS CAMPHORA. L.

Camphora. Ph. **Kampfer. Kaffer.**

L. Camphora. Foliis triplinerviis lanceolato — ovatis.

Exo-

Exotica. Arbor.

Off. Resina.

Forma. *Resina* purificata in placentis hæmisphericis, hinc concavis, inde convexis, albissima, homogenea, subdiaphana, lævis, subflexibilis, fragiliuscula.

Proprietas. *Odor* fragrantissimus, penetrans, ad Rosmarinum accedens. *Sapor* calidissimus Menthæ piperitidis, amaricans. *Masticata* indissolubilis, fauces linguamque calefaciens. Purificata Camphora omnino volatilis est, inflammabilis.

Præparata, Spiritus Vini Camphoratus. Oleum Camphoræ? (*a*)

Composita. Acetum Antisepticum.

Emplastrum Defensivum rubrum. — Diabotanon. — Noricum. — Saponatum. — Vesicatorium.

Globuli ad Erysipelas.

Pulvis Fumalis Arthriticus.

Spiritus Theriacalis Camphoratus.

Unguentum album Camphoratum. — de Liquiritia. — Nihili sive de Tutia.

Laurus nobilis. L.

Laurus. Ph. Lorbeerbaum. Bob.

L. No-

*) Quod cum acido Nitri paratum, chirurgis in usu est tanquam summum escharoticum.

L. Nobilis. Foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis, dioicis.
Hortensis. Arbor.

Off. Folia. Fructus.

Forma. *Folia rec.* petiolata, sempervirentia, ovato—lanceolata, acuta, integerrima, palmaria, glabra, sublucidiuscula, sed utraque pagina venulis minimis undique reticulata, pallide viridia, nervis suboppositis, obliquis. *Baccæ* ovales, utrinque obtusæ, nigricanti—fuscæ, anastomosi venularum, undique reticulato—rugosæ, lucidiusculæ, magnitudine vix fructus Cerasi minoris, uniloculares, continentes *Nucleum* majusculum figura baccæ bipartibilem; *recentem* cotyledoneum, *siccatum* vero solidiusculum.

Proprietas. *Folior*. *Sapor* amaricans, balsamicus, graviusculus; *recentium* fortior, subamaricans. *Odor* foliorum fricatorum fragrans, *recent*. fortior. *Baccarum nucl.* *Sapor* amarus balsamicus, pinguiusculus, calidiusculus, odore congruente; *masticatæ* in ore sensim solubiles. Corticalis pars baccæ etiam aromatica.

Præparata. Oleum pressum.

Composita. *Bacc.* Electuarium seu Theriaca Diatessaron.

Emplastrum Diabotanon. —de Meliloto.

Essentia Carminativa.

Spi-

Spiritus Balſamicus, vulgo Schauerianus.

Ol. Unguentum. Carminativum. —Nervinum. — ad Phthiriaſim ſeu contra pediculos. — ad Scabiem.

LAURUS SASSAFRAS. L.

Saſſafras. Ph. Saſſafrasholz. Sasſafraſowé dřewo.

L. Saſſafras. Foliis integris trilobisque.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex. Lignum. (*a*)

FORMA. *Lignum* leve, mollius, cinereo — ferrugineum, extus colore magis ſaturato, fragile. *Cortex ligni* craſſiuſculus, ferrugineus, mollis, friabilis, levis, extus cinereo — fuſcus, rugoſus. *Cortex radicis* tenuiuſculus, fragilis rubicundus.

PROPRIETAS. *Ligni. Odor* fragrans, fortior, non ingratus, ad Fœniculum accedens ſed gravior. *Sapor* aromaticus. *Corticis* utriuſque odor ſaporque ligno conſimiles, ſed fragrantiores.

PRÆPARATA. Oleum deſtillatum.

COMPOSITA. *Lig.* Elixirium Salutis.
Eſſentia Lignorum.
Species Decocti Lignorum.

RHEUM RHAPONTICUM. L.

Rhaponticum. Ph. Rapontike. Reupontykum, zemězluč wětſſj. *Rheum*

a) An Radicis?

Rheum. *Cal.* o. *Cor.* 6.—fida. perſiſtens. *Sem.* 1, triquetrum.

R. *Rhaponticum.* Foliis glabris, petiolis ſubſulcatis.

Exoticum? Perenne.

Off. Radix.

Forma. *Radix* oblonga, craſſa, ramoſa, extus brunnea, intus luteſcens, tranſverſaliter ſecta, *parencymate* variegato.

Proprietas. *Radicis ſicc.* *Odor* debilior, fere Rhei; *Sapor* amaricans, ſtypticus, ſubrhabarbarinus; *maſticata* linguam & fauces tingit colore rubro—croceo, tanquam Rheum verum.

Rheum palmatum. L.

Rhabarbarum. Ph. Rabarbare. Rabarbara.

R. *Palmatum.* Foliis palmatis acuminatis.

Exoticum. Perenne.

Off. Radix.

Forma. *Radix ſicc.* ab exteris advehitur in fruſtis palmaribus, læviuſculis ſubrotundis, ſæpe foramine majuſculo pertuſis, decorticatis; *parencymate* fragiliuſculo, ſubriabili, molliuſculo, ex albo & luteo—virideſcente variegato.

Proprietas. *Sicc.* *Odor* fragrans, gravis, ſubnauſeoſus. *Sapor* amaricans, odori congruens. *Siccata* radix in ore detenta emollitur, *maſticata* ſenſim ſolvitur, atque inter dentes, maſticatione repetita, arenuloſum quid mentitur; cete-

ceterum linguam, totum os, fauces & ſalivam croceo colore tingit.

PRÆPARATA. Extractum.

Tinctura Rhabarbari Aquoſa ex Tempore paranda. Radix toſta? (a)

COM-

a) Cum ſæpe adhuc præſcribatur.

Rheum palmatum producit *Rhabarbarum*, in officinis *Sibiricum* appellatum; certe e ſeminibus, a Bucharis e montoſis Tibeti in Ruſſiam apportatis, & poſtea ſatis, hocce Rheum palmatum enatum eſt; PALLAS (Reiſe durch verſchiedene Provinzen des Ruſ. Reichs, ſ. 3 p. 157) Rhabarbarum vero *Chinenſe* ex alia ſpecie Rhei deſumptum eſſe videtur. Ex obſervatione CL. JOH. GOTTL. GEORGI. (Bemerkungen einer Reiſe im Rus. Reich. T. 1. p. 211. 212.) annoſior radix Rhei undulati ſimillima evadit Rhabarbaro Chinenſi, facie, colore, fragrantia, & vi purgante. Et vero credit Cel. PALLAS (l. c. p. 156) hocce Rheum undulatum, quod in montoſis Sibiriæ frigidis ac humidis ut plurimum laborat radicibus corruptis, in montibus regni Tibet ſiccioribus, apricis, magiſque auſtralibus, felicius provenire, radiceſque genere excellentiores, quæ forte Rhabarbarum Chinenſe eximium efficiunt. Plures varietates Rhabarbari Chinenſis obſervavi, ſcilicet ponderoſiorem, leviorem, pallidiorem rubeſcentem, immo omnino fuſceſcentem. Generatim omne *Rhabarbarum Chinenſe* occurrit in fruſtis oblongis ſeu ſubrotundis, hinc planis, inde convexiuſculis, palmaribus vel ſupra, ſatis ponderoſis; *parencymate* ſolido, minus friabili, e rubicundo luteo & albo variegato; quod, recenter pulveratum, abit in pulverem, mox croceum, ſed poſt ſenſim rubeſcentem, dum ſervatur. *Maſticatum* ſolvitur in ore, ſi bonum quemadmodum etiam Sibiricum; deterior autem varietas

ſub

COMPOSITA. *Rad.* Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Elixirium Salutis.

Extractum Amaricans; hoc pro Tinctura Amaricante. — Panchymagogum.

Infuſum ſive Sanguis Cichorei cum Rhabarbaro.

Pulvis contra Vermes. — Vitæ.

Species Decocti Aperitivi cum Rheo.

Syrupus Cichorei cum Rheo.

Extract. Pilulæ Balſamicæ Stahlii.

CLAS-

ſub maſticatione tenax & indiſſolubilis deprehenditur. *Sibiricum Rhabarbarum* magis ſpongioſum, friabile, leve, pallidum ſ. albeſcenti — luteſcens; *Chinenſe* vero magis ſolidum, ponderoſum, durum, & ſaturatius tinctum. Hyemes noſtras bene perfert hæc planta, frigoris patiens; ſemina etiam heic maturat. Sed requiruntur 10 aut 12 anni ad incrementum & maturationem radicis PALLAS l. c. p. 157. Sub autumno effodi poſſunt radices, tunc enim fragrantes ſunt. Sed ſiccatio radicis apud nos difficillima, quod putredini valde obnoxia eſt radix recens. *Bergius M. Med.*

CLASSIS X.

DECANDRIA

ORDO

MONOGYNIA.

HYMENÆA COURBARIL. L.

Anime. Ph. Animeharz. Anyme.

Hymenæa. *Cal.* 5 — partitus. *Pet.* 5, ſubæqualia. *Stylus* intortus. *Legumen* repletum pulpa farinacea.

Exotica. Arbor.

Off. Reſina.

FORMA. *Reſina* in fruſtis ſubrotundis, inæqualibus magnitudine nucis Avellanæ vel ultra pallide luteſcens, ſuperficie undique ſubfarinacea, intus diaphana ſuccini inſtar, nitida, ſplendens, fragilis: fracturis planiuſculis; friabilis.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, balſamicus, in baccas juniperi incidens. *Sapor* debilius reſinoſus. Reſina *maſticata* primum friabilis inter dentes, dein emollitur & coit in maſſam duriuſculam, ceræformem, flexilem, opacam, pallidam; ore exempta in aere libero mox indureſcit.

CAS-

CASSIA FISTULA. L.
Caſſia Fiſtula. Ph. Rohrkaſſie. Kasſya fiſtula.
Caſſia. *Cal*. 5.—phyllus. *Petala* 5. *Antheræ* ſupernæ 3 ſteriles, infimæ 3 roſtratæ. *Legumen*.
C. Fiſtula. Foliis quinqueiugis ovatis acuminatis glabris petiolatis eglandulatis.
Exotica. Arbor.

Off. Legumen lignoſum univalve?

FORMA. *Legumen ſicc*. cylindricum, cubitale, craſſitie policis, ſubfalcatum, obtuſum cum tubere ſubrotundo, obductum cortice ſublignoſo, fragili tectum epidermide fuſco—nigricante, læviuſculo, minutim & interrupte tranſverſaliter ſtriato, ſutura longitudinali latere altero, altero vero obſoleta; multiloculare: diſſepimentis tranſverſalibus, pluribus parallelis, tenuibus, rigidis, papyraceis, ſutura centrali, longitudinali; ſingulo diſſepimento utrinque obducto *pulpa* melliginea, nigricante, nitidiuſcula, ſtrato tenuiore. *Semina* magnitudine ſeminis Phaſeoli, ovata, obtuſa, utrinque compreſſa, ſutura in medio longitudinali, ſemiunguicularia, ferruginea, nitidiuſcula, in ſingulo loculamento ſolitaria.

PROPRIETAS. *Pulpæ*. *Odor* nullus; *Sapor* dulcis, leniter acidulatus, vix nauſeoſus.

PRÆPARATA. Pulpa.

CAS-

Cassia senna. L.

Senna. Ph. Sennesblätter. Sena, neb ſenowé liſty.

C. Senna. Foliis ſeiugis ſubovatis, petiolis eglandulatis.

Exotica. Annua. (*a*)

Off. Folia. Legumina. (Foliculi vulgo.)

Forma. *Sicc. Foliola* (folii pinnati) ovali lanceolata, acuta, integerrima, ſemipollicaria, ſæpe pollicaria, pallida, ſupra minutim pubeſcentia, ſubtus glabriuſcula, coſta pubeſcente, venuloſa, nervis alternis. *Foliculi : Legumina* bivalvia, pollicaria, falcata, utrinque plana, linea laterali utrinque longitudinali interrupta, fuſco — cinerea, venuloſa, ſemina ſecundum lineam lateralem anectentia. *Semina* 6 vel 7, turbinato cordata, acuta, cinerea.

Proprietas. *Odor* ſubaromaticus. *Sapor* amaricans, nauſeoſus; *maſticata* ſubglutinoſa ſentitur.

Composita. Electuarium Lenitivum ſive Tamarindorum.

Elixirium Salutis.

Extractum Panchymagogum.

Hydromel Infantum.

a) In Hiſpania juſſu Regio Sennæ quædam ſpecies in magna copia colitur, & proba invenitur Gazette ſalutaire Année 1777. citato in Bibliotheca Medico — Chirurgica Tode Tom. VII. pag. 374.

Infusum sive Aqua Laxātiva.
Pulvis Vitæ.
Species Decocti Aperitivi.
Syrupus Mannantus cum Senna. — Rosatus Solutivus cum Senna.

GUAJACUM OFFICINALE. L.

Sanctum Lignum. Ph. Franzosenholz. Francowské dřewo.

Guajacum. Cal. 5 — fidus, inæqualis. *Petala* 5, calici inserta. *Caps.* angulata, 3 s. 5 — locularia.

G. Officinale. Foliis bijugis obtusis.

Exoticum. Arbor.

Off. Cortex. Lignum. Resina.

FORMA. *Cortex* durus, ligneus, rigidus, crassus, in frustis planis, latere exteriore læviusculus, olivaceus; interiore pallidus, longitudinaliter substriatus, fragilis: fractura sublamellata. Cortex, solis luci exsositus, latere interiore & in fractura undique micat atomis albis. *Lignum* solidum, ponderosum, in aqua subsidens, communiter ex truncis vel ramis grandioribus desumptum, durissimum, parte medullari fusco — viridescente, alburno pallide lutescente. *Resina* Guajaci bonæ notæ debet esse ponderosa, friabilis, rubro — brunnea, subpellucida.

PROPRIETAS. *Corticis: Odor* debilius resinosus; *Sapor* amaricans, debiliter resinosus; *masticatus* inter dentes friabilis. *Ligni*: Scobs ligni odo-

odore debili resinoso; *masticata* sapore leniter amaricante, tum acriusculo. *Resinæ: Odor* gratus, cephalicus.

PRÆPARATA. Essentia.

COMPOSITA. *Lign.* Essentia Lignorum.

Resin. Ceratum pro Cereolis digestivis fortius.

DICTAMNUS ALBUS. L.

Dictamnus Albus. Ph. Weißer Diptam. Dyptam, třemdawa bjlá.

Dictamnus. Cal. 5—phyllus. *Petala* 5, patula. *Filamenta* punctis glandulosis adspersa. *Caps.* 5, coalitæ.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Corticalis pars radicis undique alba crassitie lineæ vel ultra, convoluta in cylindrum, digitali longitudine; *parencymate* albo, fragili, friabili.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* nullus; *recentis* vero fortis gravis. *Sapor* debilis, *rec.* amarus.

COMPOSITA. Aqua Hysterica Fœtida.—Theriacalis.

Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Pulvis Marchionis.—Specierum Confectionis Hyacinthinæ. — Contra Vermes.

Spiritus Balſamicus vulgo Schaueria-
nus.

Ruta graveolens. L.

Ruta. Ph. Raute, Weinrute. Rauta.

Ruta. *Cal.* 5 — partitus. *Petala* concava: *Recе-ptac.* punctis melliferis decem cinctum. *Caps.* lobata.

R. Graveolens. Foliis decompoſitis, floribus lateralibus quadrifidis.

Hortenſis. Suffrutex.

Off. Herba.

Forma. *Caules rec.* plures ex una radice, herbacei, teretes, atrichodes, punctulis elevatis ſcabridi, ſimpliciuſculi, pedales vel ultra. *Folia* alterna, petiolata, duplicato — pinnata: pinnis oppoſitis; inferioribus longis pedunculatis: pinulis pinnatifidis: laciniis lineari — lanceolatis, obtuſis, glabris, ſubtus punctatis, margine minutim crenatis; extima majore, cuneiformi. *Petioli* teretes, ſupra obſolete ſulcati.

Proprietas. *Rec.* *Odor* fortis, gravis, non tamen ingratus. *Sapor* amarus, gravis, acris. *Sicc.* Odor & Sapor debiliores.

Præparata. Acetum.
Aqua.
Oleum deſtillatum.

Compoſita. *Herb.* Acetum Antiſepticum.
Aqua Caſtorei. — Hyſterica Fœtida
The-

— Theriacalis. — Vulneraria cum Aceto. — Vulneraria cum Vino.

Oleum Colocynthidis vulgo Habacucinum.

Pulvis Vitæ.

Species Cephalicæ.

Spiritus Balſamicus, vulgo Schauerianus.

Unguentum Carminativum. — Nervinum.

Ol. Balſamum Apoplecticum. — Saxonicum.

Eſſentia ſive Balſamum Vitæ Hoffmanni.

TOLUIFERA BALSAMUM. L.

Balſamum de Tolu. Ph. **Tolutaniſcher Balſam. Tolutſký balſam.**

Toluifera. Cal. 5 — dentatus, campanulatus. *Petala* 5, infimo maximo, obcordato. *Stylus* nullus.

Exoticum. Arbor.

Off. Balſamum.

FORMA. *Reſina* ſemiliquida, aureó — rubra, plaſtica, tenax, diaphana, teſte cucumerinæ inclusa.

PROPRIETAS. *Odor* gratus, fragrans, balſamicus. *Sapor* balſamicus. In frigore hiemali ſolideſcit, ſed æſtate aeris calore emollitur, ſpon-

te defluit, inſtar picis liquidæ; digitis tractatum hoc balſamum illis adhæret, in fila ductile. *Maſticatum* non ſolvitur ſed molleſcit, dentibuſque adglutinatur. Ætate penitus ſolideſcit in maſſam rubram variegatam maculis dilutioribus rubris, particulis quaſi deauratis immixtis, fragilem, digitis non adhærentem, ſub maſticatione tardiſſime, & vix perfecte, emolleſcentem, odore & ſapore recentiori congruente.

COMPOSITA. Tinctura Balſamica.

SIMARUBA AMARA. L. *(a)*

Simaruba. Simaruba. Großer Terpentinbaum.

Simaruba, neb weliký terpentinowý ſtrom.

Quaſſia. Cal. 5 — phyllus. *Petala* 5, *Nectarium* 5 — phyllum. *Pericarpia* 5, diſtantia, 1, ſperma. Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex* coriaceus, tenax, flexibilis, ſuperficie exteriore rubro — cinereus, ſcaber verucis pollymorphis & rugis tranſverſalibus elevatis; ſuperficie interiore pallida, ut & parencymate vimineo.

PROPRIETAS. *Odor* nullus. *Sapor* amarus, ſubadſtringens; *maſticatus* minime ſolubilis, vix comminuitur.

ARBUTUS UVA URSI. L.

Uva urſi. Ph. Sandbeere. *Au-*

a) Quaſſia Dioica Bergius, Quaſſia Monoica Phar. Svec. editio altera. Quaſſia Amara. Siſt. Lin.

Arbutus. *Cal.* 5 — partitus. *Cor.* ovata: ore basi pellucida. *Bacca* 5 — locularis.

A. Uva ursi. Caulibus procumbentibus, foliis integerrimis.

Indigena. Fruticulus.

Off. Folia. *(a)*

FORMA. *Folia rec.* petiolata, semipollicaria obovalia, obtusa, integerrima, utrinque glabra, lucidiuscula, supra rugosa, subtus venulosa, subrugosa: venulis semidiaphanis.

PROPRIETAS. *Rec.* & *Sicc.* *Odor* nullus. *Sapor* stypticus.

COMPOSITA. Pulvis ad Calculum.

STIRAX OFFICINALIS. L.

Styrax Calamintha. Ph. Storax. Styrax.

Styrax. *Cal.* inferus. *Cor.* infundibulif. *Drupa* 2 — sperma.

Exotica. Arbor.

Off. Resina.

FORMA. *Gummi — resina* in massa brunea, subrubicunda, mollis, fragilis: fracturis facie glebæ, turfaceæ densæ, undique repletis punctis albicantibus, micaceis, scintillantibus; inter digitos laxius fricata pulverulenta, digitis vero subacta in pastam concrescens.

PRO-

a) In nostris officinis folia Uvæ Ursi vix unquam occurrunt, omnia enim quæ videre datur in pagina inferiori punctata sunt, quod foliis Vaccinii Vitis Idææ proprium est.

PROPRIETAS. *Odor* fortis, fragrans, unctuosus. *Sapor* consimilis, resinosus, vix subamaricans; masticata primum pulverulenta, deinde in pastam subigitur, dentibus non adhærens, tandem in saliva solubilis: saliva lactescenti — rubescente.

COMPOSITA. Candelæ Fumales.

Electuarium Diascordii. Elect. seu Theriaca Andromachi.

Emplastrum de Meliloto.

Pilulæ de Cynoglosso. — de Styrace.

Pulvis Fumalis Ordinarius. — Specierum pro Cucupha.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.

Tinctura, sive Balsamum Comentatoris — Benzoe. Co-

Tres vero species Styracis hodie distinguntur, quarum:

I. *Styrax in granis*, quæ est lacryma gummi — resinosa, purissima, pellucida, pisi minoris magnitudine, albicans vel pallida, odoris suavissimi, & fragrantissimi, vix compressionem digitorum admittens, quin statim deliquescat. Hæc vix extra musea conspicienda datur (Kirsten l. c. p. 18) prout in museo Cl. Sebæ fuit. Hanc præcisæ speciem esse, quam ager Tiburtinus suppeditat, Mazeas (l. c.) refert.

II. *Styrax præstantior vulgari*, ad veterum calaminten vel gabaliten (a Gabala urbe) proxime accedens, tenax, facile liquescens, nullis sordibus inquinata, sed ex albis rufis luteis, iisque pinguibus purissimis particulis constans ad speciem Benzoes s. Ammoniaci, variæ magnitudinis & figuræ, odoris jucundissimi Opobalsamo similis, saporis balsamici & aromatici grati. Vesicis inclusa transfertur sed vix unquam ob pretium in officinis obvia (Kirsten. l. c.

Copaifera officinalis. L.

Balſamum Copaivæ. Ph. Copaibalſam. Kopag: ſký balſam.

Copaïfera. *Cal.* o. *Petala* 4. *Legumen* ovatum. *Semen* 1, arillo ovato.

Exotica. Arbor.

Off. Balſamum.

Forma. *Balſamum* liquidum, conſiſtentia olei olivarum, luteſcens, limpidum.

Pro-

l. c. p. 19.) exiſtimo eſſe illam ſpeciem, quæ a myropolis vulgo Styrax in granis vocatur. Hæc ſpecies nobis officinalis.

III. *Styrax vulgaris.* Eſt maſſa badio rufa, turſæ ſpeciem habens, levis, quæ inter digitos facile conteritur, compreſſione autem in paſtam compingi ſe patitur, conſtans ex gummi—reſinoſis partibus, ſcrobe lignea ſabulo aliiſque quiſquiliis, odoris fragrantis grati, inſtar Balſami peruviani, ſaporis aliquantiſper amari. Glebis multarum librarum pondere ad nos tranſvehitur, quæ ipſe preſſionis prægreſſæ notas in ſe ferunt. Igne ardet, combuſta gratum eundem odorem ſpargit, qui ſtyraci integro ineſt. Fatendum & hujus hiſtoriam adhuc eſſe mancam, nec niſi nova peregrinatorum indagine perficiendam. Aliena iſta a lucri unice cauſa addita, an neceſſitate maſſam inde ſolidam formandi? non dixerim. Hæc ſpecies ſolet in officinis ſtyrax colamita vocari, licet a colamita veterum, ſive nomen veniat ab arundine vel calamo, cui gummi—reſinam indiderunt, ſive ab urbe differrat. Sed hæc fere unica eſt ſpecies in officinis obvia. Artem variam qua ſtyrax corrumpi ſolet Diſcorides jam Pliniuſque conqueſti ſunt. *Murray Mat. Med.*

Proprietas. *Odor* fragrans, balſamicus, non ingratus. *Sapor* pinguis, amaricans, ſubgraviuſculus, ſubaromaticus, reſinoſus, ſubinhærens.

Composita. Ceratum pro Cereolis Digeſtivis.

Tinctura Balſamica.

ORDO

DIGYNIA.

Saponaria officinalis. L.

Saponaria. Ph. Seifenkraut. Mydlj kořen.

Saponaria. Cal. 1 — phyllus, nudus. *Petala* 5. unguiculata. *Caps.* oblonga, 1 — locularis.

S. Officinalis. Calycibus cylindricis, foliis ovato — lanceolatis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

Forma. *Caulis* pedalis vel ultra, teres erectus, geniculatus, internodiis inferioribus utrinque compreſſis; ſuperioribus rotundato tetragonis; ſcabridus, ſimplex, ſuperne ramoſus. *Rami* brachiatim oppoſiti, ſimplices, patentes, pubeſcenti — ſcabridi. *Folia* adgenicula brachiatim oppoſita, brevius petiolata, ovato — lanceolata, acuta, glabra, trinervia, partius venoſo — linea-

ta, margine ſcabrida, patentia. *Petioli* breviuſculi, lati, trinervii, connati. Stipulæ nullæ; verum margo e petiolis connatis utrinque ad genicula, minutim ciliatus.

PROPRIETAS. *Herbæ recent. Odor* debilis. *Sapor* amaricans.

DIANTHUS CARYOPHYLLUS. L.

Tunica. Ph. Nelke, Nägelein. Karaffilát.

Dianthus. Cal. cylindricus, 1—phyllus: baſi ſquamis 4. *Petala* 5, unguiculata. *Capſula* cylindrica 1—locularis.

D. Caryophyllus. Floribus ſolitariis: ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis.

Hortenſis. Perennis.

Off. Flos ruber.

FORMA. *Flores rec.* terminales, ſubcorymboſi, pedunculati. *Bracteæ* oppoſitæ, ovatæ, acutæ, marginibus inferne conniventibus, calyci ſubjectæ. CAL. *Perianth.* cylindricum, longum, pollicare, utrinque ſtriatum, glabrum, baſi einctum *ſquamis* 4. ſubæqualibus, ovatis, acutis, margine tenuioribus, oppoſitis, arcte imbricatis; apice 5—fidum: laciniis ovato—acutis, concaviuſculis, erectis. COR. rubra, pentapetala: unguibus albis, longitudine calycis, obverſe enſiformibus; carina latere interiore ſulcata; Limbo plano: Laminis obovatis, obtuſo rotundatis groſſe ſerratis. STAM. alba *Filam.* 10, ſubulata, longitudine unguium,

guium, apice purpureæ. *Anth.* cordato — ſagittatæ, obtuſæ, erectæ. *Piſt.* *Germen* ſuperum, ovato — oblongum, inferne pallidum, ſubangulatum, ſuperne viride, quadriſulcatum, obtuſum. *Styli* 2, ſubulati, purpurei, latere interiore ſulcati, corolla paulo longiores. *Stigm.* obtuſa, longitudinaliter pubeſcentia, revoluta.

Proprietas. *Rec.* *Odor.* gratus, caryophylleus; *ſicc.* nullus. *Sapor* unguium recent. dulcis, laminarum vero amaricans, leniter ſtypticus.

Præparata. Conſerva.

Syrupus.

Composita. *Flor.* Aqua ſeu Balſamum Embrionis.

Conſerv. Electuarium Catharcticum Regium.

Syrup. Pilulæ de Succino Crocatæ.

ORDO

PENTAGYNIA.

Sedum telephium. L.

Craſſula. Faba inverſa. Telephium. Ph. Fette Henne. Prutrznjk, rozchodnjk, ſwinſký kořen.

Se-

Sedum. *Cal.* 5—fidus. *Cor.* 5—petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basim germinis.

S. Telephium. Foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto.

Indigeno — Perenne.

Off. Herba recens.

Forma. *Caules rec.* plures ex una radice, spithamæi, inferne subprocumbentes, teretes glabri, rubro — purpurascentes, adspersi punctis elevatis, simplices, rarius ramosi: ramis alternis, *Folia* frequentia, carnosa, sessilia, opposita, plana, ovata, obtusa, inæqualiter serrata, pollicaria utrinque glabra.

Proprietas. *Rec.* *Odor* debilis. *Sapor* nullus; planta pæne insipida. *Masticata* folia tenerrima, subsuccosa, lubrica sentiuntur, saliva viridescente.

Composita. Unguentum Populeum.

✠ Sedum album. L.

Sedum Minus. Ph. **Kleine Hauswurzel. Netřesk, tučný mužjk mensſj.**

S. Album. Foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa.

Indigenum. Perenne?

Off. Herba.

Forma. *Caules* pedales, in sumitate ramosi: foliis tecti numerosis: teneribus, obtusis, ovatis, maculatis, crassis, glabris, ut tota planta.

Pro-

Proprietas. *Odor* debilis; *ſapor* herbaceus, acris; *maſticata* mordet in faucibus.

Composita. *Herb. rec.* Unguentum Populeum.

* Sedum acre. L.

Sedum Vermiculare. Ph. Mauerpfeffer. Netřesk, tučný mužjk neymenſſj.

S. Acre. Fol. ſubovatis adnato—ſeſſilibus gibbis erectiuſculis ſezariam imbricatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba recens raro.

Forma. *Caulis* filiformis, vix digitalis, baſi repens, ramoſa, dein erectus, teres, glaber pallidus, ſucculentus, undique imbricatus: *Foliis* ovatis, obtuſis, carnoſis, ſupra planiuſculis, ſubtus convexo—gibbis, ſeſſilibus, erectis, ſubpunctatis, minutim ſubrugoſis, interioribus emarcidis.

Proprietas. *Rec. Odor* debilis. *Sapor* herbaceus, acris; planta maſticata mordet in faucibus.

✠ Oxalis acetosella. L.

Acetoſella. Ph. Sauerklee, Bauchampfer. Alleluga, dětel kyſelý zagečj.

Oxalis. Cal. 5—phyllus, *Petala* unguibus connexa. *Caps.* angulis dehiſcens, 5—gona.

O. Acetoſella. Scapo unifloro, foliis ternatis obcordatis, radice dentata.

Indigena. Perennis.

Off.

Off. Herba.

Forma. *Folia rec.* 3, radicalia, petiolata, ternata: foliis obcordatis; sinu subtus recurvo; patentibus s. reflexis, glabriusculis, sed pube sparsa notatis, ciliatis lutea — viridescentibus. *Petioli* semidigitales, teretes, minutim pubescentes, nudi, erecti; pallidi.

Proprietas. *Rec. herbæ*: *Odor* nullus; *Sapor* grate dulcescenti — acidus; *masticata* dentes sensibiles facit. *Sicc.* debilissime acidulata.

Præparata, *Herb. rec.* Conserva.
Sal Essentialis. (*a*)

CLASSIS XI.

DODECANDRIA
ORDO
MONOGYNIA.

Asarum europeum. L.
Asarum. Ph. Haselwurz. Kopytnjk.

Asa-

a) Vulgo venalis nisi in pharmacopoliis paretur potissimum adulteratus est.

Asarum. *Cal.* 3 ſ. 4—fidus germini inſidens, *Cor.* o. *Caps.* coriacea, coronata.

A. Europeum. Foliis reniformibus obtuſis binis. Indigenum. Perenne.

Off. Radix. Herba.

Forma. *Radix* repens, filiformis, tetragona, geniculata, bruneo—cinerea. *Vaginæ* radicales obovatæ concavæ, obtuſæ minutim ciliatæ, imbricatæ. *Folia* radicalia, longius petiolata, reniformia obtuſo—rotundata, vix pollicaria, venoſa utrinque pubeſcentia, præcipue venis, erecta.

Proprietas. *Sicc. radic.* *Odor* fortis, fere valerianæ, ſed magis nauſeoſus; *Sapor* aromatico—gravis, acris, in Ipecacuanham incidens, ſed magis aromaticus, minus amaricans; *maſticata* in lingua & faucibus leniter mordet, ſubnauſeoſa. *Herbæ* *Odor* nullus; *Sapor* ſubamaricans, nauſeoſus, acriuſculus; *maſticata* leniter mordet in faucibus; *recentia* foria acriora.

Composita. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Pulvis Specierum Hieræ Picræ.

Winterania canella. L.

Canella Alba. Cortex Magellanicus, ſive Winteranus. Ph. (a) Weißer Zimmet. Bjlá ſkořice.

Win-

a) Parkinſonus corticem hunc a Canella alba diverſum eſſe, contra multorum opinionem oſtendit. Ab ea enim

Winterania. *Cal.* 3—lobus. *Petala* 5. Antheræ 16, adnatæ, *Nectario* urceolato. *Bacca* 3—locularis.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex ſicc.* undique albidus, in cylindrum convolutus, craſſitie lineæ, fragilis, latere interiore glabriuſculo, exteriore ſubluteſcente, ſubrugoſo.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, aromaticus; *Sapor* calidus, aromaticus, acriuſculus, amaricans; *maſticatus* ſubfriabilis inter dentes, fauces & linguam calefaciens.

K COM-

differt craſſitie majore, colore obſcuriore & ad Cinnamomum accedente, ſapore acriore quaſi Piperis & Zingiberis. Geoffroy, Mat. Med. T. II. pag. 177. Inter recentiores legitur notabilior Corticis Winterani & Canellæ albæ differrentia in *Medical. obſervations and Inquires. By a Society of Phyſicians in London.* Recenſitis in Bibliotheca Medico — Practica Murray. T. III. pag. 329. *A. D. Solander*, qui occaſionem optimam in Terra del fuego habuit arborem examinandi; qui præter locum natalem, qui alteri eſt America ſepteintrionalis, alteri vero Jamaica, & ceteræ ei adjacentes inſulæ, ſequentia refert: Verus Winteranus Cortex craſſitiem uni vel tribus quartis digiti cubici referrens, coloris eſt ex fuſco bruneo—cinnamomei, qui contuſus ſpargit odorem caryophilaceum talemquoque ſaporem acrem, diu inhærentem. Contra vero Canella alba colorem refert palide bruneum, & craſſitiem habens duabus octavis circiter digiti cubici, ejus ſapor affinis magis eſt caryophillis, quam cinnamomo.

Composita. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Lythrum salicaria. L.

Salicaria. Lisimachia Purpurea. Ph. Weiderich. Wrbina brunátná.

Lythrum. *Cal.* 12—phyllus. *Petala* 6, calyci inserta. *Caps.* 2—locularis, polisperma.

L. Salicaria. Foliis oppositis cordato—lanceolatis, floribus spicatis dodecandris.

Indigena. Perennis.

Off. Herba florida.

Forma. *Caulis rec.* bipedalis, erectus, inferne glaber, tetragonus, superne pubescens, pentagonus: angulis acutis, membranaceis, scabris; ramosus. *Rami* superiores sparsi; inferiores oppositi, tetragoni, scabri, minutim pubescentes, erecti, breviusculi, frequentes. *Folia* sessilia, amplexicaulia, lanceolata, acuta, tripollicaria, supra glabra, subtus minutim pubescentia, scabriuscula, venosa, margine scabra, patentia; inferiora opposita, superiora sparsa; ramea opposita. *Spicæ* terminales, sessiles, cylindricæ, e glomeribus florum compositæ: conglomeribus sparsis, remotiusculis, circiter octo floris, bractea fulcitis; terminalis spica duplo major, prior. *Blacteæ* glomerum solitariæ, ovatæ, longius acutæ, subtus villosæ, calycibus longiores, subpurpureæ; *florum* lineari—subulatæ, parviusculæ.

Cal.

Cal. *Per.* tubulatum, turbinato — cylindricum, ſtriatum, hirſutum: ore truncato, 12—fido: laciniis purpuraſcentibus; quarum 6 alternæ ſubulatæ, hirſutæ, erectæ; 6 aliæ alternæ parvæ, ovato — acutiuſculæ, inflexæ, concavæ, apice minutim barbatæ. Cor. purpurea. *Petala* 6. cuneiformi — oblonga, obtuſo — rotundata, erecta, calyce longiora, margine calycis intra lacinias calicis longiores inſerta, patentia. Petala ante eruptionem calycis tubo intruſa ſunt & recondita; hinc poſtmodum erumpunt, & quaſi e calyce extrahuntur. Stam. *Fil.* 12, ſubulata, albida, calycis parieti intra tubum inſerta; quorum 6 longiora, tubo calycis paulo longiora; 6 breviora, intra tubum recondita. *Anth.* ovatæ, luteæ, incumbentes. Pist. *Germen.* ſuperum ovatum, acutum, utrinque ſulcatum, glabrum, virideſcens. *Stilus* cylindricus, albus, corolla vix longior. *Stigma* capitatum, exſertum. Antheſis incidit ſub prima eruptione petalorum.

Proprietas. *Rec.* *Odor* nullus. *Sapor* herbaceus; *maſticata* folia recentia lubrica ſentiuntur.

ORDO
DIGYNIA.

Agrimonia eupatoria. L.

 Agri-

Agrimonia. Ph. Odermenig. Rzepiček, ſtarček.
Agrimonia. *Cal*. 5 — dentatus, altero obvallatus *Petala* 5. *Sem*. 2, in fundo calycis.
A. Eupatoria. Foliis caulinis pinnatis : impari petiolato, fructibus hiſpidis.
Indigena. Perennis.
Off. Herba.

Forma. *Caulis rec*. pedalis vel ultra, erectus, teres, ſimplex vel ſubramoſus, hirſutus. *Folia* alterna, petiolata, cum impari pinnata, 4 vel 5 — juga : pinnis oppoſitis, plano patentibus, ſeſſilibus, ovalioblongis, acutiuſculis, pollicaribus, ſupra viridibus, lineatis, adſperſis atomis elevatis, pubeſcentibus, ſubtus cinereis, hirſutis, venis ſuboppoſitis, margine inciſo — ſerratis: ſerraturis cilliatis, ſuberectis. Pinnæ aliæ parvæ, pariter ciliatæ, inter ſingulum par pinnarum majorum, ſeſſiles, inæquales, quarum majores ſuboppoſitæ, ovatæ, inciſo — ſerratæ; minores parvæ, ovatæ integerrimæ, alternæ. *Petioli* ſubtus convexi, ſupa concavo — canaliculati; quorum inferiores longiores, baſi vaginati. *Stipulæ* 2, oppoſitæ, ciliatæ, hirtæ; inferiorum petiolorum integræ, lanceolatæ, acutæ; ſuperiorum vero majuſculæ, amplexicaules, patentes, undique inciſæ.

Proprietas. *Rec*. *Odor* debilius aromaticus; *Sapor* ſubaromaticus, herbaceus. *Sicc*. *Odor* vix

vix ullus; *Sapor* ſubaromaticus, leviter ſtypticus.

ORDO.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA OFFICINALIS. L.

Euphorbium. Ph. Euphorbium. Euforbium.

Euphorbia. *Cor.* 4—ſ. 5—petala, calyci inſidens. *Cal.* 1—phyllus, ventriculus. *Caps.* 3—cocca.

E. Officinalis. Aculeata nuda multangularis; aculeis germinatis.

Exotica. Arbor.

Off. Gummi—reſina. (*a*)

FORMA. *Gummi—reſina* in lachrymis ſ. fruſtulis ſubrotundis vel oblongiuſculis, ſæpe ſubramoſis, perforatis, ſordide citrino—rufeſcens, facie fere ceræ flavæ, non ſplendens, leviuſcula, magnitudine circiter ſeminis Piſi vel ſupra, fragilis friabilis.

PROPRIETAS. *Odor* debilis, vix ullus. *Sapor* primum nullus, deinde valde punctorius, calidus, nauſeoſus, inhærens; *maſticata* hæc G. re-

a) Nobis potiſſimum impurum capſulorum valvulis, imo capſulis integris.

ſina inter dentes friabilis, ſolvitur in ore, linguam & fauces pungit uti mille acus, fere ut radix Ari, ſed fervida inſimul ſentitur, & diutiſſime inhæret, quamvis fauces aqua frigida ſæpius eluantur.

ORDO.

PENTAGYNIA.

✠ SEMPERVIVUM TECTORUM. L.

Sedum Majus. Sempervivum. Ph. Große Hauswurzel. Netřeſk, tučný mužjk wětſſj.

Sempervivum. *Cal.* 12—partitus. *Petala* 12. *Caps.* 12, polyſpermæ.

S. Tectorum. Foliis ciliatis, propaginibus patentibus.

Indigenum. Perenne.

Off. Planta.

FORMA. *Folia rec.* omnia radicalia, in formam Roſæ plenæ diſpoſita, ſeſſilia, cuneiformia, pluſquam pollicaria, carnoſa, craſſa, ſupra plana, ſubtus convexiuſcula, utrinque glabra, dilute virideſcentia, inferne albida, margine ciliata, ſuperne fuſca, acuminata, erecta; exteriora majora, interiora ſenſim minora. *Propagines* longius petiolatæ, globoſæ magnitudine ovi columbini

bini vel ultra, ſtrobiliformes, imbricatæ foliis erectis. *Petioli* propaginum cylindrici, teretes, ferruginei, lanuginoſi, longius exporecti, nudi, e baſi radicis, prope folia, exeuntes.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* debilis. *Sapor* ſubſalſus; *maſticata* folia recentia valde ſuccoſa, ſubſalſa, leniter ſtyptica.

COMPOSITA. *Plant. rec.* Unguentum Populeum.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.
ORDO
MONOGYNIA.

PUNICA GRANATUM. L.

Balauſtium. Granatum. Ph. Granatbaum, Granathblüthe, Granatäpfel. Pomaprán, granátowé gablko.

Punica. *Cal.* 5 — fidus, ſuperus. *Petala.* 5. *Pomum* multiloculare, polyſpermum.

P. Granatum. Foliis lanceolatis, caule arboreo. Axoticum. Arbor.

Off.

Off. Flores. Fructus recens pro succo. Cortex exsicatus sub titulo Malicorii.

FORMA. *Flores pleni*: CAL. *Perianth.* monophyllum, campanulatum, glabrum, coriaceum, 5 — fidum: laciniis lanceolatis, acutis. COR. rubra, polypetala semierupta. *Pomum* magnitudine fere pugni, subglobosum, ab apice ad basim usque compressiusculum, apice umbilicatum: umbilico prominente, tubuloso, intus vestito staminibus emarcidis; undique obductum *Cortice* coriaceo, firmo, rigido, crassitie lineæ unius, olivaceo, subrugoso, lucidiusculo; 9 loculare: loculamentis subbilocularibus, refertis *seminibus* plurimis, oblongis, albidis, acutis, hinc convexiusculis, inde angulatis, gibbis, arillatis: arillo crasso, angulato, succoso: succo rubro.

PROPRIETAS. *Corticis*: *Odor* vix ullus; *Sapor* intensius stypticus. *Pulpæ* seminum: *Odor* debilis subvinosus; *sapor* gratus, acidulus, leniter stypticus: *masticata* hæc pulpa succosa, inter dentes substridula. *Florum* siccat. *Odor* vix ullus; *Sapor* stypticus; *masticati* salivam rubro — violaceo tingunt.

PRÆPARATA. Vinum Granatorum.

AMYGDALUS PERSICA. L.

Persica. Ph. Pfirsche. Breskew.

Amygdalus. *Cal.* 5 — fidus, inferus. *Petala* 5 *Drupa* nucepuris perforata.

A.

A. Persica. Foliorum serraturis omnibus accutis, floribus sessilibus solitariis.
Hortensis. Arbor.
Off. Nuclei.

Forma. *Nux* ovata, acutiuscula, rubescens undique lacunulosa. *Nucleus* ovatus, acutus, utrinque compressus, substriatus, rubicundus, pulverulentus, unguicularis, intra testam osseam, crassam; *parencymate* albo, cotyledoneo. bipartibili.

Proprietas. *Nuclei odor* nullus; *Sapor* amygdalarum amararum.

Amygdalus communis. L.
Amygdalæ Dulces. Ph. **Mandelbaum, süsse Mandeln. Sladké mandle.**
A. Communis. Foliorum serraturis insimis glandulosis, floribus sessilibus geminis.
Exoticus. Arbor.
Off. Nuclei.

Forma. *Nux* pollicaris, ossea, tenerior, fragilis, ovato — acinaciformis, obtusa s. acutiuscula, latere utrinque compressa, læviuscula, poris plurimis pertusa, dorso rotundato, antice margine prominulo, secante; testa bilamellari: diploe sulcato — rugosa, instructa rete fibrillari, in sulcis lamellorum depresso. *Nucleus* ovatus, utrinque compressus, acutiusculus, tectus epidermide rubro — brunea, pulverulenta, scabriuscula,

cula, ſulcato — ſtriata, nervoſa; *parencymate* cotiledoneo, niveo, æquali, firmo, bipartibili.

PROPRIETAS *Odor* debilis. *Sapor* dulceſcens, mitis; *Maſticatæ* comminuuntur, ſaliva emulſiva.

PRÆPARATA. Oleum preſſum.

COMPOSITA. *Nucl.* Emulſio Laxativa.
Loch Sanum & Expertum.
Morſuli Imperatoris.
Ol. Emplaſtrum Noricum.

AMYGDALUS COMUNIS. L. *varietas prioris.*
Amygdalæ Amaræ. Ph. Mandelbaum, bittere Mandeln. Hořké mandle.
Exoticus. Arbor.
Off. Nuclei.

FORMA. Amigdalæ dulcis, verum minor.

PROPRIETAS. *Odor* debilis. *Sapor* amaricans, Lauroceraſi.

PRÆPARATA. Oleum Preſſum.

PRUNUS CERASUS. L.
Ceraſa Nigra. Ph. Schwarze Kirſchen. Třeſſně černé.
Prunus. Cal. 5 — fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupæ.* Nux ſuturis prominulis.
P. Ceraſus. Umbellis ſubpedunculatis, foliis lanceolatis glabris conduplicatis.
Hortenſis. Arbor.
Off. Fructus. Nuclei.

FOR-

Forma. *Drupæ rec.* pendulæ, ſubrotundæ, pondere circiter drachmæ 1, apice obtuſo — rotundato, depreſſiuſculo hilo puſillo notatæ, baſi concavæ, undique læves, nitidæ, atomis adſperſæ, nigræ; *parencymate* carnoſo — ſucculento, venoſo, tenerrimo, ſucco ſanguineo. *Nux* ſubrotunda, vix rugoſa, oſſea altero margine acuto, altero vero incraſſato, gibbo, angulis tribus obſoletis, baſi cicatriſata. *Nucleus* albus, amygdalinus, ovatus, acutus, ſtriatus. Variant fructus Ceraſi diverſe, colore nimirum, ſapore, magnitudine &c.

Proprietas. *Fructuum: Odor* nullus; *Sapor* magis vel minus acidulus, pro ingenio cujuſque varietatis; ex his Ceraſi autumnales ſubamari, ſubſtyptici ſentiuntur. *Nucleor.* proprietas fere amygdalarum amararum.

Præparata. Aqua.

Composita. *Aq.* Aqua Perlarum.

Prunus domestica. L.

Prunus. Ph. Zweſchpen, Pflaumen. Sſweſtka, ſliwa.

P. Domeſtica. Pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato — ovatis convolutis, ramis muticis.

Hortenſis. Arbor.

Off. Fructus, etiam exſiccatus. Nuclei.

Forma. *Drupa rec.* ovalis, utrinque obtuſa, apice puncto parvo, ſubrotundo, vix elevato, un-

undique tecta epidermide tenera, glabra, nitidiuscula, rore hyalino tincta diverso modo varians, colore, sapore, magnitudine. *Parencyma* carnoso—molle, succosum; transversaliter sectum æquale venosum. *Nux* ossea, scabriuscula, ovata, utrinque compressa, margine altero acutiusculo, altero incrassato, sulcato; unilocularis. *Nucleus* oblongus, amygdalinus.

Proprietas. *Odor rec.* debilis. *Sapor* acidulo—dulcescens. *Masticata* succosa; solvitur fere corticali parte remanente, subamaricanti—acidula comminuenda. *Nuclei* sapor cum amygdalis amaris conveniens.

Præparata. Pulpa.

Composita. *Pulp.* Electuarium Lenitivum sive Tamarindorum.

Prunus spinosa. L.

Acacia Nostras. Ph. Schlehen. Trnky.

P. Spinosa. Pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis.

Indigena. Frutex.

Off. Flores. Fructus. *(a)*

Forma, *Flores rec.* solitarii ad ramulos tenellos, nuper eruptos, oppositi, propria gemma, in ipso ramo siti, pedunculati. *Pedunculi* filiformes, teretes, nudi, uniflori longitudine vix folio-

a) Hujus Pulpam inspissatam pro succo Accaciæ divendunt mercatores fraudulenti.

liorum, patentes. CAL. *Perianth.* inferum, turbinatum, angulatum, glabrum, 5 — fidum: laciniis ovato — oblongis, obtusis, concaviusculis, patentibus. COR. nivea. *Petala* 5, ovata, obtusa, patentia, calice duplo longiora, eique infera; unguibus minutis. STAM. *Filam.* plura, erecta, calyci inserta, alba, longitudine corollæ, *Anth.* ovatæ, didymæ, incumbentes. *Pist.* viride. *Germen.* superum, ovatum parviusculum, glabrum. *Stylus* cylindricus, longitudine staminum. *Stigma* incrassato — truncatum, orbiculatum, emarginatum. *Drupa* subrotunda, glabra, nigra, magnitudine Cerasi minoris; *Nuce* ovata, compressiuscula, rugosa; *Nucleo* amygdalino.

PROPRIETAS. *Florum* recent. *Odor* gratus; *Sapor* amaricans in amygdalas amaras incidens. *Fruct.* rec. *Odor* nullus; *Sapor* acidus, acerbus, *Nucl.* amygd. amar. æmuli.

PRÆPARATA. Syrupus florum Acaciæ. (*b*)

ORDO

PENTAGYNIA.

✠ PYRUS MALUS. L.

Poma

b) Pulpa Prunorum silvestrium in officinis nostris etiam præsto est cum non raro præscribatur.

Poma Borſdorfiana. Ph. Borsdorfer, oder Maſchanſker Aepfel. Miſſenſké gablko.

Pyrus. Cal. 5—fidus. *Petala* 5. *Pomum* inferum, 5—loculare, polyſpermum.

P. Malus. Foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus.

Hortenſis. Arbor.

Off. Fructus recens pro ſucco &c. (*a*)

Forma. *Pomum rec.* ovali—ſubrotundum, majuſculum, utrinque obtuſum; viride, pallide luteum, inde rubicundum, glabrum; parencymate carnoſo, albido 5—loculari, tranſverſaliter ſecto notato punctis 10 ſubrotundis, circum loculamenta ſeminum in orbem diſpoſitis. *Semina* plerumque bina in ſingulo loculamento, ovato ſubgibbo, acutiuſcula, fuſca, glabra.

Proprietas. *Odor* debilis *Sapor* acidulo dulcis, gratus, ſubroſaceus, ſubvinoſus.

Composita. *Succ.* Extractum Martis cum ſucco Pomorum: hoc pro Liquore Viſcerali.

Tinctura Martis cum ſucco Pomorum.

Pyrus cydonia. L.

Cydonia Cotoneum. Ph. Quitten, Kütten. Kdaule neb gdaule, kutna.

P. Cydonia. Foliis integerrimis, floribus ſolitariis.

Hortenſis. Arbor.

Off.

(a) Adhibentur etiam alia Poma acidula in uſus.

Off. Fructus recens pro ſucco &c. Semen.

Forma. *Pomum rec.* ſubrotundum vel turbinatum, magnitudine pomi vulgaris, cortice tomentoſo, luteo, apice umbilicatum: umbilico depreſſiuſculo, 5—fido; *parencymate* firmo luteſcente, 5—loculari; *Semina* plerumque bina in ſingulo loculamento, ovata, acutiuſcula, hinc plana inde convexa, ſæpe ſubtriquetra, ferruginea.

Proprietas. *Pomi*: *Odor* maturorum fragrans, ſubcephalicus. *Sapor* immaturorum; auſterus; *maturatorum* vero adſtringens, acidulus, vinoſus. *Seminum* mucilaginoſa.

Præparata. *Succ.* Vinum Cydoniorum. (a)

Spiræa Ulmaria. L.

Barba Capræ. Ph. Geißbart. Kozý bradka.

Spiræa. Cal. 5 — fidus. *Petala* 5. *Caps.* polyſpermæ.

S. Ulmaria. Foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

Forma. *Radix rec.* ſubcylindrica, 2 — vel 3 — policaris, extus nigra, ſquamoſa undique obſeſſa fibris plurimis, filiformibus, nigris, ſubſpi-

a) Pag. 101 & 102. Pharmacopeæ noſtræ editionis quartæ & Mivæ & Panis Cydoniorum fit mentio.

ſpithameis, fibrilloſis, deſcendentibus. *Parency-ma* ſubcarnoſum, poſt ſectionem tranſverſalem centro medullari ampliſſimo æquali, albido, atomis ruſeſcentibus ſæpe adſperſo, circumdato annulo ferrugineo, punctato, intra corticalem partem ſito.

PROPRIETAS. *Radix rec.* *Odor* debilis; *Sapor* ſtypticus.

COMPOSITA. Emplaſtrum ad rupturas.

ORDO.

POLYGYNIA.

ROSA CENTIFOLIA. L.

Roſa Rubra. Ph. Rothe Roſe. Růže červená, neb domácý.

Roſa. *Petala* 5. *Cal.* urceolatus, 5 — fidus, carnoſus, collo coarctatus. *Sem.* plurima, hiſpida, calycis interiori lateri affixa.

R. Centifolia. Germinibus ovatis pedunculiſque hiſpidis, caule hiſpido aculeato, petiolis inermibus.

Hortenſis. Frutex.

Off. Flores. Damarcena. (*a*)

FORMA. *Flores rec.* in ramulis terminales.

a) Flores Roſarum Damaſcenarum nobis depromuntur ex roſa gallica. L.

Pedunculi teretes, hiſpidi; aculeolis & pilis brevibus capitulatis. CAL. *Periant.* 1—phyllum: *tubo* ovato—oblongo, inferne hiſpido aculeolis, ſuperne ſingulo glabro, collo coarctato; *limbo* 5—fido: laciniis reflexis, integris, ſubtus hiſpidis, ovato acutis, deſinentibus in apicem linearem, carinatum. COR. plena, dilute rubro—violacea, calyce longior: *petalis* obovatis, retuſis, patentibus. *Stam. Fil.* plurima, calyci inſerta, erecta. *Anth.* cordatæ, obtuſæ. PIST. *Germ.* plurima intra tubum calycis, ſubcylindrica, lanata. *Styli* ſubulati, piloſi, collo calycis paullo longiores. *Stigm.* digeſta in hemiſphærium planiuſculum, laxum, ſingula turbinata, truncata, emarginata. *Recept.* germinum hirſutum.

PROPRIETAS. *Petalorum rec. Odor* gratus, fragrans; *Sapor* ſubacidulus, debiliter roſaceus, *maſticata* ſubſtyptica, ſaliva violacea.

PRÆPARATA. Acetum.
Conſerva.

COMPOSITA. *Flor.* Electuarium Diaſcordii. Elect. ſeu Theriaca Andromachi.

Pulvis Fumalis Ordinarius. — Specierum pro Cucupha. — Sternutatorius variegatus.

Species Cephalice reſolventes pro Fomento. — Decocti pro Decocto Adſtringente.

Rósa canina. L.

Cynosbatos. Rofa Sylveftris. Ph. Hagebutten, Wilde Rosen, Hetschepetsch. Sſýpek, planá růže.

R. Canina. Germinibus ovatis pedunculifque glabris, caule petiolisque aculeatis.

Indigena. Frutex.

Off. Flores. Fructus. an Acini? (*a*)

Forma. *Flores rec.* 2 vel 3 congefti, axillares, brevius pedunculati. *Bracteæ* oppofitæ, lanceolatæ, feffiles, acutæ, pubefcentes, ciliatæ longitudine pedunculi, erectæ. Cal. *Perianth.* 1 — phyllum: tubo ovato, lævi, collo coarctato; limbo 5 — partito: laciniis reflexis, ovatis fupra minutim tomentofis, fubtus dorfo glabris, notatis punctis elevatis, margine dentatis: laciniis parvis, linearibus, fuboppofitis, remotis, erectis, utrinque communiter 2; terminali elongata, lineari acuta, concaviufcula, fubintegerrima. Cor. incarnata. *Petala* 5, feffilia, obcordata, patentia, calyce longiora, bafi albida. Stam. lutea. *Fil.* plurima, fetacea, decumbenti — patentia, corolla breviora. *Anht.* incumbentes, ovatæ, utrinque retufæ, concavæ, utrinque bimarginatæ. Pist. *Germ.* plurima intra tubum calycis paullo longiores, pilofi. *Stigm.* plurima, arcte coniventia in capitulum collum calycis coronans; fingula tur-

a) Juxta Præcepta Chirurgica.

turbinata, ſubbarbata, truncata, concaviuſcula. *Receptac.* ſeminum hirſuta. *Baccæ* (Cynosbaſti fructus) ovales, inferne angulatæ, apice obtuſæ, coronatæ margine e calycis laciniis deciduis, ſtaminibusque emarcidis, barbatæ, magnitudine glandis quercinæ vel ultra, undique læves, nitidæ, coccineæ, intus cavæ, uniloculares: cavo undique obſeſſo *ſeminibus* pallidis, ſubovatis, oblongiuſculis, dorſo convexis, lanatis, apice barbatis; quorum inferiora pedicellata, ſuperiora ſubſeſſilia. *Parencyma* baccæ carnoſum, firmum coccineum.

PROPRIETAS. *Florum rec. Odor* gratus, debilior; *Sapor* debilis ſubaceſcens; *Baccæ* acidulæ; *maſticatæ* firme comminuuntur, ſaliva coccinea; *coctæ* teneriores, ſolvuntur ſecundum partem tingunt aquam, ſapore magis acidulo inſtruuntur.

ROSA ALBA. L.

Roſa Pallida. Ph. Weiße Roſe. Bjlá růže.

R. Alba. Germinibus ovatis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petioliſque aculeatis.

Colitur. Frutex.

Off. Flores.

FORMA. *Flores rec.* circiter 3. in ramis terminales, pedunculati, nutantes. *Pedunculi* teretes, hiſpidi; pilis rigidis, capitulatis. CAL. *Per.* monophyllum, tubo ovato, glabro, collo coarctato; limbo utrinque minutim tomentoſo, ſubtus

ſcabrido: pilis rigidis, ſubalbidis, brevibus, ſubulatis, fuſco — capitulatis; 5 — partito, foliolis lanceolatis, pinnatis: pinnis foliaceis, inæqualibus, ciliatis, linearibus ſ. lanceolatis, ſubintegris; terminali longe majore, elongata, ovali — oblonga, dentato — pinnatifida. COR. nivea, calyce longior, plana: *petalis* numeroſis, obovatis, venoſis, calyce brevioribus; unguibus parvis, luteſcentibus. STAM. lutea. *Filam.* plurima, ſubulata, corolla longe breviora, calyci inſerta. *Anth.* ovales, ſupra concavæ, ſubtus convexiuſculæ, utrinque emarginatæ, incumbentes. PIST. *Germ.* numeroſa, intra tubum calycis, ſubcylindrica, lanata. *Styli* ſubulati, piloſi. *Stigm.* conniventia in hæmiſphærium planiuſculum, ſupra collum calycis paullo elevatum, laxum; ſingula turbinata, truncata, vix echinata.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* fragrans Roſæ; *Sapor* debilis, ſubſtypticus; *ſicc.* amarus, roſaceus.

PRÆPARATA. Aqua.

Infuſum Roſarum; hoc pro Mele Roſarum, & Syrupo Roſarum ſolutivo cum Senna.

COMPOSITA. *Aq.* Syrupus Kermeſinus.
Unguentum Roſatum album.
Mel. Electuarium Dentifritium.

RU-

♃ Rubus idæus. L.

Rubus. Ph. Hinbeere. Maliny, ostružiny.

Rubus. Cal. 5 — fidus. *Petala* 5. *Bacca* compoſita aciniis monoſpermis.

R. Idæus. Foliis quinto — pinnatis ternatiſque, caule aculeato, petiolis canaliculatis.

Indigenus. Suffrutex.

Off. Fructus recens pro Succo &c.

Forma. *Baccæ rec.* rubræ, magnitudine fere fructus Ceraſi, minutim lanuginoſæ, hemiſphæricæ, baſi cavæ: receptaculo clavato, albo, villoſo, carnoſo, echinato, cavo baccæ intruſo; facile decerpendæ, abſque laceratione; conflatæ e *drupulis* ſubrotundis, obtuſis magnitudine ſeminis Cannabini, confluentibus, diſpoſitis ſerie quadruplici annulari; ſingula drupula ſucculenta, monoſperma, apice inſtructa ſtylo ſetaceo, ferrugineo, perſiſtente, longitudine drupulæ, erecto, ſtigmate capitulato; *parencymate* ſuccoſo: ſucco rubro. *Nuculæ* parvæ, ſubreniformes, rugoſæ, obductæ mucilagine ſuccoſa; *teſta* fragiliuſcula, nucleo oleoſo.

Proprietas. *Rec. Odor* fragrans, ſuaveolens, gratiſſimus. *Sapor* grate acidulus, odori congruens. *Maſticatæ* baccæ ſucculentæ, ſapidiſſimæ; extrahitur ſuccus, remanent ſemina, & corticalis pars, comminuenda; ſaliva tingitur colore dilute purpuraſcente. Sæpius vermiculis ſcatent baccæ.

PRÆPARATA. Aqua.
Syrupus.

✠ FRAGARIA VESCA. L.

Fragaria. Ph. Erdbeere. Gahody, neb gahodnjk.

Fragaria. *Cal.* 10 — fidus. *Petala* 5. Receptaculum femifrum ovatum, baccatum, deciduum.

F. Vefca. Flagellis reptantibus.

Indigena. Perennis.

Off. Fructus recens pro Aqua & fucco &c. (Herba raro.)

FORMA. *Caulis rec.* herbaceus, erectus, teres, pilofo — pubefcens, fimpliciufculus, palmaris. *Stolones* repentes, filiformes, nudi, pubefcentes, fufco — viridefcentes, fpithamæi, apice foliofi, fibriculis tandem radicantes. *Folia* longius petiolata, ternata: foliolis ovatis, obtufis, ferrato — incifis, fupra glabris lineatis, fubtus glaucis, nervofis, pubefcentibus, præcipue nervis. *Petioli* teretes, pubefcentes, fupra canaliculati, bafi vaginati: vaginis membranaceis, albidis, concavis definentibus in *ftipulas* 2, lanceolatas, acutas, fubpubefcentes. *Baccæ* ovato — fubrotundæ, obtufæ, e *Receptaculo* fucculento natæ, magnitudine feminis Pifi majoris, nitidæ, hinc fanguineæ, inde albido — pallidæ: *Seminibus* feffilibus, rubris, nitidis, parviufculis, ovatis utrinque compreffiufculis, dorfo minutim carinatis, acu-

acutiuſculis, latere interiore ſtylo inſtructis perſiſtente, ſubulato, truncato, ſubfuſco, bacca vix longiore; ſingulis in ſingula foveola ſolitariis; prope baſim inſerto, gelatinoſo, albo baccæ intruſo. *Parencyma* baccæ carnoſo — ſucculentum, molle, albidum; tranſverſaliter ſectum æquale, in centro foveola vacua.

PROPRIETAS, *Herbæ rec. Odor* nullus; *Sapor* herbaceus, auſteriuſculus; *maſticata* comminuitur, ſaliva dilute virideſcente; *Baccæ Odor* fragrans, ſvaveolens, gratiſſimus. *Sapor* leniter acidulus. Baccæ recentes facile corrumpuntur, brevi, h. c. intra diem unum alterumve molleſcunt, fulceſcunt, odorem deponunt gratiſſimum, mucronem contrahunt.

PRÆPARATA. Aqua.

TORMENTILLA ERECTA. L.

Tormentilla. Ph. **Tormentille. Nátržnjk, tržené, kořenj.**

Tormentilla. Cal. 8 — fidus. *Petala* 4. *Sem.* ſubrotunda, nuda receptaculo parvo ex ſucco afixa.

T. Erecta. Caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec.* ſubcylindrica, ſuperne craſſior, ſæpe ſubrotunda, fibrilloſa, craſſitie digiti, 2 — vel 3 — pollicaris, extus fuſca, ſuperne ſquamata; *parencymate* firmo, rubicundo; poſt

ſe

sectionem transversalem centro medullari subrotundo, cum punctis 5 in margine; peripheria striis concentricis & radiis ternis longitudinalibus, e singulo puncto centri ad corticem.

PROPRIETAS. *Rec. & Sicc. radicis*: *Odor* nullus; *Sapor* stypticus.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. Electuarium Diascordii.

Species Decocti pro Gargarismate Adstringente.

GEUM URBANUM. L.

Caryophyllata. Ph. Benediktwurzel. Benedykt, neb benedyktowý kořen.

Geum. Cal. 10 — fidus. *Petala* 5. *Sem.* arista geniculata.

G. Urbanum. Floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec.* trunco oblongo, crassiusculo, bipollicari vel ultra, extus fusco, squamis emortuis obducto, undique præcipue in apice, instructo fibris filiformibus, rubicundis, elongatis, glabris parce fibrillosis, subhorizontalibus. *Parencyma* firmum, post sectionem transversalem centro medullari fusco, angulato, obducto peripheria fasciis concentricis nebulosa; in aere relicta radix recens, transversaliter secta, sensim

ru-

rubescit, linea concentrica alba, validiore, versus peripheriam existente.

PROPRIETAS. *Radicis rec. Odor* caryophyllæus (scilicet radicis tempore verno, in solo sicco lectæ); *Sapor* stypticus.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA ORDO MONOGYNIA.

CAPPARIS SPINOSA. L.

Capparis. Ph. Kappern. Kappary.

Capparis. Cal. 4 — phyllus, coriaceus. *Petala* 4. *Stam.* longa. *Bacca* corticosa, 1 — locularis pedunculata.

C. Spinosa. Pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex radicis.

FOR-

Forma. *Cortex sicc.* radicis convolutus, in frustis digitalibus, cinereus, subrugosus, annulis notatus transversalibus, parallelis, crassitie lineæ vel supra.

Proprietas. *Odor* nullus; *Sapor* amarus, acerbiusculus.

Compositta. Species Decocti Aperitivi.

Chelidonium majus. L.

Chelidonium Majus. Ph. Groß Schellkraut. Celidonya, nebeský dar, raupowé kořenj, wlaſſtawičnjk wětſſj.

Chelidonium. *Cor.* 4 — petala. *Cal.* 2 — phyllus. *Siliqua* 1 — locularis, linearis.

C. Majus. Pedunculis umbellatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. (Herba raro;)

Forma. *Radix rec.* cylindrica, descendens, palmaris fibrillosa, subramosa, superne bifida, extus rubicunda, pelliculis nigricantibus, emortuis, laxe tecta; *parencymate* subcarnoso, luteo; transversaliter secto lactescente, centro medullari orbiculato, circumdato disco corticali. *Caules* plures ex una radice, erecti, subtetragoni, scabridi, minutim pubescentes, inferne simplices, nudi, superne ramoso — dichotomi, foliosi. *Rami* divaricati, teretiusculi, subangulati, pubescentes. *Folia* pinnata, supra glabra subtus villosa; foliolis suboppositis, petiolatis, ovatis, ob-

obtusis, venosis, lobatis: sinubus obtuso — rotundatis; lobis obtusis, obtuse serratis; terminali foliolo obovato, e pinnis confluentibus nato, apice trifido; radicali longius petiolata; superiora sessilia, ramis opposita. *Petioli* ad axillas pubescentes, subtus convexi, supra concavi, basi axilla lanati. *Axillæ* nodosæ.

PROPRIETAS. *Radic. rec. Odor* graviusculus. *Sapor* amarus, acris; *masticata* salivam croceo tingit; *Herbæ Odor* subgraviusculus; *Sapor* leniter americans, acris. Tota planta, utpote rami, caules, petioli & foliorum nervi, lactescens; *lacte* croceo, quod, cuti s. papyro illinitum, maculas croceas facit, aqua facile eluendas; vasculo exceptum hoc lac, siccescit, & abit in massam penitus fusco — nigricantem, intensius amaram. *Sicc.* planta magis amara, minus acris, ingrata, faucibus inhæret.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. *Ext.* Emplastrum Diabotanon.

PAPAVER SOMNIFERUM. L. (*a*)

Papaver Album. Ph. Weißer Mohn. Bjlý mák.

Papaver. Cor. 4 — petala. *Cal.* 2 — phyllus. *Caps.* 1 — locularis, sub stigmate persistente poris dehiscens.

P. Somniferum. Calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis.

Hortense. Annuum. Off.

a) Sunt, qui opium ex Papavere orientali derivant.

Off. Capsulæ (Capita vulgo) Semen. Herba recens.

Forma. *Caulis rec.* subbipedalis, erectus, teres, minutim angulatus, glaber, rore glauco obductus, ramosus. *Rami* alterni, erecti, teretes, vix angulati. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, spithamæa, ovato — oblonga, obtusa, margine incisa s. grosse crennata, utrinque glabra, supra viridescentia, subtus glauca, venosa, venulis reticulata. *Pedunc.* terminales in ramis, subsolitarii, elongati, erecti, hispidi, ceterum nudi, uniflori. *Capsula* (s. caput) globosa, magnitudine fere Pruni fructus, glabra, rore glauco — cærulescente tincta coronata stigmate persistente, subdecemlocularis, apice substigmate, decemfariam hians: laciniis totidem ovato — obtusis, subrevolutis; dissepimentis utrinque planis, dorso incrassatis, undique rugosis, ad centrum capsulæ non attingentibus. *Semina* millena, parviuscula, fusca, subrotundo — reniformia, punctis excavatis undique rugosa, colore albo. *Opium* crudum: *Gummi — resina* in frustis majoribus, ponderosa, æqualis, pura, extus rufo fusca, subsplendens, fractura intus viridescens, vel nigricans, pro gradu siccitatis, opaca plastica, digitis subadhærens.

Proprietas. *Herbæ rec. Odor* debilius narcoticus, opio congruens. *Folia* odore sunt debiliora; rami fortiore; pedunculi vero apices & cap-

capſulæ juniores adhuc validiore. *Sapor* herbaceus. Pedunculorum apices & capſulæ juniores, dum ſauciuntur, e corticali parte *lac* ſtillat album, cremori lactis ſimillimum, caulis tenerior, rami & coſtæ atque nervi foliorum lac fundunt dilutius. Capita ætate provectiora parum lacteſcunt, matura autem nihil. Hoc lac (ex noſtro papavere nigro), collectum, & vaſculis immiſſum validius ſpirat Opium, dum recens; in aere ſiccatum abit in gummi — reſinam rubicundam, ſubpellucidam, quæ inter digitos tractata plaſtica deprehenditur, digitis ſubadhæret, odore Opii remiſſiore in candelæ flamma accenſa flagrat: flamma vivida, lucida, fuliginoſa, odore non narcotico relicto carbone atro, ſubſplendente. *Opii orientalis Odor* validus Papaveris; *Sapor* nauſeoſus, amaricans, acris, calidiuſculus. Ignis flamma accenſum opium flagrat: flamma vivida, odore minime narcotico.

Præparata. Oleum preſſum ex Seminibus. Opium.

Syrupus Papaveris albi ſive e Mecanio.

Composita. *Herb.* Unguentum Populeum.

Capit. Syrupus de Siliquis ſive Diacodii Crocatus, & Liquidus; hic pro Electuario Infantum ſeu Requie Nicolai & Pilulis Balſamicis Mortoni.

Ol. Balſamum Sulphuris Rulandi.

Op.

Opi. Electuarium Diascordii. — Elect. seu Theriaca Andromachi.
Essentia Anodyna, seu Laudanum liquidum Sydenhami.
Extractum Opii, hoc pro Tinctura Anodina.
Pilulæ de Cynoglosso. — de Styrace.
Pulvis Anodinus.
Syrup. Pilulæ de Styrace.

PAPAVER RHOEAS. L.

Papaver Eraticum. Rhoeas. Ph. Klapperrose, Rothe Kornblume. Planý neb wlčj mák.

P. Rhoeas. Capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis.

Indigenum. Annuum.

Off. Flores.

FORMA. *Flores rec.* longius pedunculati. CAL. *Perianth.* diphyllum: foliolis æqualibus, ovatis, obtusis, concavis, conniventibus, extus adspersis tuberculis setiferis, scabro — hispidis, corollam nondum eruptam includentibus, sub eruptione corollæ deciduis. COR. phœnicea, pulcherrima, sæpius plena. *Petala* semiorbiculata, obtuso — rotundata, sessilia, basi venosa, erecto — patentia. STAM. purpurascentia. *Filam.* plurima, subulata, corolla longe breviora, erecta. *Anth.* lineares, truncatæ, utrinque planæ, purpureæ, sulco longitudinali luteo. PIST. *Germen.* ovato —

glo-

globoſum, glabrum, longitudine ſtaminum, glaucum. *Stillus* nullus. *Stigma* hemiſphæricum, ſeſſile, latitudine germinis, undique ſtriatum : ſtriis radicantibus elevatis, purpureis, minutim pubeſcentibus.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* ſatis fortis, papaverinus; *ſapor* debilis, vix ullus; *maſticata* petala tenera, lubrica, mucilaginoſa : ſaliva violacea. *Siccati* flores purpuraſcentes, inodori fere.

PRÆPARATA. Aqua.

Conſerva.

Syrupus.

COMPOSITA. *Flor.* Infuſum ſeu Tinctura Papaveris Erratici.

Species Decocti Pectoralis.

Aq. Infuſum ſeu Tinctura Papaveris Erratici.

Conſerv. Electuarium Infantum, ſeu Requies Nicolai. — Pectorale.

CAMBOGIA GUTTA. L.

Gummi Gutta. Ph. Gummigutt. Gummigutta.

Cambogia. Cor. 4 — petala. *Cal.* 4 — phyllus. *Pomum* 8 — loculare. *Sem.* ſolitaria.

Exotica. Arbor.

Off. Succus inſpiſſatus gummoſo — reſinoſus.

FORMA. *Gummi — reſina* in maſſa ſolida, duriuſcula, homogenea, puriſſima, croceo — rubra.

bra, opaca, leviſſima, nitida, fragilis: fracturis planis.

Proprietas. *Odor* nullus. *Sapor* vix ullus. *Maſticatum* primum friabile, dentibus dein adhæret, tum ſolvitur, & ſenſationem ſiccatis cujuſdam faucibus imprimit, ſalivam tingit colore aureo luteo.

Bixa orleana. L.

Orleana. Ph. Orlean. Orlean.

Bixa. *Cor.* 10 — petala. *Cal.* 5 — dentatus. *Capſ.* hiſpida, 2 — valvis.

Exotica. Arbor.

Off. Fœcula croceo — tincta, orta ex pulpa ſemen circumdante.

Forma. *Maſſa* coccinea in fruſtis majoribus, ſolida, æqualis pura, fragiliuſcula, ſubinquinans.

Proprietas. *Odor* ingratus, etiam recenter paratæ orleanæ, cum tota arbor ingratum ſpargat odorem; ea vero, quæ apud nos venditur, ſæpe Tabacum redolet, forte a præparatione. *Sapor* debilis, obſcure ſalſus; *maſticata* in ore ſolubilis, ſalivam coccineo colore tinges.

Composita. Unguentum de Uvis ſive ad Labia.

Tilia europea. L.

Tilia. Ph. Linde, Lindenbaum. Lipa.

Tilia. *Cor.* 5 — petala. *Cal.* 5 — partitus. *Bacca* ſicca globoſa, 5 — locullaris, 5 — valvis, baſi dehiſcens.

T. Europea. Floribus nectario destitutis. Indigena. Arbor

Off. Flores.

Forma. *Corymb.* florum simplices, axillares e foliis, prope gemmam futuri anni, longius pedunculati, patentes, solitarii, glabri, subsexflori. *Pedunculi* proprii versus basim cingulo notati, e punctis circiter tribus constante. *Bractea* linearis, solitaria, membranacea, albido — subviridescens, glabra, venulis reticulata, apice obtuso rotundata, inferne attenuata, basi sæpe dimidiata, palmaris, longitudine corymbi, a medio inferne pedunculo adnata, superne libera. Cal. *Perianth.* 1 — phyllum, 5 — partitum: lacciniis albidis ovato — lanceolatis, acutis, concavis, extus glabris, intus villosis, reflexo - patentibus. Cor. *Petala* 5, oblongo — cuneiformia, obtusa, inferne in ungues lineares breves attenuata, calyce paullo longiora, patentissima, concaviuscula, albida. Stam. *Filam.* plurima subulata, albida, corolla longiora, erecta. *Anth.* luteæ, cordatæ. Pistil. *Germen* superum, subrotundum, tomentosum. *Stylus* cylindricus, albus, staminibus paulo brevior. *Stigma* subcapitato — truncatum, rugosum.

Proprietas. *Florum rec. Odor* svaveolens, præcipue tempore vespertino, in flores Naphæ incidens. *Sapor* debilis, subglutinosus; *masticati*

 flo-

flores recentes lubrici ſentiuntur, mucilaginoſi. Petala, peracta antheſi, rubeſcunt; decerpta etiam rubeſcunt inter ſiccandum. *Siccati* flores fere inodori, ſapore pariter ſubglutinoſo.

PRÆPARATA. Aqua florum.

COMPOSITA. *Flor.* Aqua ſeu Balſamum Embrionis.

Aq. Aqua Perlarum.

THEE BOHEA. L.

Thee Orientale. Ph. Orientaliſcher Thee. Orientálſký Thè.

Thee. Cor. 6 — ſ. 9. — petala. *Cal.* 5 — ſ. 6 — phyllus. *Caps.* 3 — cocca.

T. Bohea. Floribus hexapetalis.

Exoticum. Arbuſcula.

Off. Folia.

FORMA. *Folia* ſubadulta, alterna, breviter petiolata, ovali — oblonga, obtuſa, pollicaria vel ultra, venoſa, margine ſerrata: ſerraturis accutis, fuſcis, adpreſſiuſculis; utrinque glabra, ſæpe ſubtus pubeſcentia: pilis raris, tenuibus.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* gratus. *Sapor* amaricans, acerbus, non ingratus tamen. Folia echina ad nos apportantur convoluta, ſicciſſima, fuſca, rariſſime integra, ſæpius extremitatibus difractis.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS. L.

Caryophyllus. Ph. Gewürznägelein. Kráмſký hřebjček.

Anthophylli. Ph. Mutternägelein. Matka hřebičkowá.

Caryophyllus. *Cor.* 4—petala. *Cal.* 4—phyllus, duplicatus. *Bacca* 1—ſperma, infera. Exoticus. Arbuſcula.

Off. Flos immaturus. Fructus.

Forma. *Caryophyll. ſicc.* *Flores* inexplicati, ferruginei, unguiculares vel ultra, *germine* infero cylindrico, teretiuſculo, ſubtetragono, minutim rugoſo, terminato *Peryantheo* fructus 4—partito: laciniis lanceolatis, acutis, concavis, erectis, germine multum brevioribus. Perianthium floris & *Corolla*, nondum explicata, in ſphærulam imbricata, longitudine calycis fructus. Stam. plura, intra corollam latentia.

Fructus (Anthophylli) capſula ovali—cylindrica, apice umbilicata: calycis laciniis perſiſtentibus; minutim rugoſa, magnitudine glandis quercinæ, unilocularis, monoſperma, continens *Nucleum* magnitudine fere & figura capſulæ, fuſcum, bipartibilem: ſutura anfractuoſa; ſiccatum ſolidum, duriſſimum.

Proprietas. *Caryophyll.* *Odor* fragrans validus, aromaticus, ſvavis. *Sapor.* aromaticus, fortis, calidus, acriuſculus, ſubamaricans; *maſticati* fauces linguamque calefaciunt, halitu fragrantiſſimo. *Antophyll.* *Odor* debilis caryophyllorum; *ſapor* ſubſtypticus, aromatico—caryophylleus, debilior.

Præparata. Oleum Caryophyllorum destillatum.

Composita. *Fl.* Acetum Antisepticum.

Aqua seu Balsamum Embryonis. — Melissæ composita.

Elixirium Vitrioli.

Essentia Carminativa.

Pilulæ de Cynoglosso.

Pulvis dentifricius albus. — Specierum Aromaticarum pro Morsulis Imperatoris. — Specierum pro Cucupha. — Sternutatorius Variegatus, & Viridis. — Vitæ.

Spiritus Aromaticus.

Tinctura Laccæ aromatica.

Ol. Balsamum Apoplecticum. — Caryophyllorum.

Emplastrum de Labdano.

Essentia, sive Balsamum Vitæ Hoffmanni.

Liquor seu Sal volatile oleosum.

Cistus creticus. L.

Ladanum. Ph. Gummiladan. Ladanum.

Cistus. Cor. 5 — petala. *Cal.* 5 — phyllus: foliolis duobus minoribus.

C. Creticus. Arborescens exstypulatus foliis spatulato — ovatis petiolatis enerviis scabris, calycinis lanceolatis.

Exoticus. Arbor. Off.

Off. Resina.

Forma. *Resina* in massa subcylindrica, crassitie pollicis, sæpe in spiram torta, solida, dura, sublapidea, ponderosa, homogena, sicca, opaca, fusca, in frusta secta & luci exposita subsplendens atomis micantibus, sparsis.

Proprietas. *Odor* balsamicus, gratus; *Sapor* debilis, balsamicus; *masticata* hæc resina inter dentes dura, friabilis, comminuitur, arenulosa sentitur non solvitur.

Composita. Candelæ Fumales.
Emplastrum de Labdano.
Pulvis Fumalis ordinarius.

ORDO
DIGYNIA.

Poeonia officinalis. L.

Poeonia. Ph. Pfingstrose, Peonie. Piwoňka.

Poeonia. Cal. 5 — phyllus. *Petala* 5. *Styli* o. *Caps*, polyspermæ.

P. Officinalis. Foliolis oblongis.

Hortensis. Perennis.

Off. Radix. Flos. (Semina raro.)

Forma. *Radix rec.* majuscula, informis, subramosa, breviuscula, extus rubra, *parencymate*

te incarnato. ſtriis radiantibus; tuberoſa: tuberibus e radice exeuntibus, pedunculatis, fuſiformibus, palmaribus vel ultra, ſæpe ſpithamæis, ſimplicibus vel proliferis, ſæpe maniliformibus, extus dilute rubicundis, læviuſculis, *parencymate* albo, carnoſo, ſolido. *Flores* pleni. *Bracteæ* 2, foliaceæ, calyci ſubjectæ & approximatæ. CAL. *Perianth.* 5—phyllum: foliolis ovatis, obtuſis, nervoſis, minutim villoſis, concavis, patentibus, inæqualibus. COROLLA plena, hæmiſphærica, magnitudine pugni, kermeſina: *petalis* ſeſſilibus, numeroſis, cuneiformibus, obtuſis ſubinciſis. STAM. in petala mutata. PIST. *Germina* 2 vel 3, ovato—oblonga, tomentoſo—ſericea, alba, angulata. *Styli* nulli. *Stigm.* lanceolata, compreſſa, ſubcarnoſa. kermeſina. *Semina* ovata, magnitudine ſeminis Piſi, cincta cortice nigro—fuſco, nitido; *parencymate* cotyledoneo, ſolido, extus villoſo, poſt ſectionem tranſverſalem notato puncto centrali.

PROPRIETAS. *Radicis rec. Odor* gravis, narcoticus, floribus congruens; *Sapor* acriuſculus; *tuberum rec. Odor* fortis, fere Raphani, ſed ſimul graviuſculus, hircino—narcoticus, cum floribus conveniens. *Sapor* dulceſcens, acris inſtar Raphani: acrimonia fugaci. Sub reſectione tuberum rec. in taleolas, culter corripitur, uti ſolet ex reſectis malis citreis. Tubera cocta molleſcunt,

cunt, maſticata tenera, ſed ſimul firmiuſcula, odore alimentari, aliquantum tamen hircino, ſapore dulceſcente, ex Naſturcio participante. *Florum rec. Odor* narcoticus; *Sapor* narcoticus, amaricans; *maſticati* teneri, ſaliva rubro — violacea.

PRÆPARATA. Syrupus.

COMPOSITA. *Rad.* Aqua Embryonis. — Hyſterica Fœtida.

Pulvis Marchionis. — ad Tuſſim.

Flor. Pulvis Sternutatorius variegatus.

* DELPHINIUM CONSOLIDA. L.

Calcatripa. Ph. **Ritterſporn. Králowſký ſwálnjk, rytjřſká oſtruha, černohláwek.**

Delphinium. Cal. o. *Petala* 5. *Nectarium* bifidum, poſtice cornutum. *Siliquæ* 3. ſ. 1.

D. Conſolida. Nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo.

Indigenum, Annuum.

Off. Flores.

FORMA. CAULIS nullus. *Corolla* violacea. *Petala* 5, ovata, acutiuſcula, patentia, æqualia, ſubtus minutim pubeſcentia, linea longitudinali; ſupremum baſi productum in cornu filiforme, rectum, obtuſum, cineraſcens, patens. Nectarium monophyllum, dilutius violaceum, concavum, compreſſiuſculum, antice margine utrinque auriculato, rotundatum, apice erectum, obtuſum, bifidum, fauce ſtriata, baſi cornutum: cornu pe-

tali ſupremi cornu intruſo. STAM. plurrima, alba, inferne plana, ciliata, ſuperne ſubulata, longitudine nectarii, conniventia, erecta. *Antheræ* luteæ, ſubrotundæ, erectæ, obtuſæ, compreſſæ, didymæ, margine pubeſcentes. PIST. *Germen.* cylindricum, glabrum, virideſcens. *Stylus* cylindricus, albus, ſtaminibus brevior. *Stygma* obtuſum.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* debilis, aphrodiſiacus. *Sapor* amarus.

COMPOSITA. Pulvis Sternutatorius variegatus.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA. L.

Staphiſagria. Ph. **Steffenskörner, Lausſaamen.**

Wſſiwec, plané wjno, bleſſnjk.

D. Staphiſagria. Nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis ; lobis obtuſis.

Indigeno — Bienne.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* majuſcula, angulata, tetragona, ſæpe trigona, baſi truncata, apice acutiuſcula, incurvata, dorſo plano — convexa, antice carinata, undique rugoſa punctis excavatis ; *parencymate* conſtante ex nucleo albido.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* fœtidus ; *Sapor* intenſe amarus, acris, nauſeoſus, diu inhærens ; *maſticata* fauces rodunt.

COMPOSITA. Unguentum ad Phtiriaſim, ſeu contra pediculos. Aco-

✠ ACONITUM NAPELLUS. L. (*a*)
Napellus. Ph. Eisenhüttel, Würgerig (*b*) Ssa=lomunek.

Aconitum. Cal. o. *Petala* 5: supremo fornicato. Nectaria 2, pedunculata, recurva. *Siliquæ* 3. s. 5.

A. Napellus. Foliorum lacciniis linearibus superne latioribus, linea exaratis.

Hortense. Perenne.

Off. Herba recens.

FORMA. *Rec. Caules* plures ex una radice, tripedales, vel ultra, erecti, teretiusculi, subangulati: angulis solitariis, obsoletis, e dorso petioli decurrentibus, inferne glabri, superne minutim pubescentes, simplices. *Folia* alterna, petiolata, utrinque glabra, supra obscure viridia, lineata, subtus pallidiora, circumscriptione rotunda, 5—partita: lobis cuneiformibus, bitrifidis, incisis, laciniis mucronatis. *Petioli* glabri, subtus teretes, supra concavi. *Racemus* terminalis, elongatus, erectus, inferne compositus, foliosus, floribus pedunculatis, erectis.

PROPRIETAS. *Recent. Odor* fortis, herbaceus. *Sapor* herbaceus.

PRÆPARATA. Extractum.

NI-

a) Etiam aliæ species flore cœruleo promiscue adhibentur.
b) Ita incolis montium Krconossorum vulgo Giganteorum, cum capræ eo devorato quasi strangulentur.

Nigella sativa. L.

Nigella. Ph. Schwarzer Kümmel, Gretel in der Staude. Cžerný neb zahradnj kmjn.

Nigella. Cal. o. *Petala* 5. *Nectar.* 5, trifida, intra corollam. *Caps.* 5, connexæ.

N. Sativa. Piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpiloſis.

Exotica. Annua.

Off. Semen.

Forma. *Semina* trigona, compreſſiuſcula, apice obtuſa, baſi obliqua, undique rugoſo — ſcabra, nigra.

Proprietas. *Odor* fragrans; *Sapor* aromaticus in Saſſafras incidens.

Composita. Pulvis contra Vermes, ex hoc Trochiſci contra Vermes.

ORDO.

POLYGYNIA.

Illicium annisum. L.

Anniſum Stellatum. Ph. Sternaneis. Badian.

Illicium. Cal. 6 — phyllus. *Petala*. 27. *Caps.* plures in orbem digeſtæ, bivalves, 1 — ſpermæ.

I. Anniſum. Floribus flaveſcentibus.

Exoticum. Arbor. Off.

Off. Fructus.

Forma. *Fructus sicc.* pollicaris, infra rugosus, supra glaber, 8 — partitus: *Capsulis* stellæ instar in orbem dispositis, ovatis, compressis, rigidis, duriusculis; fragilibus, unilocularibus, superne hiantibus, monospermis. *Semina* majuscula, ovata, compressiuscula, utrinque obtusa, hilo in apice, dorso convexa, antice carinata, undique nitida, duriuscula, fragilia; *nucleo* cotyledoneo, sordide albo.

Proprietas. *Sicc. Capsulæ*: *Odor* Anisi, fortis; *Sapor* Anisi, dulcescens, gratus, *Seminum* cortex anisatus, capsulis debilior. *Nucleus* oleosus, odore & sapore valido Anisi; *masticatus* pinguiusculus.

Præparata. Essentia.

Composita. Infusum, sive Aqua laxativa.
Hydromel Infantum.
Syrupus Mannatus.

* Anemone hepatica. L.

Hepatica nobilis. Ph. **Edel-Leberkraut. Gåternjsk.**

Anemone. Cal. o. *Petala* 6 — 9. *Sem.* plura.

A. Hepatica. Foliis trilobis integerrimis.

Indigeno — Perennis.

Off. Herba.

Forma. *Folia* radicalia, annotina, petiolata, cordato — trilobata, utrinque glabra, supra lucidiuscula,

diuſcula, margine piloſa, pollicaria, magis lata quam longa: lobis ovatis, obtuſis.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* debilis. Planta recens maſticata, acrimoniam levem prodit.

ANEMONE PRATESIS. L.

Pulſatilla nigricans. Ph. Schwärzliche Küchenschelle. Koniklec černý.

A. Pratenſis. Pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis.

Indigeno Perennis.

Off. Herba. Flos.

FORMA. *Caulis* folitarius (vel etiam plures ex una radice) ſimpliciſſimus, erectus, dodrantalis, ſtriatus, ſubangulatus, hirſutus, ſubnudus. *Folia* compoſita, ſubtus piloſa; laciniis linearibus, acutis; radicalia bipinnata, longius petiolata; caulina ſeſſilia, oppoſita, in medio caulis ſita, magis hirſuta, *Pedunc.* terminalis, hirſutus, nudus, uniflorus. *Flor.* nutans. CAL. nullus. COR. campanulata, polypetala, ſordide rubro violacea, extus hirſuta, intus glabra: petalis ovato—oblongis, obtuſis, venis pictis. STAM. *Filam.* plurima ſetacea, corolla breviora. *Anth.* didymæ, erectæ, luteæ. PIST. *Germ.* plurima, ſubulata, albido—hirſuta. *Styli* ſetacei, erecti, purpuraſcentes, pubeſcentes, longitudine corollæ. *Stigmata* obtuſa, ſubcapitata, fuſca.

PRO-

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* vix ullus. *Sapor* acris, inhærens. *Masticata* fauces & linguam corrodit. *Siccat.* *Sapor* herbaceus, *masticata* tandem acris, acrimonia diu inhærente, etiamsi fauces aqua frigida eluantur.

PRÆPARATA. Aqua.
Extractum.

CLEMATIS ERECTA. L.

Flamula Jovis. Ph. Brennkraut. Plamýnek, prysskyčnjk.

Clematis. *Cal.* o. *Petala* 4. rarius 5. *Sem.* caudata.

C. Erecta. Foliis pinnatis: foliolis ovato — lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis, tetrapetalisque.

Indigena. Perennis.

Off. Folia. Flores.

FORMA. *Folia* opposita petiolata, pinnata: foliolis oppositis, ovato — lanceolatis, integerrimis, acutis, subbipollicaribus, supra glabris, subtus nervosis; grossius reticulatis, pube rara adspersis, suberectis. Umbellæ florum plures, terminales subfastigiatæ, striatæ, erectæ, glabriusculæ, quarum universales vestitæ sunt involucro foliaceo: foliolis pinnatis seu simplicibus; partiales vero nudæ. CAL. nullus. COROLLA ochroleuca. *Petala* 5, lineari — cuneiformia, obtusa, vix semiunguicularia, minutim villosa, nervoso — venosa, patenti — reflexa. STAM. *Filam.* plurima, sub-

ſubulata, erecta, corolla paulo breviora. *Antheræ* lineares, utrinque canaliculatæ, erectæ. PIST. *Germina* plura, ſubrotunda, villoſa. *Styli* barbati, ſtaminibus fere breviores, erecti. *Stigmata* cylindrica, glabra, obtuſiuſcula.

PROPRIETAS. *Sicc. herbæ. Odor* debilis; *Sapor* herbaceus, acriuſculus, diu inhærens, *Recens* acris; *Folia* recentia *maſticata* fauces linguamque rodunt, & diutius in ore retenta, fauces ſubinflammant.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. Ceratum pro Cereolis digeſtivis.

HELLEBORUS NIGER. L.

Helleborus niger. Ph. (*a*) Schwarze Nießwurzel. Ellebor černý, ſwatého ducha kořenj, černá čemeřice.

Helleborus. Cal. o. *Petala* 5 ſ. plura. *Nectaria* bilabiata, tubulata. *Caps.* polyſperma, erectiuſcula.

H. Niger. Scapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis.

Indigenus. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Sicc.* Radix nigro — fuſca, ſubcylindrica, ſubtoruloſa, ſubramoſa; undique obſeſſa fibris filiformibus, nigris; *parencymate* albido.

PRO-

a) In noſtris pharmacopoliis ſub hoc titulo habentur radices Adonidis vernalis.

PROPRIETAS. Tota Radix (una cum fibris) acris, nauſeoſa, leviter amaricans, inhærens. *Recens* acrior. maſticata linguam acrimonia obſtupefacit. *Siccata* mitior, in pharmacopoliis *diu aſſervata* vix acris, niſi diutius maſticata.

PRÆPARATA. Extractum.

COMPOSITA. *Rad.* Extractum Catholicum, hoc pro Pilulis Mercurialibus. — Panchimagogum.

Emplaſtrum Diabotanon.
Oleum Colocynthidis compoſitum vulgo Habacuccinum.
Extract. Pilulæ Anethinæ. — Balſamicæ Stahlii.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.
ORDO
GYMNOSPERMIA.

TEUCRIUM CHAMÆPITYS. L.
Chamæpitys. Ph. Feldcypreße, Wilder Hanf. Rwa, polnj cypris.

Teu-

Teucrium. Corollæ labium superius (nullum) ultra basim bipartitum, divaricatum ubi *stamina.*

T. Chamæpitys. Foliis trifidis linearibus, integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso.

Indigenum. Annuum.

Off. Herba.

Forma. *Caules* plures ex una radice, erecti; sæpe subprocumbentes, tetragoni, pilis albis hirsuti (in spontanea magis quam inculta) spithamei vel ultra, ramosi. *Rami* pauciores, oppositi, cauli conformes. *Folia* adgenicula opposita, sessilia, linearia, hirsuta (in culta subglabriuscula, exceptis summitatibus) pollicaria, in medio fissa, in 3 lacinias lineares, acutiusculas, foliis conformes; suprema congesta, erecta.

Proprietas. *Sicc. Odor* fragrans, debilior, cephalicus; *Sapor* amarus, aromaticus, in Rosmarinum incidens.

Compositia. *Herb. tot.* Pulvis Fumalis Arthriticus.

Flor. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Teucrium marum. L.

Marum verum. Ph. Schlagkräutlein. Kočičj kořenj.

T. Marum. Foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis: subtus tomentosis, floribus racemosis secundis.

Hor-

Hortense. Suffrutex.

Off. Folia.

Forma. *Folia* opposita, adgenicula, petiolata, ovata, acuta, integerrima, subcarnosa, supra viridia, vix pubescentia, subtus minutim tomentosa, vix semiunguicularia, persistentia.

Proprietas. *Sicc. Odor* fragrans, cephalicus, fortis balsamicus bituminosus. *Rec.* fortior; *Fricata* folia nares stimulant, & sternutationem movent. *Sapor* intensius amarus, bituminoso — aromaticus.

Compositia. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Teucrium scordium. L.

Scordium. Ph. Lachenknoblauch, Wasserlauch. Planý neb wodnj česnek.

T. Scordium. Foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto.

Hortense. Perenne.

Off. Herba.

Forma. *Rec. cultæ: Caulis* erectiusculus, tetragonus, spithamæus, pubescens, ramosus. *Rami* alternatim oppositi, elongati, longitudine caulis, simplex cauli conformes. *Folia* opposita, sessilia, pollicaria, lineari — oblonga, obtusa, utrinque glabra, supra viridia, lineata, subtus glauca, nervis subpubescentia, margine undique grossius serrata, patentia.

PROPRIETAS. *Sicc.* & *rec.* *Odor* alliato — cephalicus, gravis; *Sapor* amaricans, odori congruens, inhærens.

COMPOSITA. *Herb.* Electuarium Diaſcordii. Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.

Fol. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

THEUCRIUM CHAMÆDRYS. L.

Chamædrys. Ph. Gamanderle. Ožanka menſſj, kamanderle.

T. Chamædrys. Foliis cuneiformi — ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis.

Indigenum, rarius hortenſe. Perenne.

Off. Herba.

FORMA, *Caulis* erectus, tetragonus, ſpithamæus vel ultra, geniculatus, pubeſcens, ramoſus. *Rami* oppſiti, cauli conformes, ſubpurpuraſcentes, erecti. *Folia* ad genicula, oppoſita, breviter petiolata, ovali — oblongiuſcula, obtuſa, inferne abrupte angulata, utrinque pubeſcentia, margine inciſo — crenata, ſemipollicaria, patentia. *Foliola* tenera in axillis foliorum, utrinque gemina, cuneiformia, ſerrata.

PROPRIETAS. *Rec.* & *Sicc.* *Odor* leviter fragrans. *Sapor* amarus.

PRÆPARATA. Extractum.

COM-

COMPOSITA, *Fol.* Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Extractum Amaricans, hoc pro Tinctura amaricante.

Extr. Liquor Viſceralis.

SATUREJA HORTENSIS. L.

Satureja. Ph. Saturey. Satureye.

Satureja. *Corollæ* laciniæ ſubæquales. *Stamina* diſtantia.

S. Hortenſis. Pedunculis bifloris.

Hortenſis. Annua. *Phar. Svec.* Perennis. *Bergio:*

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caulis* dodrantalis, erectus, ſubtetragonus, minutim pubeſcens purpureo—virideſcens, ramoſus, diffuſus. *Rami* brachiatim oppoſiti, erecti. *Folia* oppoſita, ſubſeſſilia, vix pubeſcentia, lineari—lanceolata, acutiuſcula, vix pollicaria, patentia, utrinque adſperſa atomis excavatis, ſubtus inſtructa punctis ſubrotundis, majoribus ſparſis, ſupra vero marginalibus, longitudinaliter diſpoſitis.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* fragrans, validus, cephalicus; *Sapor* aromaticus, calidus, vix amaricans; *Siccata* planta odore & ſapore fere fortior.

PRÆPARATA. Oleum deſtillatum? (*a*)

COMPOSITA. *Ol.* Balſamum Saxonicum.

a) Cum ingrediatur compoſitionem Balſami Saxonici.

HYSSOPUS OFFICINALIS. L.

Hyſſopus. Ph. Hyſſop. Yſop.

Hyſſopus. Cor. labium inferius lacinula intermedia crenata. *Stam.* recta diſtantia.

H. Officinalis. Spicis ſecundis, foliis lanceolatis. Hortenſis. Suffrutex.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caulis* tetragonus: angulis obſoletis; ſcabriuſculus: pube minutuſſima; geniculatus, pedalis, erectus, ramoſus. *Rami* alternatim oppoſiti, erecti, elongati, lateribus, alternatim oppoſitis ſuperne canaliculati. *Folia* ad genicula alternatim oppoſita, ſubſeſſilia, ovali — lanceolata, obtuſa, utrinque punctata, ſubtus ſcabriuſcula, margine minutiſſime ciliata, patentia, pollicaria. *Axillæ* foliorum foliolis onuſtæ.

PROPRIETAS. *Sicc. & rec. Odor* fragrans, graviuſculus, non ingratus; *Sapor* calidiuſculus, aromaticus, amaricans, ſubcamphoratus; *herba* recens *maſticata* ſubſucculenta, tenerior, linguam fauceſque calefacit in modum fere Camphoræ, verum debilius.

PRÆPARATA. *Fol.* Aqua.

Herb. Syrupus.

COMPOSITA. *Herb.* Aqua Vulneraria cum aceto & vino.

Syrup. Electuarium Pectorale.

NE-

NEPETA CATARIA. L.

Nepeta. Ph. Katzenmünze. **Poleg, nátkowé kořenj, marulka polnj.**

Nepeta. Corollæ labium inferius lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

N. Cataria. Floribus ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato — ſerratis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis rec.* erectus, geniculatus, villoſus, cinereus, tetragonus; lateribus oppoſitis plano — canaliculatis, angulis obtuſis; ramoſus, pedalis vel ultra. *Rami* alternatim oppoſiti, erecti, caulii conformes. *Folia* ad genicula, oppoſita, petiolata, cordata, ſupra viridia, pubeſcentia, ſubtus villoſa, cinerea, bipollicaria, dentato — ſerrata, patentia. *Petioli* foliis breviores, teretes villoſi.

PROPRIETAS. *Recent. Odor* fragrans, in Meliſſam citrinam incidens. *Sapor* foliorum aromaticus, fortis, calidus, fere Meliſſæ citrinæ, ſed longe calidior.

COMPOSITA. Pulvis Sternutatorius viridis.
Species Cephalicæ.

LAVANDULA SPICA. L.

Lavandula. Spica. Ph. Lawendel. **Lawendule.**

Lavandula. Cal. ovatus, ſubdentatus, bractea ſuffultus. *Corolla* reſupina. *Stamina* intra tubum.

L. Spica. Foliis lanceolatis integerrimis, ſpicis nullis.

Hortenſis. Suffrutex.

Off. Folia. Flores.

FORMA. *Rec. Spica* florum terminalis, cylindrica, erecta, pedunculata, conſtructa e verticillis 10 — floris vel ultra, nudis, pubeſcentibus; quorum inferiores remoti; ſuperiores proximiores; floribus ſubſeſſilibus. *Bracteæ* oppoſitæ ſeſſiles, cordatæ, nervoſo — ſtriatæ, longius acutæ, cineraſcentes, calycibus breviores. CAL. *Per.*. tubulatum, cylindricum, undique ſtriatum, cinereo tomentoſum, ſuperne cæruleum, truncatum; 4 — crenatum; lacinia unica, ſuperiore, ſubrotunda, plana, concaviuſcula, erecta. COR. violacea, infundibuliformis, pubeſcens. *Tubus* ſtriatus, calyce paullo longior, intus piloſus, extus minutim pubeſcens. *Limb.* 5 — fidus, inæqualis. *Lab. ſuper.* majus, obcordatum ſ. bifidum: lacciniis obovatis, ſubcrenulatis; *infer.* 3 — fidum: laciniis ovatis, obtuſis, patentibus, æqualibus. STAM. *Fil.* 4, intra tubum ſuperne inſerta; quorum 2 paullo longiora. *Anth.* parviuſculæ, peltatæ, ſubconiventes, ſubrotundæ, planæ, violaceæ, centro luteo, margine obſoletæ quadrilobæ, piloſo — ciliatæ, os tubi obturantes. PIST. *Germ.*

4 — fidum

4 — fidum; labiis subrotundis, basi cinctum perihætio. *Styl.* cylindricus, longitudine staminum, vix pubescens. *Stigm.* 2, ovato — oblonga, obtusa.

PROPRIETAS. *Rec.* & *sicc.* *Odor* fragrans, fortis cephalicus, svaveolens. *Sapor* aromaticus, amaricans, calidiusculus, odori congruens. *Flores* recentes *masticati* leniter in ore calefaciunt.

PRÆPARATA. Acetum.
Aqua.
Oleum destillatum.
Oleum Spicæ. (*a*)
Spiritus.

COMPOSITA. *Flor.* Acetum Antisepticum.
Aqua seu Balsamum Embryonis. — Vulneraria cum Vino.
Electuarium seu Theriaca Andromachi.
Pilulæ Cochiæ.
Pulvis Fumalis Ordinarius. — Sternutatorius variegatus & viridis. — Specierum pro Cucupha.
Species Cephalicæ.
Ol. dest. Balsamum Apoplecticum. — Saxonicum.
Essentia sive Balsamum vitæ Hoffmanni.

Un-

a) Hoc ut-plurimum tantum est oleum Terebinthinæ exigua genuini Lavendulæ olei quantitate odorum, juxta Geoffroy. In Actis Parisinis; inde pretio tam exiguo.

Unguentum Rosatum album.

Ol. Spic. Oleum Colocynthidis compositum.

Ungnentum ad Phthiriasim seu contra pediculos.

MENTHA CRISPA. L.

Mentha Crispa. Ph. (*a*) Krausmünze. Kadeřawá máta, balssam zahradnj.

Mentha. Cor. subæqualis, 4 — fida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta distantia.

M. Chrispa. Spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam æquantibus.

Hortensis. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caules* plures ex una radice, pedales vel ultra, erecti, 4 — goni, geniculati, pubescenti — scabridi, ramosi. *Rami* oppositi. *Folia* ad genicula, opposita, breviter petiolata, ovato subrotunda, acutiuscula, pollicaria, subtus pubescentia, supra glabriuscula, rugosa, margine inciso — serrata, serraturis minutim ciliatis, erectis crispa. *Capitulum* terminale oblongum s. ovatum, obtusum, conflatum e verticillis subsessilibus, subapproximatis; inferiore magis remoto, pedunculato; floribus brevius pedunculatis.

PROPRIETAS. *Rec. & sicc. Odor* fragrans, fortis, spirituosus; *Sapor* calidus, aromaticus;

a) Persæpe adhibetur ejus loco hirsuta.

masticata in lingua & faucibus calefacit, fere ut ſpiritus vini. Exſicatione intenditur odor & ſapor.

PRÆPARATA, Aqua.
Conſerva.
Oleum.
Spiritus.
Syrupus.

COMPOSITA. *Herb.* Aqua ſive Balſamum Embryonis. — Carminativa Communis. — & Regia. — Hyſterica Fœtida.
Elixirium Vitrioli.
Unguentum Carminativum. — Nervinum.
Sumit. Acetum Antiſepticum.
Ol. Balſamum Saxonicum.
Emplaſtrum de Labdano.

MENTHA AQUATICA. L.

Mentha rubra. Ph. Rothe Münze. Czerwená máta.

M. Aquatica. Flor. capitatis, fol. ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caules* pedales, cubitales, erecti, ramoſi. *Folia* lata, ex ovatis acuminata, ſerrata, ſubtus nervoſa, lanuginoſa, obſcura; ſuperne alias glabra, alias pariter lanuginoſa. Verticilli

in

in ſummo ramo pauci, unus alterve denſus, & capitulum denique globoſum ramum terminat.

PROPRIETAS. *Odor* paludoſus; *ſapor* acris, aromaticus, amarus.

COMPOSITA. Pulvis Sternutatorius viridis.

* MENTHA PIPERITIS. L.

Mentha Piperitis. Ph. Pfeffermünze. Peprowá máta.

M. Piperitis. Spicis capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus.

Hortenſis. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caulis* ſpithamæus, pedalis vel ultra, tetragonus: lateralibus 2 oppoſitis canaliculatis; hirſutus, gemiculatus: geniculis barbatis; ſuperne ramoſus: ramis inferioribus brevioribus. *Folia* oppoſita, brevius petiolata, ovato-oblonga, acutiuſcula, acute ſerrata, cilliata, bipollicaria, utrinque pubeſcentia, ſupra vero minus, molliuſcula, ſubtus punctulis excavatis punctata, internodii longitudine, patentia; ramea rotundiora.

PROPRIETAS. *Sicc. & rec. Odor* fragrans, ſpirituoſus, ſubcamphoratus; *Sapor* aromaticus, fervidus, camphoræ; *maſticata* linguam & fauces valde calefacit, ſubſequente ſenſu frigidiuſculo. Recentis odor fere debilior, quam ſiccatæ; ſapor ſiccatæ fortior.

PRÆPARATA. Aqua.
Oleum deſtillatum.

COM-

Composita. *Aq.* & *Ol.* Rotulæ Menthæ Piperitis.

Mentha pulegium. L.

Pulegium. Ph. Poley, Poleg.

M. Pulegium. Floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus.

Hortense. Perenne.

Off. Herba.

Forma. *Rec. Caulis* spithamæus, procumbens tetragonus, geniculatus. pubescens, ramosus. *Rami* alternatim oppositi, erecti, cauli conformes, simpliciusculi. *Folia* ad genicula, opposita, brevius petiolata, ovalia, obtusa, serrata, glabra, supra lineata, subtus punctata, nervis minutim pubescentia, unguicularia, patentia.

Proprietas. *Rec.* & *Sicc. Odor* fragrans, spirituosus, graviusculus. *Sapor* aromaticus, calidus; *masticata* linguam faucesque calefacit, subcamphorata.

Præparata. Aqua.
Oleum. (*a*)

Composita. Aqua Carminativa, Regia & Communis.

Ol. Balsamum Saxonicum.

Glecoma hederacea. L.

Hedera Terrestris. Ph. Gundermann, Gundelreben. Poponec. *Gle-*

a) Ob compositionem Balsami Saxonici.

Glecoma. Antherarum singulum par in formam crucis conivens. *Cal.* 5 — fidus.

G. Hederacea. Foliis reniformibus crenatis.

Indigeno — Perennis.

Off. Herba.

Forma. *Rec. Caulis* tetragonus, repens, spithamæus, pubescens scabriusculus, ramosus. *Rami* oppositi, erecti, cauli conformes. *Folia* alternatim opposita, petiolata, reniformia, crenata, ciliata, rugosa, supra scabriuscula, subtus minutim punctata, nervis pubescentia, unguicularia, erecto — patentia. *Petioli* teretiusculi, scabri, supra sulco longitudinali. *Stipulæ* nullæ, sed margo utrinque inter petiolos, obtusus, ciliatus.

Proprietas. *Rec. Odor* debilius fragrans, graviusculus, non ingratus. *Sapor* leniter aromaticus, odori congruens, leniter amaricans.

Præparata. Conserva.

Composita. *Herb.* Species Decocti Pectoralis. — pro Thee Germanico.

Conserv. Electuarium Pectorale.

* Lamium album. L.

Lamium. Urtica Mortua. Ph. **Taube Neßel. Hluchá, mrtwá, smradlawá kopřiwa.**

Lamium. Corollæ labium sup. integrum, fornicatum; lab. inf. 2 — lobum; faux utrinque margine dentata.

L. Album. Foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis viginti floris. In-

Indigenum. Annuum.

Off. Flores.

FORMA. *Verticilli* florum ad genicula circiter 10 — flori. *Macula* purpurascens, obverse lunulata, utrinque ad geniculum, variegata, verticillum distinguens. *Flores* sessiles. CAL. *Perianth.* tubulatum, 10 — angulatum, pubescens, basi extus violaceum, ore ampliato, 5 fido: laciniis lineari — subulatis, carinatis, patentibus, margine minutim ciliatis, carina hirsutis. COR. ringens, alba. *Tubus* calyce longior, incurvus, pubescens, superne gibbus. Limbus ringens. *Lab. super* villosum, ciliatum, fornicatum, obovatum concavum, retusum, nutans; *infer.* ovatum, glabrum, bilobum, utrinque deflexum, basi notatum lineis 3 longitudinalibus, lutescentibus, basi decussatis *Faux* amplior, compressa, margine utrinque rotundato, instructo dente subulato, recto, solitario. STAM. *Filam.* 4, subulata, alba, pubescentia, sub labio superiori recondita, paralella, quorum 2 paullo breviora. *Anthæ.* oblongæ, fuscæ, dorso albo hirsutæ, erectæ. PIST. *Germ.* 4, trigona, truncata, coniventia. *Styl.* subulatus, albus, glaber, longitudine staminum, illisque parallelus. *Stigma* bifidum laciniis subulatis, acutis,

PROPRIETAS. *Rec. Odor* fortior, mucidus. *Sapor* herbaceus; *masticata* folia teneriuscula, saliva viridi.

BE-

BETONICA OFFICINALIS. L.

Betonica. Ph. Bethonie. Bukwice.

Betonica. *Cal.* ariſtatus. *Corollæ* lab. ſup. adſcendens, planiuſculum; tubus cylindricus.

B. *Officinalis.* Spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Rec.* *Caulis* erectus, pedalis vel ultra, tetragonus: angulis obtuſis, lateribus plano canaliculatis, obſolete ſtriatis, geniculatis; hirto—ſcaber, ſimplex, ſuperne ſæpe ramoſus: ramis oppoſitis, erectis, intermedio brevioribus. *Folia* ad genicula, oppoſita, petiolata, cordato—oblonga, obtuſa, undique minutim punctata: punctis excavatis; utrinque pubeſcentia, venoſo — rugoſa, margine dentato — ſerrata: ſerraturis obtuſo — rotundatis, ciliatis; ſumma ſubſeſſilia, reflexa; *Petioli* pubeſcentes, ſubtus rotundo carinati ſupra concavi. *Spica* terminalis, ſubfolioſa, conſtructa e verticillis ſeſſilibus, oppoſitis, approximatis; quorum inferiores remotiores. Folia 2 oppoſita reflexa, caulinis ſimilia ad baſim ſpicæ.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor herbæ* ſubamaricans, ſubnarcoticus, in odorem cimicis incidens; *Sapor foliorum* ingratus, fatuus, ſed ſimul calidiuſculus, vix amaricans. *Siccatæ* herbæ *odor* gravis, debilior; *Sapor* amaricans, ingratus;

MARRUBIUM VULGARE. L.

Marrubium album. Ph. Weißer Andorn. Gablečnjk bjlý.

Marrubium. Cal. hypocrateriformis, rigidus, 10-ſtriatus. *Corollæ* lab. ſup. bifidum, lineare, rectum.

M. Vulgare. Dentibus calycinis ſetaceis uncinatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, pedalis vel ultra, tetragonus, villoſus, ſæpe albido — tomentoſus, ramoſus. *Rami* oppoſiti, erecti, cauli conformes. *Folia* ad genicula oppſita, petiolata, ovalia, ſæpe ovata, ſ. ſubrotunda, pollicaria patentia, rugoſa, pubeſcentia ſ. villoſa, groſſius crenata, obtuſa.

PROPRIETAS. *Sicc. & rec. Odor* fragrans, vinoſus, gratus. *Sapor* amarus, inhærens.

COMPOSITA. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

ORIGANUM DICTAMNUS. L.

Dictamnus Creticus. Ph. Cretiſcher Diptam. Kretſký Dyptam.

Origanum. Strobilus tetragonus, ſpicatus, calyces colligens.

O. Dictamnus. Foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus.

Exotico — Suffrutex.

Off. Folia.

FOR-

Forma. *Folia* petiolata, ſuborbiculata, obtuſa, nervis depreſſis lineata, punctis nigricantibus ſ. excavatis utrinque adſperſa, tomentoſa ſ. lanata, albida, unguicularia.

Proprietas. *Sicc. Odor* fragrans, cephalicus, gratus; *Sapor* amaricans, aromaticus, calidus, odori congruens.

Composita. Electuarium Diaſcordii.

Origanum vulgare. L.

Origanum. Ph. Wohlgemüth. Dobrá myſl.

O. Vulgare. Spicis ſubrotundis panniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba.

Forma. *Caulis* pedalis, erectus, tetragonus, purpuraſcens, pubeſcens, ramoſus. *Rami* oppoſiti, erecti, caule teneriores, in ceteris conformes; ſuperiores longiores. *Folia* ad genicula oppoſita, petiolata, ovata, nervoſa, ſemipollicaria, ſupra glabra, ſubtus minutim pubeſcentia, utrinque punctata, margine minutim ciliata, patentia.

Proprietas. *Sicc. & rec. Odor* fragrans, graviuſculus, non ingratus, fere Serpylli. *Sapor* aromaticus, in Mentham incidens, ſed debilior.

Præparata. Oleum deſtillatum.

Composita. *Herb.* Aqua Carminativa communis & Regia. — Vulneraria cum Vino.

Spe-

Species Cephalicæ.
Ol. Balſamum Saxonicum.

ORIGANUM MAJORANA. L.

Majorana. Ph. Majoran, Margran. **Maryánka.**

O. Majorana. Foliis ovalibus otuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus.

Hortenſis. Annua, etiam fruticoſa.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, ſpithamæus vel ultra, obſolete tetragonus, geniculatus, pubeſcenti — villoſus, inferne ramoſus. *Rami* alternatim oppoſiti, ſimplices, erecti, cauli conformes. *Folia* ad genicula caulis & ramorum, oppoſita, ſubſucculenta, petiolata, ovalia, obtuſa, vix pollicaria, minutim villoſa, obſolete punctata, lineata, margine obſolete repanda. *Axillæ* florum onuſtæ foliolis quaternis. *Floralia* folia ad ramos paniculæ atque ad capitula, oppoſita, ſeſſilia, ovalia, concava, pedunculo breviora.

PROPRIETAS. *Rec. & Sicc. Odor* fragrans, fortis cephalicus, obſcure graviuſculus, gratus. *Sapor* aromaticus, ſubamaricans, calidiuſculus; *maſticata* folia recentia ſubſucculenta, molliuſcula.

PRÆPARATA. Aqua.
Oleum. (*a*)

COMPOSITA. *Herb.* Emplaſtrum de Meliloto.

O Pul-

a) Ob componenda Balſama!

Pulvis Specierum pro Cucupha.
Species Cephalicæ.
Unguentum Majoranæ. — Nervinum.
Fol. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.
Pulvis Sternutatorius Variegatus, & Viridis.
Ol. Balſamum Apoplecticum. — Saxonicum.
Eſſentia ſive Balſamum Vitæ Hoffmanni.

THYMUS SERPYLLUM. L.

Serpyllum. Ph. Quendel, Küttelkraut. Materj dausſka.

Thymus. Calycis. bilabiati faux villis clauſa.

T. Serpyllum. Floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis.

Indigenum. Suffrutex.

Off. Herba etiam recens.

FORMA. *Rec. Caulis* filiformis, teres, minutim pubeſcens, fuſco — cinereus, inferne repens, ſuperne procumbens, ramoſus. *Rami* oppoſiti, adſcendentes, tretragoni, albido — villoſi; inferiores longiores, ramoſi, ſuperiores ſenſim breviores, ſimplices. *Folia* caulina vix ulla; ramea oppoſita, breviter petiolata, obovata, obtuſa, utrinque punctata, lineas duas longa, inferne albo — cilliata, patentia.

PRO-

PROPRIETAS. *Rec. & ſiccat. Odor* fragrans, cephalicus, gratus. *Sapor* aromaticus, calidiuſculus, ſubcamphoratus, ſubamaricans.

PRÆPARATA. Aqua.
Spiritus.

COMPOSITA. Aqua Vulneraria, cum Aceto.
Pulvis Sternutatorius viridis.
Species Cephalicæ.
Herb. rec. Unguentum Nervinum.

THYMUS VULGARIS. L.

Thymus. Ph. Thymian, Römischer Quendel. Welsches Küttel-Kraut. Wlaſká neb Kjmſká materj dauſſka.

T. Vulgaris. Erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillo ſpicatis.

Hortenſis. Suffruticoſo — Annuus.

Off. Planta florida.

FORMA. Fructiculus parvus, ramoſiſſimus, ſpithamæus vel ultra, erectus. *Rami* oppoſiti, obſolete tetragoni, pubeſcentes; *tenelli* villoſi. *Folia* oppoſita, petiolata, ovali — oblonga, obtuſa, undique punctata, circiter 2 lineas longa, patentia, glabriuſcula ſ. albida villoſa. *Flores* ſubcapitati. *Capitula* terminalia, obtuſa, folioſa, conſtantia e floribus pedicellatis. *Calyces* hirſuti, 5—fidi.

PROPRIETAS. *Rec. & ſicc. Odor* fragrans, fortis, cephalicus, gratus; recentis ſvavior. *Sapor* aromaticus, calidus.

COMPOSITA. Pulvis Specierum pro Cucupha.

Species Cephalicæ.

MELISSA OFFICINALIS. L.

Meliſſa. Ph. Meliſſe. Melisſa, medunka.

Meliſſa. *Calix* aridus, ſupra planiuſculus; labio ſuperiore ſubfaſtigiato. *Corollæ* lab. ſuper. ſubfornicatum, 2 — fidum; lab. inf. lobo medio cordato.

M. Officinalis. Racemis axillaribus verticillatis; pedicellis ſimplicibus.

Hortenſis. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, tetragonus, geniculatus, dodrantalis vel ultra, minutim pubeſcens, inferne ramoſus, diffuſus. *Rami* alternatim oppoſiti, cauli conformes, ramoſi, erecti. *Folia* alternatim oppoſita, petiolata, cordata, obtuſa, groſſius & obtuſe ſerrata, rugoſa, pollicaria, ſupra viridia, minutim pubeſcentia, punctis parvis elevatis ſcabriuſcula, ſubtus glauca, punctis excavatis adſperſa, patentia, ſuperiora obovata, acutiuſcula, pubeſcentia, ſuperne ſerrata, patenti — revoluta.

PROPRIETAS. *Rec.* & *ſicc.* *Odor* fragrans, fere flavedinis corticis citri. *Sapor* herbaceus, calidiuſculus, citratus. Herba ante floreſcentiam lecta gratior.

PRÆ-

PRÆPARATA. Aqua Meliſſæ Simplex, & Compoſita, ſive Spiritus Carmelitarum.

Conſerva.

COMPOSITA. Aqua ſive Balſamum Embryonis. — Hiſterica fœtida.

Eſſentia Ambræ liquida.

Species pro Thee Germanico.

MELISSA CALAMINTHA. L.

Clamintha Montana. Ph. Bergmünze. Planá máta, poleg, nátkowé kořenj, marulka horný.

M. Calamintha. Pedunc. axillaribus dichotomis longitudine foliorum.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus. *Folia* grandiora, petiolata, ex ovatis — acuminata, manifeſte & acute ſerrata. Flores in pedunculis ramoſis ex alis foliorum in majori parte plantæ, quam folia, brevioribus: in pleriſque tamen ramis longioribus, ut in laxam paniculam abeant. Stipulæ ſimiles.

PROPRIETAS. *Odor* & *Sapor* grate aromaticus, menthæ adfinis.

COMPOSITA. *Herb.* Aqua Vulneraria cum Aceto, & Vino.

Species Cephalicæ reſolventes.

Fol. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi

OCYMUM BASILICUM. L. (a)
Baſilicum. Ph. Baßilie. Bazylika.

Ocymum. *Calix* labio ſuperiore orbiculato; inferiore quadrifido. *Corollae* reſupinatae alterum labium 4—fidum, alterum indiviſum. *Filamenta* exteriora baſi proceſſum emittentia.

O. Baſilicum. Foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis.

Hortenſe. Annuum.

Off. Herba.

FORMA. *Rec.* *Caulis* ſpithamaeus, erectus minutim pubeſcens, teres, ramoſus, diffuſus. *Rami* alternatim oppoſiti, ramoſi, erecti, cauli conformes. *Folia* ſubſucculenta, oppoſita, petiolata, ovata, acuta, glabra, ſubtus notata punctis excavatis, pollicaria vel ultra, integerrima, patentia. *Petioli* ſubtus convexi, ſupra canaliculati, foliis breviores.

PROPRIETAS. *Sicc.* & *rec.* *Odor* fragrans, gratus; recentis ſvavior. *Sapor* aromaticus, gratus, ſubaniſatus. *Maſticata* folia recentia ſubſucculenta, molliuſcula.

COMPOSITA. Pulvis Specierum pro Cucupha. — Sternutatorius Viridis.

PRUNELLA VULGARIS. L.
Prunella. Ph. Braunelle. Czernohláwek, ſwaknjk menſſj.

Pru-

a) Hujus loco in officinis noſtris potiſſimum occurrit Ocymum gratiſſimum.

Prunella. *Filamenta* bifurca: altero apice antherifera. *Stygma* bifidum.

P. Vulgaris. Foliis omnibus ovato--oblongis ſerratis petiolatis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba florida.

Forma. *Rec. Caulis* palmaris, aſcendens, tetragonus: angulis oppoſitis planis, oppoſitis aliis canaliculatis; ſimpliciuſculus, baſi infima parce ramoſus: ramis oppoſitis cauli ſimilibus; inferne glaber, ſuperne ungulis pubeſcenti — ſcabridus. *Folia* alternatim oppoſita, petiolata, ovato — oblonga, acutiuſcula, ſerrata, utrinque ſcabriuſcula, lineata patentia, pollicaria; ſumma lanceolata, ſubſeſſilia. *Petioli* ſupra canaliculati foliis breviores. Spicæ terminales, ſeſſiles, ovato — cylindricæ, pollicares, truncatæ, e floribus verticillatis, breviter pedicellatis, & bracteis conſtantes. *Verticilli* 6 — flori. *Pedicelli* compreſſo — tetragoni. *Bracteæ* oppoſitæ, cordatæ, latæ, planæ, membranaceæ, ſeſſiles æquales, albidæ, ſtriis virideſcentibus parallelis pictæ, extus pubeſcentes, intus glabræ, ciliatæ, apice acutæ, ſingulos verticillos foventes. Cal. *Perianth.* tubulatum, bracteis longius, biangulatum, ſupra glabrum, trinerveum, ſubtus ſtriatum, pubeſcens, angulis ciliatum, bilabiatum: labio *ſuper.* depreſſo -- plano, truncato, crenato, minutim tri-

den-

dentato, margine utrinque reflexo, compresso; *infer.* lanceolato, angustiori bifido: laciniis acuminatis. COR. cœrulea. *Tubus* calyce longior, inferne albus, superne sensim ampliatus, cœrulescens, striatus, *Limbus* cœruleus, ringens, bilabiatus. *Lab. super.* fornicatum, obtusum, erectum, *inferius* patens, trifidum: laciniis ovatis obtuso — rotundatis; exterioribus reflexis; inter media patente, denticulata. STAM. sub labio superiori recondita. *Filam.* 4, subulata, violacea; quorum 2 superiora breviora; 2 inferiora longiora, omnia terminata dente subulato, divaricato. *Anth.* bilobæ: lobis divergentibus, subovatis; pedicellatæ: pedicello laterali e filamento, sub dente. PIST. *Germ.* 4 — partitum, glabrum, obtusum, basi cinctum perihætio. *Styllus* subulatus, violaceus, staminibus paullo brevior. *Stigma* bifidum, acutum.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* nullus. *Sapor* herbaceus, amaricans; *masticata* folia subglutinosa

COMPOSITA. Species Decocti pro Gargarismate adstirngente.

ORDO

ANGIOSPERMIA.

ANTIRRHINUM LINNARIA. L.

Linnaria. Ph. **Leinkraut. Len Matky božj.**

Antirrhinum. Cal. 5—phyllus. *Corollæ* basis deorsum prominens, nectarifera. *Caps.* bilocularis.

A. Linnaria. Foliis lanceolato — linnearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis.

Indigeno — Biennis.

Off. Herba.

Forma. *Rec. Caulis.* pedalis, erectus, teres, glaber, foliosus, obsolete striatus, superne ramosus. *Rami* sparsi, paniculati, erecti. *Folia* frequentia, sparsa, linearia, acuta, sessilia, pollicaria, glabra, superne integerrima, patentia.

Proprietas. *Rec. Odor* fœtidus fere Scrophulariæ; *Sapor* herbaceus, amaricans. *Sicc.* odor fatuus, sapor amaricans, fatuus.

Præparata. Unguentum Linnariæ.

Scrophularia nodosa. L.

Scrophularia. Ph. **Braunwurzel. Swinský neb krtičnjkowý kořen, rozchodnjk, aneb prutrznjk.**

Scrophularia. Cal. 5 — fidus. *Cor.* subglobosa, resupinata. *Caps.* 2 — locularis.

S. Nodosa. Foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo.

Indigena. Perennis.

Off. Radix. (Herba raro.)

For-

FORMA. *Rec. Radix* albida, compoſita e tuberibus pluribus aggregatis, inæqualibus, ſeſſilibus, obliquis, conicis, ſæpe ovatis, obſolete angulatis, undique notatis tuberculis vel nodulis ſparſis magnitudine nucis avellanæ, ſæpe ovi columbini, parce fibrilloſis: fibris filiformibus, palmaribus, albis deſcendentibus. *Parencyma* albidum, tranſverſaliter ſectum æquale: centro medullari maximo; corticali parte tenui, concolore. *Caules* plures ex una radice, bipedales, erecti, ſimplices vel ramoſi, fuſci, variegati atomis pallidioribus, glabri, lucidiuſculi, tetragoni: angulis parviuſculis, acutis. *Folia* oppoſita, petiolata, internodiis paullo longiora, ovata, ſæpe baſi truncata. acutiuſcula glabra, tripollicaria vel ultra, nervoſa, lineata, venuloſa, rugoſa, margine ſerrato — dentata, ſæpe inferne inciſa, patentia. *Petioli* ſubtus convexi, compreſſiuſculi, ſupra canaliculati, foliis breviores.

PROPRIETAS. *Recent. radic. Odor* fœtidus, in Raphanum & Pœoniam incidens; *Sapor* conſimilis, amarus, acriuſculus; *maſticata* radix firma, fragilis, inſtar Raphani comminuitur. *Folia. Odor* fœtidus; *Sapor* amarus, acriuſculus, graviuſculus. *Siccatæ* radicis odor debilis, ſapor longe mitior quam in recente.

* ACANTUS MOLLIS. L.

Branca Urſi vera. Ph. Bärentatze, Bärnklaue. Akant, nedwědj paznocht. *Alan-*

Acantus. *Cal.* bifol. bifidus. *Cor.* 1 — labiata, deflexa, 3 — fida. *Caps.* 2 locularis.

A. Mollis. Foliis ſinuatis inermibus.

Indigeno — Perennis.

Off. Folia. (*a*)

Forma. *Rec.* *Folia* petiolata, ſpithamæa, oblonga, utrinque glabra, lucidiuſcula, ſuperne lobata, inferne pinnatifida: lobis oppoſitis, ovatis, obtuſis ſ. acutiuſculis, obtuſe dentatis, margine minutim ciliatis. *Petioli* teretes, ſupra canaliculato — plani.

Proprietas. *Rec.* *Odor* debilis. *Sapor* glutinoſus, herbaceus; *maſticata* lubrica ſentiuntur.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

ORDO

SILICULOSA.

THLASPI ARVENSE. L.

a) Loco hujus habebantur ſemper in pharmacopoliis folia Heraclii Sphondilii, de quo jam olim conquæſtus ſibi Mathiolus, hodie autem Pharmacopei Pragenses omnes plantis Acanti mollis per Hortum Botanicum divites ſunt.

Thlaspi. Ph. Bauernsenf. Penjzek, aneb sedl. ská horčice.

Thlaspi. Silicula emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato — carinatis.

T. Arvense. Siliculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis glabris.

Indigenum. Annuum.

Off. Semen.

Forma. *Siliculæ* orbiculatæ, undique marginatæ, utrinque compresso — planæ apice rotundatæ, bifidæ, albidæ, venulosæ, biloculares, dissepimento transversali. *Semina* 6 vel 8 in singulo loculamento, pedicellata, subimbricata, ovalia, obtusa, compressiuscula, rubicundo — brunea, lucidiuscula, undique striata: striis ovalibus concentricis.

Proprietas. *Odor* & *Sapor* alliacei.

Composita. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Cochlearia officinalis. L.

Cochlearia. Ph. Leffelkraut. Ljžjčnjk.

Cochlearia. Silicula emarginata, turgida, scabra: valvulis gibbis, obtusis.

C. Officinalis. Foliis radicalibus cordato — subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis.

Hortensis. Annua.

Off. Herba. (Semen raro.)

For-

Forma. *Rec.* *Caules* plures ex una radice, simplices, spithamæi, erecti, 5—angulares, glabri. *Folia* alterna, glabra, succulenta; *radicalia* longius petiolata, cordata, obtusa, rotundata, subintegra vel angulata, unguicularia; *caulina* ovato—oblonga, obtusa, dentata, quorum inferiora spatulata, superiora sessilia, amplexicaulia.

Proprietas. *Rec.* *Odor* subnasturcinus, debilior; *sapor* amarus, in Nasturtium incidens, acris, masticata acris sentitur in ore & faucibus, effectu subfugaci, saliva viridescente. *Siccata* folia amara, ingrata, vix acriuscula.

Præparata. Aqua.
Conserva.
Spiritus.
Syrupus.

Composita. *Herb.* Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.
Aq. Tinctura Laccæ.
Cons. Electuarium Antifebrile.

✠ Cochlearia armoracea. L.

Armoracia. Raphanus rusticanus. Ph. Kreen Meerrettig. Kren.

C. Armoracea. Foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis.

Colitur. Perennis.

Off. Radix recens.

For-

FORMA. *Rec.* *Radix* filiformi — cilindrica, pedalis, craſſitie pollicis vel ultra, ſæpe inſtructa nodulis lateralibus ſubrotundis, ſparſis, remotis, fibras emittentibus, undique alba, extus læviuſcula, rugis tranſverſalibus, ſubannularibus, remotis, apice punctis depreſſis notata. *Parencyma* album, carnoſum, firmum; poſt ſectionem tranſverſalem notatum annulo marginali tenui, concentrico; centro medullari conflato e punctis ſparſis, ſubdiaphanis.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* fragrans, pungens, penetrans, oculos feriens. *Sapor* fervidus, acris dulceſcens, ſæpe ſubamaricans. *Maſticata* fauces & linguam pungit, & calefacit, tuſſim irritat nares ferit, oculos lachrymantes facit, effectu fugaci. *Cocta* radix mitis, dulceſcens, ſubodorata; *ſiccata* debilis odore & ſapore.

ORDO.

SILIQUOSA.

✠ SISYMBRIUM NASTURTIUM. L. (*a*) Naſturtium Aquaticum. Ph. Brunnenkreße. Řeřicha wodnj neb potočnj.

Si-

a) Juxta Bergium Cardamine Pratenſis, quod etiam nobis non raro ſubſtituitur.

Sisymbrium. *Siliqua* dehiſcens valvulis rectiuſculis. *Calyx* patens. *Corolla* patens.

S. Naſturtium. Siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis.

Indigenum. Annuum.

Off. Herba recens.

Forma. *Caulis rec.* erectus, ſimplex, ſpithamæus, teres, glaber. *Folia* alterna, ſubcarnoſa, glabra, petiolata cum impari; inferiora circiter 6—juga: foliolis ſubrotundis, angulatis, extimo paullo majori, cuneiformi, ſæpe lobato; ſuperiora, circiter 4—juga: foliolis linearibus, concavis acutiuſculis, ſubcarinatis; petiolo communi lineari—concavo. *Racemus* terminalis, oblongus, pedunculatus, nudus, glaber.

Proprietas. *Rec. Odor* debilior; *Sapor* ſubamaricans, leviter acriuſculus. Caules fortiores, acriores quam folia.

Præparata. Conſerva.

* Erysimum alliaria. L.

Alliaria. Ph. Knoblauchkraute. Cžeſnekowá bylina.

Eryſimum. *Siliqua* columnaris, exacte tetraedra. *Calix* clauſus.

E. Alliaria. Foliis cordatis.

Indigena. Biennis.

Off. Herba.

Forma, *Caulis rec.* ſimplex, erectus, bipedalis

dalis, teres, obſolete ſtriatus, inferne lanuginoſus, ſuperne glaber: *Rami* pauci, alterni, in ſpecimine vegetiore. *Folia* alterna, petiolata, cordata, venoſa, ſubrugoſa, glabra, venis ſubpubeſcentia; inferiora longius petiolata, obtuſa repanda; ſuperiora acuta, inæqualiter dentato ſerrata.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* (foliorum contuſorum) Cepæ oleraceæ; *Sapor* cepaceus, leniter amaricans, ſubnaſturtinus. Quo magis vegete creſcunt plantæ, eo fortior odor cepaceus. *Siccata* fere effœta.

CHEIRANTHUS CHEIRI. L.

Cheiri. Ph. Gelbe Violen. Žlutá Fiola.

Cheiranthus. Germen utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clauſus: foliis duobus baſi gibbis. *Semina* plana.

C. Cheiri. Foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo.

Hortenſe. Bienne, ſæpe Subperenne.

Off. Flores.

FORMA. *Rec. Pedunculi* minutim pubeſcentes, obſolete tetragoni, uniflori. CAL. *Perianth.* tetraphyllum, pallide varideſcens: foliolis lineari — lanceolatis, obtuſis; erectis, 2 oppoſitis paullo altioribus, carinatis, apice compreſſis. COR. cruciformis; petalis 4. obovatis, obtuſis. STAM. *Fil.* 6. ſubulata, longitudine calycis; quorum 2 exteriora oppoſita breviora. *Anth.* lineares, acutæ,

tæ, basi bifidæ, incumbenti erectæ. *Nectarifera* glandula utrinque ad stamina breviora. PIST. *Germen* cylindricum, obsolete tetragonum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum, bifidum, patens, crassiusculum.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* svaveolens; *Sapor* amaricans, in Nasturtium incidens, acriusculcus. *Sicc.* *Odor* nullus; *Sapor* amaricans.

COMPOSITA. Pulvis Specierum pro Cucupha.

BRASSICA NAPUS. L.

Napus. Ph. Stekrüben, Scherübel. Kolnjk.

Brassica. *Cal.* erectus, conivens. *Sem.* globosa. *Glandulæ* inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem.

B. *Napus.* Radice caulenscente fusiformi.

Colitur. Biennis.

Off. Semina.

FORMA. *Semen* parvum, rotundum subrufum semini Brasicæ simile.

PROPRIETAS. *Odor* subfragrans; *Sapor* acris aromaticus.

COMPOSITA. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

BRASSICA RAPA. L.

Rapa alba. Ph. Weiße Ruben. Bjlá řjpa.

B. *Rapa.* Radice caulescente, orbiculari depressa carnosa.

Colitur. Biennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix rec.* orbiculata, latitudine palmæ vel ultra, utrinque depreſſa, læviuſcula, ſubtus albicans, apice rugoſa, incarnata vel purpuraſcens, pro ingenio ſoli, ſuperne videſcens, baſi radicans: trunculo cylindrico producto, deſcendente fibrilloſo: fibrilliſque capillaribus, diſpoſitis in ſerie longitudinali oppoſita, per radicem aſcendente. *Parencyma* carnoſum, firmum, album, poſt ſectionem tranſverſalem ſubæquale, notatum ſtriis ſubſpongioſis, radiantibus, obſoletis; punctis ſubrotundis verſus peripheriam per series diſpoſitis; corticali parte tenuiore.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* ſubfragrans; *Sapor* congruens, dulceſcenti ſubamaricans; *maſticata* molliuſcula, ſubſuccoſa, comminuitur, ſaliva non tincta.

BRASSICA ERUCA. L.

Eruca. Ph. Weiſſer Senf. Bjlá horčice.

B. *Eruca.* Foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris.

Indigena. Annua.

Off. Semen. *(a)*

FORMA. *Semina* globoſa, pallide ſubcitrina, glabra, magnitudine ſeminis Sinapis. PRO-

a) Mercatores noſtri loco ſeminis Erucæ ſemen Sinapis exhibent.

PROPRIETAS. *Odor* graviusculus. *Sapor* seminum Sinapios, verum longe remissior.

SINAPIS NIGRA. L.

Sinapi. Ph. Schwarzer Senf. Horčice.

Sinapis. *Cal*. patens. *Cor*. ungues erecti. *Glandula* inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem.

S. *Nigra*. Siliquis glabris racemo appressis.

Indigena. Annua.

FORMA. *Semina* parviuscula, subrotunda, fusco — ferruginea, undique minutim rugosa.

PROPRIETAS. *Odor* debilis; *Sapor* subamaricans, calidus, acris, subfugax; *masticata* facile comminuuntur, mordent & calent in lingua & faucibus: saliva subemulsiva.

PRÆPARATA. Farina? (*a*)

✠ RAPHANUS SATIVUS. L.

Raphanus Niger. Ph. Rettig. Ředkew černá.

Raphanus. *Cal*. clausus. *Siliqua* torosa, subarticulata, teres. *Glandulæ* melliferæ 2 inter stamina breviora & pistillum, totidem inter stamina longiora & calycem.

R. *Sativus*. Siliquis teretibus torosis bilocularibus.

Colitur. Biennis.

Off. Radix recens. (Semina raro.)

FORMA. *rec*. *Radix* globosa s. cylindrica, alba, magnitudine ovi columbini vel supra, lævis infi-

a) Cum sæpissime præscribatur.

insima basi fibra filiformi, fibrillosa, descendente; *parencymate* carnoso, succulento, fragiliusculo, albo; post sectionem transversalem centrali parte amplissima, radiato — stellata: radiis subdiaphanis; corticali parte firmiore.

PROPRIETAS. *rec. Odor* subfragrans; *sapor* calidiusculus, vix amaricans, acris; corticalis pars acrior; *masticata* non solvitur, sed comminuitur succo aqueo, sapore acri, fugaci. *Cocta* fere insipida. *Siccata* absque odore est, & tantum non sine sapore.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.
ORDO
POLYANDRIA.

ALTHÆA OFFICINALIS. L.

Althæa. Ph. Eybisch. Wysoký slez.

Althæa. Cal. duplex: exterior 9 — fidus. *Arilli* plurimi, monospermi.

A. Officinalis. Foliis simplicibus tomentosis. Indigena. Perennis.

Off.

Off. Radix. Herba. Flores.

FORMA. *Radix rec.* majuſcula, ſuperne verſus caulem ramoſa: ramis pedalibus, deſcendentibus, teretibus, ſimplicibus, craſſitie digiti vel policis, extus cinereo—albida, ſubrugoſa: rugis tranſverſalibus. *Parencyma* ſubcarnoſum, album; poſt ſectionem tranſverſalem ſtriatum: ſtriis radiantibus, albidioribus, ſubobſoletis, a centro ad peripheriam undique ſpectantibus; centro medullari ampliore, notato annulo incarnato, ſubcrenato; corticali parte ſubcarnoſa. *Caules* plures ex una radice, bipedales, erecti, teretes ſcabri, hirſuti, inferne rugoſi, ramoſi. *Rami* alterni erecti. *Folia* alterna, petiolata, patentia, cordato—ſubrotunda, utrinque villoſa ſ. tomentoſa, mollia, 5—loba: lobis rotundatis, inæqualiter & groſſe ſerratis; 5—nervia, venoſa. *Petioli* longitudine foliorum, ſemiteretes ſcabri, ſupra plano—canaliculati. *Stipulæ* 2, lanceolatæ, acutæ, oppoſitæ, ciliatæ, pubeſcentes. *Racemus* terminalis, ſubcompoſitus, floribus pedunculatis, cernuis. *Folia* tenera loco bractearum lobata. *Pedunculi* teretes, tomentoſi, uniflori. CAL. *Perianth. exterius* 1—phyllum, tomentoſum, concavum, cinereum, venulis viridibus reticulatum, trifidum: ſinubus exſtantibus: laciniis ovatis, trifidis: lateralibus rotundatis; intermedia acuta, longius producta, *interius* 1—phyl-

ium, densius tomentosum, molle, campanulatum, intus glabrum, annulo elevato in medio calycis longitudine exterioris, 5 — fidum: lacciniis ovato — acutis, erectis. Cor. incarnata. *Petala* 5, calyce duplo longiora, unguiculata, obcordata, erecto patentia, striata, venis parallelis, apice ramosis; biloba: lobis obtusis; sinu profundo, rotundato; unguibus brevibus, margine utrinque ciliato — barbato. Stam. *Filam.* plurima, monadelpha, corolla duplo breviora, alba; columna cylindrica, tomentosa, e receptaculo corollæ surgens, filamentis superne liberis, glabris, inferne pilosis, undique patentibus. *Antheræ* undique echinatæ. Pist. *Germen* inferum respectu corollæ, sed superum respectu calycis, orbiculatum, depressum, margine crasso, undique longitudinaliter striato. *Stylus* cylindricus, breviusculus. *Stigmata* plurima, subulata, staminibus breviora.

Proprietas. *Rec.* & *Sicc.* *Radic.* *Odor* nullus; *Sapor* subdulcescens; *masticata* emollitur, lubrica & valde mucilaginosa sentitur. *Herbæ* nempe foliorum & florum: *Odor* nullus; *sapor* herbaceus; inter masticandum mucilaginosum exhibet.

Præparata. Mucilago.
Pasta.
Syrupus.
Unguentum.

Com.

Composita. *Rad.* Emplastrum Malacticum, — de Meliloto.

Pulvis Infantum absorbens:

Species Decocti Althææ Fernelii, & Vulgares.—Emollientes.—pro Gargarismate Emolliente.—Decocti Pectorales.

Tabulæ de Althæa.

Herb. Species Decocti Althææ Fernelii, & Vulgares (*Ex his Syrupus Althææ*)—Emollientes.—pro Gargarismate Emolliente.

Mucil. Emplastrum Diachylon Simplex.

Alcea rosea. L.

Malva Arborea. Ph. Gartenpapeln, Schwarzrothe Papeln. Zahradnj neb Rjjmský slez.

Alcea. *Cal.* duplex : exterior 6—fidus. *Arilli* plures monospermi.

A. Rosea. Foliis sinuato angulosis.

Hortensis. Biennis. (*a*)

Off. Flores.

Forma. *Rec. Racemus* terminalis, floribus magnis, brevius pedunculatis. Cal. *Perianth. exterius* 1—phyllum, tomentosum, hirtum: pilis rigidiusculis, palmatis; profunde 6—fidum, sæpe subnovemfidum: laciniis ovato—lanceolatis, acutis, striatis, laxiusculis; *interius* 1—phyllum,

a) Nobis potissimum perennis.

lum, pariter tomentoſo — hirſutum, ſtriatum, exteriori longius, 5 — fidum: laciniis ovato — lanceolatis, margine undulatis, acutis, erectis. Cor. calyce duplo longior, 5 — petala (ſæpe plena) purpurea. *Petalis* imbricatis, patentibus. obovatis, latis, ſubtruncatis, vix retuſis, venoſis, brevius unguiculatis: unguibus virideſcentibus, utrinque barbatis. Stam. *Filam.* plurima, monodelphia, corolla duplo breviora; columna pentagona, glabra, virideſcens, e receptaculo corollæ ſurgens, filamentis ſuperne liberis, glabris, undique patentibus. *Antheræ* ſubrotundæ undique echinatæ. Pist. *Germen* intra receptaculum orbiculatum, depreſſum, virideſcens, glabrum, ſuperne minutim tomentoſum. *Styli* plurrimi, rubri, intra columnam ſtaminum, illiſque longiores. *Stigmata* ſimplicia.

Proprietas. *Rec. Odor* nullus; *Sapor* debiliſſimus, vix ullus; *maſticata* petala lubrica, mucilaginoſa.

Malva rotundifolia. L. (a)

Malva vulgaris. Ph. Gemeine Käſepapeln. Zaſgecj ſlez.

Malva. *Cal.* duplex: exterior 3 — phyllus. *Arilli* plurimi monoſpermi.

M. Rotundifolia. Caule proſtrato, foliis cordato — or-

a) Malva rotundifolia ad ruderata & vias creſcens exiguos & valde pallidos exhibet flores, quæ translata in hortum, eoſdem præbet & majores & rubicundiores.

orbiculatis obtuſe quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis.

Indigena. Annua. (a)

Off. Herba. Flores.

FORMA. *Rec.* *Caules* plures ex una radice, patenti procumbentes, teretes, ſpithamæi, pubeſcentes. *Folia* alterna petiolata, utrinque minutim pubeſcentia, ſcabriuſcula, ſubrotundo-reniformia, 5 — vel 7 — lobata: lobis rotundatis, margine ſerrata, ſubtus ſubſeptemnervia, ſupra nervis lineata, vix pollicaria. *Petioli* teretes, elongati, pubeſcenti ſcabri, ſupra ſulcati. *Stipulæ* 2, oppoſitæ, parviuſculæ, lanceolatæ, acutæ, ciliatæ, pubeſcentes. *Flores* gemini, pedunculati, axillares e foliis, pedunculis petiolis brevioribus, filiformibus, teretibus, pubeſcentibus, ſæpius inæqualibus. CAL. *Perianth. exterius* triphyllum: foliolis lineari — ſubulatis, obtuſis; *interius* campanulatum, pubeſcenti ſcabrum, 5 — fidum: laciniis ovato — acutis, erectis, carinatis, margine ciliatis, ſubundulatis. COR. alba. *Petala* 5, lineari cuneiformia, obtuſa, emarginata, calyce paullo longiora, erecta ſubſeſſilia. STAM. *Filam.* plurima monadelphia; columna cylindrica, glabra, corolla breviore, ſuperne breviter libera. *Anthæ.* parvæ, ſubrotundæ, echinatæ, undique nutantes. PIST. *Germen* orbiculatum, depreſſum, intra recep-

a) Imo duratione non raro annum ſupperat.

ceptaculum corollæ. *Styli* plures, subulati, erecti, vix pubescentes, longitudine staminum. *Stigmata* simplicia.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* nullus; *Sapor* herbaceus, debilis; *masticata* folia lubrica, mucilaginosa.

COMPOSITA. *Herb.* Species Decocti Althææ Fernellii — Emollientes. — pro Gargarismate Emolliente.

Flor. Species Decocti Althææ Vulgares.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.
ORDO
PENTANDRIA.

FUMARIA OFFICINALIS. L.

Fumaria. Ph. Erdrauch. Polnj neb planá rautka.

Fumaria. *Cal.* diphyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2, membranacea, singula Antheris 3.

F. Officinalis. Pericarpiis monospermis, racemosis, caule diffuso.

Indigena. Annua.

Off.

Off. Herba.

Forma. *Rec.* *Caulis* ſucculentus, fragilis, erectus, dodrantalis, ſubflexuoſus, pentagonus, lævis ramoſus. *Rami* alterni, erecti, cauli conformes, prope radicem diffuſi. *Folia* alterna, petiolata, duplicato — pinnata: pinnis & pinnulis alternis, diſtantibus, petiolatis: lobis ſubſucculentis, cuneiformibus, inciſo — pinnatifidis; laciniis ovali — linearibus, obtuſis, ſubmucronatis, dilute virideſcentibus, undique glabris, ſubtus pallidioribus. *Petioli* communes triangulares, recti; partiales ſubflexi.

Proprietas. *Rec.* *Odor* contuſæ herbæ tanquam oleris; *Sapor* ſubingratus, amarus; *maſticata* ſubſuccoſa, ſaliva virideſcente. *Sicc.* fere amarior.

Præparata. Conſerva.
Extractum.
Syrupus.

Composita. *Herb.* Species Decocti Aperitivi.
Extract. Pilulæ Balſamicæ Stahlii.
Syrup. Electuarium Antifebrile.

ORDO.
OCTANDRIA.

Polygala amara. L. (*a*)

a) In noſtris pharmaeopoliis ſemper ſubſtituitur Vulgaris, niſi Vienna alata fuerit Amaræ radix.

Polygala. Senega Nostras. Ph. Kreuzblümlein. Vstawač, zezhulka, mudatka.

Polygala. Cal. 5 — phyllus: foliolis duobus alæformibus, coloratis. *Legumen*, obcordatum, biloculare.

P. Amara. Floribus cristatis racemosis, caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus.

Ingena. Perennis.

Off. Radix. (Herba raro.)

Forma. *Radix*. lignosa, tenuis, semipedalis, ex fusco pallens, & fibris aucta. Tota planta glabra est, multiceps in cauliculos breves procumbentes plures in cespitem, sæpe densum, dispescitur, rosulam gerentes foliorum, quæ sunt obverse ovata, etiam acutiuscula, firmula, crassiula, versus basin attenuata. Caules herbacei, suberecti, semipedales vel breviores, etiam sescunciales, angulati, foliis vestiti sparsis, anguste sublanceolatis, acutis, ceterum simplicissimi, rarissime ramosi, terminati racemo florum plerumque ex cœruleo violaceorum, paucioribus individuis ex purpureo rubentium. Calycis corollæ concoloris, foliola sunt ferme æqualia, oblonga, concava, petiolis fere duplo breviora.

Proprietas. *Rad. Odor* vix ullus; *sapor* subaromaticus & subamarus. *Herbæ Odor*; uti radicis; *sapor* intense amarus, diuque ori inhærens.

OR-

ORDO
DECANDRIA.

* SPARTIUM JUNCEUM. L.

Genista. Ph. Genester, Pfrimenkraut. Ganoſſjt neb Janoſſjt, beylj aneb rákoſý.

Spartium. Stigma longitudinale, ſupra villoſum. *Filamenta* germini adhærentia. *Cal.* deorſum productus.

S. Junceum. Ramis oppoſitis teretibus apice floribus, fol. lanceolatis.

Hortenſe. Frutex arboreſcens.

Off. Virgula pro Cineribus. Flores.

FORMA. Frutex arboreſcens diverſæ altitudinis, cujus trunco rami tenues oriuntur, virgularum adinſtar, quæ anguloſæ virentes, flecti nectique faciles, non raro quoque in alias diviſæ, in quibus folia crebra, hirſuta, priora Trifolii, alia ſimplicia, acuminata.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *ſapor* amarus, nauſeoſus.

PRÆPARATA. Sal Alcalinus.

* GENISTA CANARIENSIS. L.

Rhodium. Ph. Roſenholz. Ružowé dřewo.

Geniſta. Cal. bilabiatus. $\frac{2}{3}$. *Vexillum* oblongum a piſtillo ſtaminibusque deorſum reflexum.

G. Canarienſis. Foliis ternatis utrinque pubeſcentibus, ramis angulatis. Exo-

Exotica. Arbor.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum* in frustulis cylindricis, distortis, crassitie 1 vel 2 pollicum, ponderosum, solidum, durum; alburno albido, tenuiore; medullari parte amplissima, viridi — rubescente; post sectionem transversalem notatum disco discolore, undique distincto, striis minutissimis, a centro ad peripheriam tendentibus, parallelis, undique etiam adsperso punctulis parvis, frequentibus sparsis; centro medullari amplissimo, in medio saturatius tincto, versus marginem vero dilutius. Lignum vestitum est *cortice* cinereo — bruneo, rugoso, tenuiore.

PROPRIETAS. *Ligni* rasi s. fricati: *Odor* fragrans, fere Rosæ Damascenæ, gratus; *Sapor* ligni pulverati gratus, rosaceus, leniter amaricans, linguæ inhærens calidiusculus. Pulvis e ligno raso flavescit. *Corticis* odor & sapor debiles non rosacei.

PRÆPARATA. Oleum Destillatum.

COMPOSITA. *Ol.* Unguentum Rosatum album.

* LUPINUS ALBUS. L.

Lupinus. Ph. Feigbohne. Rzimský aneb sskrkawičný hrách.

Lupinus. Cal. 2 — labiatus. *Antheræ* 5 oblongæ; 5 subrotundæ. *Legumen* coriaceum.

L.

L. Albus. Calyc. alernis inappendiculatis: labio superiore integro; inferiore tridentato.
Exotico — Annuus.

Off. Semen. (*a*)

Forma. *Semin* majusculum, orbiculatum, & nonnihil angulosum, compressum, qua parte siliquæ adhæret cavitatem quandam velut umbicum exiguum habens, foris album, intus luteum.

Proprietas. *Odor* nullus; *sapor* amarus, qui vero maceratione in aqua calida perit.

Vicia Faba. L.

Faba. Ph. Bohne. Bob, aneb bjlé fasoly.

Vicia. *Stigma* latere inferiore transversale barbatum.

V. Faba. Caule erecto, petiolis absque cirrhis. Hortensis. Annua.

Off. Semen. (*b*)

Forma. *Rec.* *Legumen* viride glabriusculum, lucidiusculum, tereti — compressum, palmare vel ultra, subtorulosum, sutura utrinque marginali, basi paullulum attenuatum, fulcitum calyce persistente & emarcido, apice obtuso — rotundatum cum mucrone conico subulato, incurvo, e stylo persistente orto, sæpe terminato stigmate reflexo; uniloculare, subtetraspermum, bi-

a) Lupini Hirsuti variegata semina divendere solent mercatores loco Lupini albi.

b) Phaseolus vulgaris apud nos fere semper locum Fabæ occupavit.

bivalve: valvis carnosis: tomento spisso, spongioso, succoso. *Semina* pedicellata, magna, reniformi — ovata utrinque compresso — plana, glabra, alba, apice obtuso rotundata, basi obtusa, utrinque gibbosa, hilo lineari notata, orto e pedicelli apice clavato — lineari, longitudinaliter semini adnato. *Parencyma* cotyledoneum, viride, intra tunicam firmam.

Proprietas. *Rec. Leguminum. Odor* leguminis Pisi. *Sapor* consimilis; *tenella* tenera, cocta sapida. *Seminum* immaturorum *Sapor* dulcescens; *masticata* tenera, succosa, saliva viridescente; ipsa tunica subsucculenta.

Præparata. *Tot. Plant.* Sal Alcalinus.

Composita. *Pulv. Sem.* Emplastrum Malacticum.

Cicer Arietinum. L.

Cicer. Ph. Küchern, Ziserlein. Cyzrna.

Cicer. Cal. 5 — partitus, longitudine corollæ: laciniis 4 superioribus vexillo incumbentibus. *Legumen* rhombeum, turgidum, dispermum.

C. Arietinum. Foliolis serratis.

Indigenum. Annuum.

Off. Semen.

Forma. *Semina* subrotunda, magnitudine seminis Pisi, alba vel rubra, postice sulcato — depressa, antice breviter rostrata; puncto exca-

va-

vato proxime ſub roſtro; elevato autem puncto ſubtus, longius a roſtro. *Parencyma* luteſcens, uniforme, cotyledoneum.

Proprietas. Eadem quæ ſeminis Piſi.

Composita. Species Decocti Althææ Fernelii.

Glycyrrhiza glabra & echinata. L.
Liquiritia. Ph. Süßholz. Lekořice, sladký kořen neb dřewo.

Glycyrrhiza. Cal. bilabiatus: $\frac{1}{3}$. *Legumen* ovatum, compreſſum.

G. Glabra. Leguminibus glabris, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato.

G. Echinata. Leguminibus echinatis, foliis, foliolo impari ſeſſili.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

Forma. *Rec. Radix Glycyrrhizæ Glabræ.* ſertentoſa, profunde deſcendens, ſub terra repens, ramis teretibus, extus ferrugineis, craſſitie pennæ anſerinæ, digiti minoris vel pollicis, inſtructis fibris radicantibus ſparſis; *parencymate* ſubcarnoſo, luteſcente, poſt ſectionem tranſverſalem notato centro medullari ſubrotundo, parviuſculo, diſco undique punctato, radiato -- ſtriato: radiis a centro medullari ad peripheriam; conſtante ex circulis 2, quorum interior magis flaveſcit. *Siccata* radix dura.

Proprietas. *Rec. Odor* crudus, exacte leguminum rec. Phaseoli vulgaris; *Sapor* intense dulcis simul in legumen Pisi incidens; *masticata* mucilaginosa. *Siccatæ odor* nullus; *Sapor* intense dulcis; *masticata* emollitur & subpulposa fit.

Præparata. Extractum seu Succus inspissatus.

Compositia. *Rad.* Baccilli Liquiritiæ ex his Trochisci Bechici Citrini.

Elixirium Salutis.

Infusum Laxativum vulgo Hydromel Infantum.

Pulvis Haly. — Spec. Diatragacanthæ, hic pro Pulvere Spec. Diaireos. — Vitæ.

Species Decocti Althææ Fernelii & Vulgares. — Decocti Aperitivi. — Decocti Lignorum. — Decocti. Pectoralis.

Syrupus de Siliquis sive Diacodii Liquidus & Crocatus. (Liquidus pro Electuario Infantum seu Requie Nicolai & Pilulis Balsamicis Mortoni.)

Trochisci Bechici Nigri.

Unguentum Liquiritiæ.

Extract. Electuarium Pectorale.—Elect. seu Theriaca Andromachi.

Elixirium Asthmaticum seu Pectorale Dulce.

Pi-

Pilulæ de Styrace.
Trochiſci Bechici Nigri.

ASTRAGALUS TRAGACANTHA. L.
Tragacantha. Ph. Bocksdorn. Tragant.

Aſtragalus. Legumen biloculare, gibbum.

A. Tragacantha. Caudice arboreſcente, petiolis ſpineſcentibus.

Exotico — Fruticaſa.

Off. Gummi.

FORMA. *Gummi* pallidum, ſubdiaphanum, læve, facie cornea, ſubſplendens, fragile, polymorphum: fruſtulis compreſſis, communiter flexuoſis ſ. intortis, ſæpe angulatis, lineari vermiformibus, ſæpe in grumulis oblongis ſ. ſubrotundis.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* nullus; *maſticatum* durum, comminuitur, plenarie ſolvitur. In ore retentum abſque maſticatione, emollitur, tardius accenditur.

PRÆPARATA. Mucilago.

COMPOSITA. *Gum.* Pulvis Haly. — Specierum Diatragacanthæ.

Mucil. Baccilli Liquiritiæ.
Candelæ Fumales.
Tabulæ de Althæa.
Trochiſci Alchandar. — Bechici albi — contra Vermes.

TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS. L.
Melilotus. Ph. Steinklee. Komonice.
Trifolium. *Flores* ſubcapitati. Legumen vix calyce longius non dehiſcens, deciduum.
T. Melilotus Officinalis. Leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto.
*Indigeno —Biennis.

Off. Herba cum Flore. (*a*)

FORMA. *Rec*. *Caules* plures ex una radice, erecti, bi vel tripedales vel ultra, teretes, glabri, virides, angulis tribus inſtar linearum elevatarum, a ſingulo ramo decurrentibus, parallelis, remotis; ramoſus. *Rami* alterni, erecti, ungulati, glabri, ſtriati. *Folia* alterna, petiolata, ternata; foliolis ovali — oblongis, apice truncatis, margine acute ſerratis, ſubpollicaribus, utrinque glabris, ſupra obſcure viridibus, ſubtus pallidioribus, nervis tenuibus ſuboppoſitis, a coſta obliquis; 2 inferioribus ſubſeſſilibus; intermedio paullo majore, petiolato petiolelli apice ſurſum flexo. *Petioli* ſuperne ſulcati, baſi ovati, concaviuſculi, amplexicaules. *Stipulæ* 2, oppoſitæ, lineari – ſubulatæ, parvæ. *Racemi* florum axillares, pedunculati, erecti, ſubcylindrici, nudi, pubeſcentes, ſecundi, floribus pedicellatis, nutantibus. *Bracteæ* parvæ, lineari ſubulatæ, ſubpilloſæ, ad pedicellos

a) Flore albo apud nos ſæpiſſime variat in agris & pratis, atque duratione annum ſuperare ſolet.

los ſolitariæ, illiſque breviores. CAL. *Perianth.* campanulatum, parviuſculum, minutim pubeſcens: ore 5—fido, acuto, erecto. COR. lutea, calyce triplo longior. *Vexillum* obovatum, obtuſo—rotundatum, emarginatum, planum, carinatum, ſubrevolutum, ungue concavo. *Alæ* 2, lineares, obtuſæ, longitudine vexilli, baſi ſemiſagitatæ. *Carina* navicularis, dorſo convexa, longitudine fere alarum, ungue lineari. STAM. *Filam.* 10, ſimplex & novemfidum, carinæ incluſa. *Anth.* ſubrotundæ. PIST. *Germen* lineari—ovale, utrinque acutum, virideſcens, compreſſum. *Stylus* ſubulatus, longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex. *Legumen* pendulum, calyce longius, ovale, utrinque acutum, dorſo convexum, antice margine acuto, undique rugoſum, uniloculare, diſpermum. *Semina* ſubrotunda.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* ſvaveolens, in Aſperulam odoratam incidens; *Sapor* herbaceus, amaricans, ſimul in Piſum incidens; *Sicc.* fere conſimilis; odor paullo fortior.

COMPOSITA. *Herb.* Emplaſtrum de Meliloto.
Species Emollientes.
Flor. Unguentum Nervinum.

TRIGONELLA FOENUM GRÆCUM. L.
Fœnugræcum. Ph. Bockhorn. Seno Rzecké.

Trigonella. Vexillum & Alæ ſubæquales, patentes forma corollæ tripetalæ.

T. Fœnum Græcum. Leguminibus ſeſſilibus ſtriatis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto.

Hortenſe. Annuum.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* oblonga, teretiuſcula, compreſſiuſcula, utrinque truncata, glabra, brunnea, undique adſperſa atomis excavatis, inciſura laterali utrinque ſtria depræſſa decurrente, magnitudine ſeminis Cannabis vel ultra, *parencymate* cotyledoneo, luteſcente: cotyledone bifido, laciniis ovalibus, obtuſis, baſi cylindrica, inflexa.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, unguentaceus; *Sapor* ſeminis Piſi; odori congruens; *maſticata* mucilaginoſa.

COMPOSITA. *Pulv. Sem.* Emplaſtrum Malacticum. — de Meliloto.

Species Emollientes.

Mucilag. Sem. Emplaſtrum Diachylon. Unguentum Althææ.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

ORDO PENTANDRIA.

* THEOBROMA CACAO. L.

Cacao. Ph. Caccau. Kackau.

Theobroma. *Cal.* 3 — phyllus. *Petala* 5, fornicata, bicornia. *Nectarium* 5 — phyllum, regulare. *Stam.* nectario innata, ſingula antheris 5.

T. Cacao. Foliis integerrimis.

Exoticum. Arbor.

Off. Semen.

FORMA. *Nuclei* ovato — oblongi, undique obtuſi, utrinque compreſſi, magnitudine nucis avellanæ, incluſi cortice papyraceo, cinereo — olivaceo, fragiliuſculo; *parencymate* cotyledoneo, pingui; fuſco nigricante, violaceo, conſtante lobulis intortis & coniventibus, tenui pellicula interſtinctis.

PROPRIETAS. *Sicc.* *Odor* vix ullus, niſi nuclei toſti & tunc debilis; *Sapor* pinguiuſculus, leniter ſubadſtringens, amaricans, ſatis gratus; *maſticati* nuclei comminuuntur, in ore ſenſim ſol-

vun-

vuntur ſaliva fuſco brunea. Hi nuclei ignis flammæ admoti, accenduntur, flagrant: flamma luminoſa, non fumante vix fuliginoſa.

PRÆPARATA. Butyrum? (a)

ORDO
DODECANDRIA.

CITRUS MEDICA. L.

Citrus. Limonia. Ph. Citrone. Cytryn, cytrynowé gablko.

Citrus. Cal. 5 — fidus. *Petala* 5, oblonga. *Antheræ* 20, filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9 — locularis.

C. Medica. Petiolis linearibus.

Exotica. Etiam Hortenſis Arborea.

Off. Fructus recens pro ſucco &c. Fructus. Cortex.

FORMA. *Rec. Pomum* ovale, utrinque attenuatum, magnitudine ovi anſerini vel ſupra, undique rugoſum, punctatum, ad tactum læviuſculum, colore pallide luteo; cortice coriaceo — carnoſo, albo, ſubinſipido; epidermide (flavedine) craſſiuſculo, celluloſo: cellulis ſubrotundis, oleo eſſentiali gratiſſimo fœcundis ſingulis terminatis po-

a) Saltem, ſi non & Chocolada.

poro, occluſo membrana tenui. *Parencyma* 9-loculare: loculis diſpermis; veſiculatum: veſiculis parallelis, pedunculatis, cylindricis, teneris, diaphanis, ſucco limpidiſſimo turgidis. *Semina* albida, ovato-gibba, undique minutim, rugoſa, dorſo & baſi convexa, ſtriata, antice ſubmarginata, apice acuta, undique obducta gelatina lubrica; *parencymate* cotyledoneo, bipartibili.

PROPRIETAS. *Rec. Flaved. Odor* fragrans, gratiſſimus; *Sapor* conſimilis, calidiuſculus, vix amaricans. *Pulpæ* odor debilis, gratus, ab epidermide infectus; *Sapor* intenſius acidus, purus.

PRÆPARATA. Aqua Citri Corticis. — Citri Totius.

Eleoſacharum.
Eſſentia Corticum Citri.
Oleum Corticis deſtillatum.
Syrupus Acetoſitatis Citri. — Corticum Citri.

COMPOSITA. *Cort.* Aqua Carminativa Communis & Regia. — Meliſſæ compoſita. — Theriacalis.

Elixirium Vitrioli.
Eſſentia Carminativa.
Infuſum ſeu Aqua Angelicæ.
Morſuli Imperatoris.
Species pro Potu Ordinario.
Succ. Infuſum ſeu Aqua Angelicæ.

La-

Lapides Cancrorum Citrati? (a)
Aq. Liquor Viſceralis.
Syrupus Kermeſinus.
Ol. Eſſentia ſive Balſamum Vitæ Hoffmanni.
Unguentum Roſatum Album. — de Uvis ſive ad Labia.
Syrup. Electuarium ſive Confectio Hyacinthina.

CITRUS AURANTIUM. L.
Aurantium. Ph. Pomeranze. Pomoranč.
C. Aurantium. Petiolis alatis, foliis acuminatis. Exoticus etiam Hortenſis. Arboreus.

Off. Folia. Flores. Fructus. Fructus cortex.

FORMA. *Rec. Folia* alterna, petiolata, coriacea, ſempervireſcentia, ovato — oblonga, utrinque attenuata, acutiuſcula, margine ſubſerrata: ſerraturis remotis obſoletis, adpreſſis; utrinque lævia, lucidiuſcula, undique punctata: punctis ſubdiaphanis, excavatis, diſci folii parvis, marginis vero majoribus, tripollicaria, patentia, ſaturate viridia; *tenera* citrina. *Petioli* foliis quadruplo breviores, baſi teretes, ſuperne alati: ala plana, cuneiformi, apice obtuſo — rotundato, petiolo breviore. *Flores* in ramulis terminales, 2 vel 3 congeſti, ſæpe ſolitarii, axillares, pedun-

cula-

a) Quoniam eorum uſus adhuc hodie frequens.

culati *Pedunculi* petiolis breviores, albi punctati, ſuperne ſenſim incraſſati. *Bracteæ* 2, parvæ, oppoſitæ, lineari — ſubulatæ, ciliatæ, ad baſim pedunculi, erectæ. CAL. *Perianth.* 1 — phyllum, album, punctatum, minutim pubeſcens, parviuſculum, 5 dentatum: laciniis ovato — acutis, ſubcarinatis, erectis; 3 proximioribus. COR. alba, carnoſa. *Petala* 5, ſeſſilia, lineari — lanceolata, obtuſa, calyce pluries longiora, utrinque plana, glabra, ſubtus punctata, patentia. STAM. alba, carnoſa. *Fil.* glabra, in orbem poſita, connexa in 5 vel 6 corpora linearia, apice fiſſa, corolla breviora, erecta. *Anth.* circiter 20, lineari — cordatæ, erectæ, luteæ. PIST. *Germen.* ſuperum, globoſum, viride, glabrum, ſubangulatum, ſubrugoſum. *Stylus* cylindricus, craſſus, longitudine ſtaminum. *Stigma* capitatum, globoſum, colore aurantio, ſummo apice depreſſum. *Pomum* globoſum, apice & baſi compreſſiuſculum, apice umbilico minuto, colore fuſco, magnitudine ovi anſerini vel pugni, undique adſperſum punctis excavatis, glabrum; cortice coriaceo — carnoſo, albido, epidermide craſſiuſculo, celluloſo: cellulis diſcretis, ſubrotundis, oleo eſſentiali fœcundis, ſingula terminata poro, membrana tenui tecto. *Parencyma* 8 vel 10 — loculare: loculis diſpermis; veſiculatum veſiculis pedunculatis, cylindricis, acutis, parallelis, turgidis ſucco diaphano,

lim-

limpidissimo. Semina subovata, basi oblique truncata, apice obtusiuscula, hinc striata, inde planiuscula, lævia, *parencymate* cotyledoneo, bipartibili; *Collumella* carnosa, albida.

Proprietas. *Rec. folior. Odor* debilius flagrans graviusculus; *Sapor* aromaticus, amaricans, calidiusculus; *Florum*: *Odor* fragrantissimus, svaveolens, temulentans; *Sapor* amaricans, gratus, aromaticus; *masticati* amari, mox aromate odori congruente, tum aromate corticis fructus, debiliore tamen. *Mali* flavedinis *Odor* fragrans, ingratior citro; *Sapor* amarus, aromaticus, *masticata* linguam & fauces calefacit; *caro* corticis amara; *pulpa* acida, amaricans.

Præparata. *Flor.* Aqua Naphæ.

Cort. Eleosacharum.

Essentia.

Oleum destillatum.

Syrupus Corticum Aurantiorum. — Mali Aurantii.

Tinctura Tartari Aurantiata.

Conserva. (*a*)

Composita. *Cort.* Aqua Carminativa Communis, & Regia.

Elixirium Stomachicum temperatum.

Essentia Absinthii composita. — Carminativa.

Li-

(*a*) *Conserva* flavedinis aurantiorum valde usualis. *Conditum* Corticis hujus atque prioris dum præscribitur a Conditoribus sibi vindicant Pharmacopei.

Liquor Viſceralis.
Aq. Paſta de Althæa.
Morſuli Imperatoris.
Syrupus Capillorum Veneris.

ORDO
POLYANDRIA.

HYPERICUM PERFORATUM. L. (*a*)
Hypericum. Ph. St. Johanneskraut. S. Jana bylina, zwoneček čerwený.

Hypericum. Cal. 5 — partitus. *Petala* 5, *Filamenta* multa, in 5 phalanges baſi connata. *Capſula.*

H. Perforatum. Floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis, pellucido — punctatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba. Flores.

FORMA. *Rec. Caulis* erectus, glaber, tetragonus: ungulis acutis, adſperſis punctis parvis, nigricantibus, ſparſis; pedalis, inferne ſimplex, ſuperne ramoſus: ramis alternatim oppoſitis, breviuſculis, inferne tetragonis, ſuperne ancipitibus. *Folia* oppoſita, ſeſſilia, ovali — oblonga, obtuſa, pollicaria, internodii longitudine, glabra, ſupra viridia, lineata, rugoſa, utrinque

a) Promiſcue uſurpatur Hyſpanicum Perforatum & Quadrangulare.

nervulosa, subtus pallidiora, nervosa, patentia, adspersa punctis diaphanis, parcius sparsis per discum, & punctis aliis nigris, undique sub margine; *ramea* folia minora. *Corymbus* terminalis, glaber, fastigiatus, simpliciusculus, foliolus, constructus e ramis caulis erectis, superne floriferis, pedunculis alternatim oppositis, bifloris, intermedio flore solitario, priore. *Bracteæ* ovali—oblongæ, obtusæ, oppositæ ad pedicellos, patentes. CAL. *Perianth.* 5—partitum: laciniis ovali—oblongis, obtusis, glabris, trinerveis, nigro—punctatis. COR. *Petala.* 5, ovali—oblonga, obtusa, sessilia, patentia, calyce duplo longiora, lutea, venosa, subtus adspersa punctis parvis nigris, polymorphis, frequentibus. STAM. *Filam.* plurima, lutea, basi in fasciculos cohærentia, corolla breviora. *Anth.* subrotundæ, didimæ, singulæ terminatæ puncto nigro. *Pist. Germen* superum, viride, ovatum, glabrum, majusculum, longitudine calycis, trigonum: angulis rotundatis; desinens in *Stylos* 3, subulatos, longitudine staminum. *Stygmata* simplicia, nigricantia.

PROPRIETAS. *Rec. Florum*: *Odor* debilis; *Sapor* amaricans, balsamicus; *masticati* salivam purpureo tingunt. *Foliorum*: *Odor* debilis, in odorem angelicæ sylvestris incidens; *Sapor* amaricans, substypticus, subbalsamicus; *masticata* salivam viridescentem tingunt.

PRÆ-

PRÆPARATA. Oleum coctum.

COMPOSITA. *Flor.* Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Emplaſtrum Defenſivum rubrum.

Unguentum Digeſtivum.

Herb. c. Flor. Oleum Viride.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

ORDO

POLYGAMIA ÆQUALIS.

SCORZONERA HISPANICA. L.

Scorzonera. Ph. Schlangenmord, Skorzonere. Hadj mordowý kořen.

Scorzonera. Receptaculum nudum. *Pappus* plumoſus. *Calyx* imbricatus ſquamis margine ſcarioſis.

S. Hiſpanica. Caule ramoſo, foliis amplexicaulibus integris ſerrulatis.

Hortenſis. Perennis.

Off. Radix.

FOR-

FORMA. *Rec. Radix* fuſiformi — cylindrica, ſpithamæa, deſcendens, extus veſtita nigro cortice & rugoſo: rugis annularibus, parte fibrilloſa; *parencymate* carnoſo, albo; poſt ſectionem tranſverſalem notato centro medullari orbiculato, amplo, ſtriato: ſtriis radiantibus, obſoletis; obducto annulo incarnato, punctato; corticali parte alba lacteſcente. *Sicc.* Radix in officinis ſecta in taleolas longitudinales occurrit, extus rubras, intus albas, flexili — fragiles.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* nullus. *Sapor* aquoſus ſucculentus, ſubinſipidus. *Siccat.* radix conſciſſa & inter digitos tractatata, ſubadhæret, quod ex principio melligineo derivatur; *maſticata* comminuitur, pulpoſa fit, ſapore dulceſcente, grato, abſque omni aromate.

COMPOSITA. Species pro Potu ordinario.

LACTUCA SATIVA. L.

Lactuca. Ph. Lattig. Salát, locyka.

Lactuca. Recept. nudum *Calyx* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Pappus* ſimplex, ſtipatus. *Sem.* lævia.

L. Sativa. Foliis rotundatis, caulinis, cordatis, caule corymboſo.

Hortenſis. Annua.

Off. Herba recens. Semen.

FORMA. *Rec. Caulex* breviſſimus. *Folia* petiolata, approximata, ſubrotunda ſ. ovalia, apice obtuſo — rotundata, utrinque glabra, luteo — vi-

ridefcentia bafi pallida, difco bullata f. plicato — rugofa, margine plana, vix plicata, tenuia, repanda, denticulato — ferrata; exteriora magis rotunda, patentia interiora magis oblonga, obovata, pallidiora, citrina, coniventia in caput laxiufculum, magnitudine pugni vel ultra. *Petioli* breviufculi, lineares, fupra plani, fubtus carinati, albi, fragiles, in caudice imbricati. *Semen* parvum oblongum, compreffum, pallidum utrinque acuminatum.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* nullus; *Sapor* debiliffime oleraceus, vix fubamaricans. *Mafticata* folia fragilia, fubfucculenta, comminuuntur: faliva fubviridefcente, *Sem. Odor & Sapor* aqueus.

COMPOSITA. *Herb. rec.* Unguentum Populeum.

LACTUCA VIROSA. L.

Lactuca Sylveftris. Ph. Wilder Lattig. Locyka lefnj neb planá.

L. Virofa. Fol. horizontalibus carina aculeatis dentatis.

Indigena. Annua.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* bi — aut tricubitalis, rectus, fimplex, rariffime, nifi interdum in locis cultis, ramofus, inferne rubellus, ceterum ex albido virens, glaber & ab infra ad unam fere tertiam aculeis tenellis obfitus. Hic *foliis* veftitur alter-

 na-

natim positis caulem amplexantibus, inferioribus (uno alterove) oblongis, integris, ex angustia sese dilatantibus denticulatis, in planta adulta, facile marcescentibus, ac deciduis; reliqua folia caulem ornantia sunt sinuato — lanciniata, venoso — reticulata, coloris glaucini, glabra, costa vero dorsali aculeata, margine spinulosa: omnia in caule plus minus ita torta, ut margo alter cœlum, alter terram quodamodo spectet; in suprema parte caulis dividitur in paniculam.

PROPRIETAS. *Odor* narcoticus, virosus, papaver, aut opium ipsum satis mentiens; *Sapor*, amaricans. Hæc planta vulnere faucia lac fundit copiosum, acre, amaricans.

LEONTONDON TARAXACUM. L.

Taraxacum. Ph. Löwenzahn, Röhrelkraut, Pfaffenröhrel. Plesska.

Leontondon. Recept. nudum. *Cal.* imbricatus squamis laxiusculis. *Pappus* plumosus.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. Herba raro.

FORMA. *Rec. Radix* cylindrica, albido — cinerea, rugis transversalibus, subannulatis, crassitie vix digiti minimi, spithamæa, subramosa, fibris capillaribus serie longitudinali simplici utrinque disposita. *Parencyma* carnosum, e tunicis congestis constans, fibra centrali rigida, tenaci, post sectionem transversalem toto disco annu-

la-

latum: annulis concentricis, puncto centrali e fibra abſciſſa; lacteſcens. *Folia* cuncta radicalia, plura congeſta, petiolata palmaria, utrinque pubeſcentia, patentia, acuta, runcinato—pinnatfida: lobis oppoſitis, confluentibus triangularibus, acutis, ſurſum excurrentibus, baſi rectis, undique dentatis, coſta tenaci, albida, teretiuſcula. *Petioli* marginati, baſi vaginato—plani, albi.

PROPRIETAS. *Rec. & ſicc. rad. Odor* nullus. *Sapor* initio obſcure dulceſcens, tum amarus. Primo vere minus americans, magis abundans ſucco melligineo; æſtate magis amaricans. *Herbæ Odor* debilis; *Sapor* amarus.

COMPOSITA. Species Decocti Antifebriles.

CICHORIUM INTYBUS. L.

Cichorium. Ph. Wegwart, Cichorie. Čekanka, ſſtěrbáčk.

Cichorium. Recept. ſubpaleaceum. *Calyx* calyculatus. *Pappus* ſub 5—dentatus, obſolete piloſus.

C. Intybus. Floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix. Herba.

FORMA. *Rec. Radix* fuſiformi—cylindrica craſſitie digiti, ſpithamæa, ſæpe pedalis, deſcendens fibrilloſa, fibrillis ſparſis; *parencimate* albo, poſt ſectionem tranſverſalem notato centro me-

dullari orbiculato, duriuſculo, ſtriato — radiato; corticali parte carnoſa, lacteſcente: lacte albo. *Folia* radicalia primi anni tenera, longius petiolata, cuneiformi — oblonga, obtuſa, ſubſucculenta, integra, ſubdentata, pollicaria vel ultra, utrinque glabra, inferne attenuata, in petiolum decurrentia. *Petioli* ſupra concavi, ſubtus convexo — teretes.

PROPRIETAS. *Rec. rad. Odor* nullus; *Sapor* intenſius amarus. *Folior. tener. Odor* nullus; *Sapor* grate amaricans; *maſticata* tenera, comminuuntur: ſaliva viridi — luteſcente.

PRÆPARATA. *Herb.* Extractum.

Infuſum ſeu ſanguis Cichorei ſimplex.

Herb. & Rad. Syrupus Cichorei cum Rheo.

COMPOSITA. *Rad.* Species Decocti Antifebriles. — Decoct Avenæ.

Herb. Species Decocti Aperitivi.

Herb & Rad. Extractum Amaricans, & hoc pro Tinctura Amaricante.

Infus. Liquor Viſceralis.

ARCTIUM LAPPA. L.

Bardana. Ph. Klette. Lupen aneb řepjk wětſſj neb hořký.

Arctium. Cal. globoſus: ſquamis apice hamis inflexis.

A. Lappa. Foliis cordatis inermibus petiolatis.

Indigeno. Perennis. Off.

Off. Radix.

Forma. *Rec. Radix.* cylindrico — fusiformis, majuscula, subpedalis, descendens, instructa fibris filiformibus, serie longitudinali, oppsita, extus fusco — cinereo, apice squamis dentatis, emarcidis. *Parencyma* album, post sectionem transversalem distinctum centro medullari orbiculato, spongioso, in annosioribus cavo.

Proprietas. *Rec. rad. Odor* vix ullus; *Sapor* debilis vix amaricans, *sicc.* in taleolas longitudinales fissa, dura, fragilis, colore sordido; *masticata* emollitur in ore, comminuitur, non ingrata.

Compositа. Species Decocti Lignorum.

* Carduus marianus. L.

Cardus Mariæ. Ph. Frauendistel. Kardus Marye, ginác ostropes.

Cardus. Cal. ovatus, imbricatus squamis spinosis, *Recept.* pilosum.

C. Marianus. Foliis amplexicaulibus hastato — pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis : spinis canaliculatis duplicato — spinosis.

Hortensis. Annuus.

Off. Semen.

Forma. *Semina* ovata, obtusa, utrinque compressiuscula, ex albido & fusco nebulosa, nitida, coronata. *Pappo* setaceo, simplici, instar penicilli. *Receptac.* carnosum, setaceum.

Proprietas. *Seminum : Odor* debilis; *Sa-*

por leniter dulcescenti — subamaricans, vix acriusculus.

* CARTHAMUS TINCTORIUS. L.

Carthamus. Ph. Saflor, Wilder Safran. Krokos, planý ssafrán.

Carthamus. Cal. ovatus, imbricatus squamis apice subovato — foliaceis.

C. Tinctorius. Foliis ovatis integris serrato — aculeatis.

Exoticus. Annuus.

Off. Flos. Semen.

FORMA. *Petala* corollæ compositæ rubra, infundibuliformia, tubo filiformi, elongato; limbo 5 — partito: laciniis linearibus, acutiusculis, erectis, binerveis nervo utrinque marginali, fusco. *Semina* alba, nitida, conica, subincurvata, subtetragona, basi latiora, apice oblique obtusa, puncto excavato ad latus apicis, magnitudine seminis Pyri Mali vel ultra, ponderosa. *Parencyma*: nucleus oleosus, intra corticem cartilagineum.

PROPRIETAS. *Sicc. Florum: Odor & Sapor* debiles. *Seminum*: *Odor* nullus; *sapor* subdulcescens; *masticata* leniter nauseosa, acriuscula. *Semina* aquæ immissa subsidunt.

OR-

ORDO.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM VULGARE. L.

Tanacetum. Ph. Reinfaren, Wurmkraut. Wrátjč.

Tanacetum. Recept. nudum. *Pappus* ſubmarginatus. *Cal.* imbricatus, hæmiſphæricus. *Cor.* radii obſoletæ, 3 — fidæ: interdum nullæ omneſque floſculi hermaphroditi.

T. Vulgare. Foliis bipinnatis inciſis ſerratis.

Indigenum. Perenne.

Off. Herba. Flores.

FORMA. *Rec. Caules* plures ex una radice erecti, teretes, ſtriato — angulati, glabri, bi vel tripedales, ſuperne ramoſi. *Rami* alterni, erecti, ſimplices, pariter ſtriato — angulati. *Folia* alterna, ſeſſilia, amplexicaulia, utrinque viridia, glabra, punctata: punctis excavatis, opacis; pinnata: pinnis ſeſſilibus, lineari — lanceolatis, inciſo — pinnatifidis, ſerratis; inferioribus ſeſſilibus, ſuperioribus in rachi communi uſque ad pinnam proximam decurrentibus; coſta plana, utrinque dentata, ſerrata. *Corymbus* terminalis, in caule & ramis, ſeſſilis, faſtigiatus. *Bracteæ* lineari — ſubulatæ, in pedunculis. CAL. communis hæmiſphæricus, glabriuſculus, luteo — virideſcens, imbricatus: ſquamis adpreſ-

pressis, lanceolatis, acutis, apice scariosis, cinerascentibus. Cor. composita convexa, lutea, subæqualis, discoidea, calyce paullo longior. *Propria* hermaphrodita, tubulata, striato — angulata; ore truncato, 5—fido, acuto, erecto; fœmineæ paucissimæ in radio, angustiores, trifidæ. Stamina singenesiæ, corolla breviora. Pist. *Germen* oblongum, glabrum, nudum. *Stylus* setaceus, corolla longior. *Stigmata* 2, revoluta. *Receptaculum* nullum.

Proprietas. *Rec. Folior. Odor* fortis, gravis, acutus; *Sapor* aromaticus, odori congruens, amarus, acutus. *Flor. rec.* & siccat. *Odor* foliis conveniens, paulo tamen gratior; *Sapor* a foliis vix ablundens, sed magis aromaticus, magis calidus.

Præparata. *Fol.* Aqua.
Oleum destillatum.

Composita. *Flor.* Pulvis contra Vermes, ex hoc Trochisci contra vermes.

Tanacetum balsamita. L.

Balsamita. Mentha Saracenica. Ph. Frauenblatt, Frauenmünze. Rjecká máta, Rjjmská ssalwěg, Matky Božj bylina, máta kaderawá.

T. Balsamita. Foliis ovatis integris serratis. Hortensis. Perennis.

Off. Folia.

Forma. *Rec. Folia* alterna, petiolata, integra, ovata, obtusa, margine undique obtuse serrata,

rata, utrinque viridia, punctata, minutim pubescentia, palmaria vel ultra, erecto — patentia; *tenera* villosa. *Petioli* foliis multo breviores, laciusculi, supra plano — concavi, subtus carinati, basi subdecurrentes.

Proprietas. *Rec. Odor* fragrans, in salviam incidens, sed longe gratior; *Sapor* amaricans, aromaticus, ab odore non abludens, calidus; *masticata* folia rec. in lingua calefaciunt, fere ut Camphora sed debilius.

Composita. Aqua Vulneraria cum Vino.

Artemisia judaica. L. (*a*)

Cina. Contra. Santonicum. Ph. Zitwersaamen, Wurmsaamen. Cyewárowé semeno.

Artemisia. Recept. subvillosum, vel nudiusculum. *Pappus* nullus. Cal. imbricatus squamis rotundatis, conniventibus. *Cor.* radii nullæ.

A. Judaica. Fruticosa, foliis obovatis obtusis lobatis parvis, floribus panniculatis pedicellatis.

Exotica. Perennis.

Off. Semen.

Forma. *Sicc. Summitates* plantæ derasæ, constantes e frustulis ramulorum & foliis plantæ, viridis, parvis, subulatis, obtusis, utrinque compressis, supra & infra linea elevata carinatis, glabriusculis, atque e capitulis parvis subaggregatis, viridulis, subrotundis, obtusis s. turbinatis, mi-

a) Bergio & Phar. Svec. Artemisia Contra. L.

minutim pubescentibus, imbricatis: squamis ovatis, obtusis, concavis, vix ciliatis, erectis, adpressiusculis; quarum inferiores sensim minores.

Proprietas. *Sicc.* *Odor* fragrans, fortis, graviusculus, subnauseosus, balsamicus, fere Chenopodii Botryos; *Sapor* odori congruens, amaricans, calidiusculus, aromaticus, inhærens; *masticata* facile comminuuntur, calent in lingua, subsequente sensu quasi frigoris.

Artemisia abrotanum. L.

Abrotanum. Ph. Gartheil, Stabwurzel, Gürtel. Brotán.

A. Abrotanum. Fruticosa, foliis setaceis ramosissimis.

Hortense. Suffrutex.

Off. Folia.

Forma. *Rec.* *Folia* sparsa, petiolata, utrinque punctata, minutim lanuginosa, duplicato — pinnatifida, laciniis lineari — angustis, elongatis, obtusis, integerrimis, supra bisulcatis, subtus obsolete carinatis; *ramea* simpliciora, longius petiolata. *Petioli* lineares supra plani, bisulcati, subtus convexiusculi. Axillæ omnes foliorum fœcundæ ramulis & eorum rudimentis.

Proprietas. *Rec.* *Odor* fragrans, validior, subtemulentans, gratus; *Sapor* aromaticus, odori congruens, amaricans, calidiusculus.

Præparata. Conserva.

Composita. Unguentum Carminativum.

ARTEMISIA PONTICA. L.

Abſinthium Ponticum. Ph. Römiſcher Wermuth. Pelyněk Rzjmſký.

A. Pontica. Foliis multipartitis, tomentoſis, floribus ſubrotundis nutantibus: receptaculo nudo.

Hortenſe. Perenne.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caules* plures ex una radice, teretes minutim angulati, pedales, ſuperne pubeſcentes, ramuloſi. *Rami* alterni, breviuſculi, axillares e foliis patentes. *Folia* alterna petiolata, plana, ſupra minutim villoſa, virideſcentia, obſolete punctata, ſubtus cinerea, minutim tomentoſa, pollicaria vel ultra, duplicato—pinnatifida: laciniis lineari—ſubulatis, acutiuſculis, ſimplicibus vel dentatis; *ſuperiora* trifida. *Petioli* foliis breviores, ſupra canaliculati. *Stipulæ* loco foliola 2, oppoſita, pinnatifida, laciniis ſubulatis, petiolo breviora, erecta.

PROPRIETAS. *Rec. & Sicc. Odor* fere Abrotoni, ſed gravior, in Abſinthium vulgare incidens, verum gratior; *Sapor* aromaticus, calidiuſculus, in Tanacetum incidens, amarus; *maſticata* folia recentia debilius calent in ore & faucibus, ſaliva virideſcente.

COMPOSITA. *Herb.* Aqua Carminativa Communis & Regia.

Sumit. Acetum Antiſepticum.

ARTEMISIA ABSINTHIUM. L.

Abſinthium Vulgare. Ph. Gemeiner Wermuth Pelyněk obecnj.

A. Abſinthium. Foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pedunculis: receptaculo villoſo. Indigenum. Perenne.

Off. Herba etiam recens, atque Summitates & Herba cum floribus.

FORMA. *Rec. Caulis* erectus, bipedalis, teres, villoſus, albidus, ſtriato — angulatus, paniculatim ramoſus. *Rami* ſparſi, axillares e foliis, ſimplices, ſtriati, ſuperiores breviores. *Folia* alterna, petiolata, plana, minutim punctata, & villoſa, mollia, pinnatifida: pinnis alternis cuneiformibus, pinnatifidis: laciniis linearibus, obtuſiuſculis; *ſumma* ſeſſilia, cuneiformia, trilobata; *ſuprema* integra, lineari — lanceolata. *Racemi* florum terminales in rimis, compoſiti, folioſi, ſecundi, virgati, floribus pedicellatis, nutantibus magnitudine ſeminis Cannabis. *Bracteæ* lineari — ſubulatæ, ad pedicellos. CAL. communis ſubgloboſus; imbricatus: ſquamis exterioribus, ſubulatis, obtuſis, ſuperne concaviuſculis, tomentoſis, paucioribus, interioribus ovatis, ſcarioſis, ferrugineis, carina villoſis, adpreſſiuſculis. COR. compoſita convexiuſcula, calyce paullo longior, ferrugineo luteſcens; *propria diſci* hermaphrodita, tubuloſa, ore 5 — fido; *radii* fœminea, ſubulata,

ulata, obtuſa. STAM. *Filam.* 5, capillaria. *Anth.* tubuloſa, corolla brevior. PIST. utriſque. *Germen.* obovatum, glabrum, nudum. *Stylus* ſubulatus, corolla paullo longior. *Stigm.* 2, patentia; diſci linearia, truncata, radii ſubulata. *Receptac.* villoſum.

PROPRIETAS. *Rec.* & *ſicc.* *Odor* fortis, fragrans, graviuſculus, temulentans; *Sapor* intenſius amarus.

PRÆPARATA. Extractum.
Oleum Coctum.
Herb. c. Flor. Oleum deſtillatum.
Sal Abſinthii Alcalinus. — Medius.
Conſerva? (*d*)

COMPOSITA. *Herb.* Emplaſtrum de Meliloto.
Eſſentia Abſinthii Compoſita.
Herb. rec. Oleum Colocynthidis ſive Habacuc.
Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.
Unguentum Carminativum.
Summit. Acetum Antiſepticum.
Extract. Elixirium Stomachicum Temperatum.
Pilulæ Barſamicæ Stahlii.

ARTEMISIA VULGARIS. L.
Artemiſia. Ph. Beyfuß. Czernobyl. *A.*

u) Juxta Præcepta chyrurgica.

A. Vulgaris. Foliis pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

Forma. *Rec. Caulis* erectus, bi — vel tripedalis; teres, striato — angulatus, lanuginosus, ramosus. *Rami* virgati, simplices, striati, pubescentes, erecto — patentes; inferiores sensim minores. *Folia* plana, alterna, sessilia, bipollicaria, superne viridia, glabra, lineata, subtus tomentosa, cinerea, pinnatifida: lobis suboppositis, lanceolatis, acutis, pinnatifidis: laciniis lineari — lanceolatis, acutiusculis, subdentatis; lobis inferioribus integris; infimis lunulatis, stipulæ loco circum caulem reflexis.

Proprietas. *Rec. fol. Odor* subfragrans, subrancidus; *Sapor* herbaceus, vix amaricans; *masticata* folia tenacia, saliva viridi.

Compositа. Aqua Vulneraria cum Aceto & cum Vino.

Tussilago Farfara. L.

Farfara. Tussilago. Ph. Huflattig. Bonské Kopyto.

Tussilago. Recept. nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* squamæ æquales, discum æquales, submembranaceæ.

T. Farfara. Scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis, In-

Indigena. Perennis.

Off. Herba. Flores.

Forma. *Scapi* vernales, radicales, plures ex una radice, erecti, simplices, subspithamæi teretiusculi, undique angulati, pubescentes, uniflori, squammosi: *squamis* sparsis, membranaceis, viridescentibus, lanceolatis, concavis, obtusiusculis, subpatentibus, glabris. *Folia* post florem, æstivalia, radicalia cuncta, longius petiolata, subrotundo — cordata, margine undique obsolete lobata, denticulata: denticulis subpurpurascentibus, spithamæa, vel ultra, plana, patentia, supra glabra, venosa, subtus tomentosa, cinerea. *Petioli* teretes, supra plani, tomento raro adspersi. Cal. communis cylindricus, undique sulcatus, pubescens, utrinque trucatus, basi tumidiusculus, multipartitus: segmentis linearibus, parallelis, subæqualibus, convexis, marginibus membranaceis inflexis apice pariter membranaceo, explanato, erecto obtuso. Cor. composita radiata, lutea, calycis longitudine. *Radius* fœmineus, multiflorus, corollis linearibus, angustis. *Discus* hermaphroditus, corollis infundibuliformibus, tubo filiformi, elongato, limbo subdiaphano, campanulato, 5 — fido, revoluto. Stam. syngenesiæ, corolla paullo longiora. Pist. *Germ.* utrisque cylindricum, coronatum *Pappo* piloso. *Styl.* cylindricus, fœmineis elongatus. *Stigma* hermaphrod.

sim-

ſimplex; fœmineis 2, acuta. *Receptaculum* nullum.

PROPRIETAS. *Rec. Folior. Odor* debilis; *Sapor* amaricans; *maſticata* folia lubriuſcula. *Flor. rec. Odor* debilis; *ſapor* amaricans, ſubgraviuſculus.

COMPOSITA. Species pro Thee Germanico.

* TUSSILAGO PETASITES. L.

Petaſites. Ph. **Peſtilenzwurzel. Dewéſyl, wětſſj konſké kopyto.**

T. Petaſites. Thyrſo ovato, floſculis fœmineis nudis paucis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix* vivax, majuſcula, craſſitie digiti, longa, deſcendens, nudiuſcula, glabra, apice incraſſata, ovata, fibris plurimis filiformibus, deſcendentibus, e capite radicis exeuntibus. *Parencyma* carnoſum, poſt tranſverſalem ſectionem notatum diſco medullari, orbiculato, cincto annulo compoſito e punctis geminis, oblongis.

PROPRIETAS. *Rec. Radic. Odor* gravis; *Sapor* ingratus, amaricans, leniter ſtipticus.

SOLIDAGO VIRGAUREA. L.

Conſolida Saracenica. Virga aurea. Ph. **Heydniſch Wundkraut. Swálnjk proſtředný, wyſoký trank.**

Soli-

Solidago. Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Cor.* radii circiter 5. Cal. ſquamæ imbricato clauſæ.

S. Virgaurea. Caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

Forma. *Rec. Caulis* erectus, pedalis vel ultra, ſimplex vel ramoſus, ſtriato—angulatus, glaber. *Folia* alterna, ovali—oblonga, acuta, argute ſerrata, minutim ciliata, venoſa, utrinque glabriuſcula, ſupra adſperſa atomis cinereis, bipollicaria; inferiora caulina petiolata, ſuperiora ſpathulata, ſumma ſeſſilia, ovato—lanceolata, utrinque attenuata, integerrima; radicalia, h. e. folia primi anni novi ſurculi, longe majora, palmaria vel ultra, longius petiolata: petiolo profunde canaliculato.

Proprietas. *Rec. Odor* debilis, aromaticus; *ſicc.* fortior. *Sapor* amaricans, calidiuſculus.

Composita. Aqua Vulneraria cum Aceto & cum Vino.

Inula helenium. L.

Enula. Ph. Alant. Woman.

Inula. Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Antheræ.* baſi in ſetas duas deſinentes.

I. Helenium. Foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis.

Hortenſis. Perennis.

Off. Radix.

Forma. *Rec. Radix* alba, majuſcula, ſuperne ramoſa : ramis teretibus, breviuſculis ; undique obſeſſa fibris filiformibus, albis. *Parencyma* carnoſum, tranverſaliter ſectum centro medullari albo, uniformi, circumdato annulo punctato, peripheria incarnata, ſtriis radiata.

Proprietas. *Rec. Odor* gravis calidiuſculus; *Sapor* amarus, ingratus, in Acorum incidens, diu inhærens ; *maſticata* comminuitur, linguam fauceſque leniter calefaciens.

Præparata. Eſſentia.
Extractum.

Composita. *Rad.* Elixirium Salutis.
Pulvis Vitæ.
Extract. Emplaſtrum Diabotanon.

Arnica montana. L.

Arnica. Ph. Wolverley, Engeltrank. Angelſky trank.

Arnica. Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Corollulæ* radii filamentis 5 abſque antheris.

A. Montana. Foliis ovatis integris: caulinis geminis oppoſitis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix. Herba. Flores.

Forma. *Radix rec.* calamum aut etiam minimum ferme digitum interdum craſſa, inæqualis, horizontaliter aut oblique excurrens, fibris

pluribus deorſum tendentibus terræ affixa, extus
ſpadicea, intus albida. *Rec. Caulis* teretiuſculus,
ſubnudus, undique ſtriatus, pubeſcenti — ſcaber,
erectus, pedalis, ſimplex vel ſubdiviſus : ramis
binis, oppoſitis, ſimplicibus, erectis, nudiuſ-
culis, elongatis, unifloris. *Folia* radicalia plu-
ra, ovato — lanceolata, obtuſiuſcula, ſeſſilia vel
inferne attenuata in petiolos lineares, palmaria,
integerrima, margine minutim ciliata, ſupra
ſcabriuſcula, ſubtus glabra, trinervia; *caulina*
pauca, minora, alterna, lineari - lanceolata,
ſeſſilia, ad ramificationem vero oppoſita. *Flo-
res* terminales, ſolitarii, pedunculati, erecti.
Cal. communis imbricans, ſimplici ſerie : folio-
lis lineari — lanceolatis, acutis, æqualibus, pubeſ-
centibus, erectis. Cor. compoſita radiata, *propria
radii* lingulata, lanceolata, calyce triplo longior,
patens, picta nervis longitudinalibus, parallelis,
apice truncata, tridentata; *diſci* infundibuliformis,
tubo cylindrico, pubeſcente, limbo cylindrico,
glabro, quinquefido, laciniis revolutis, acutis
ſcabridis. Stam. *diſci : Filam.* 5, capillaria, mi-
minuta; *Anth.* cylindrica, corolla longior, ore 5
— fido; *radii Filam.* 5, tubo corollæ inſerta, ſte-
rilia, abſque anthera. Pist. utrinque. *Germ.* ſub-
ulatum, undique longitudinaliter ſtriato — angu-
latum, ſcabrum, coronatum pappo. *Styl.* ſeta-
ceus, ſtaminibus longior. *Stigm.* 2, ſubulato, ſpi-
raliter revoluta,

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* debilior; *rec.* graveolens, ſternutationem movens; *Sapor* herbaceus, acris. Folia ſiccata fragiliuſcula; inter manus confricata & olfacta ſternutationem excitant.

PRÆPARATA. Extractum Florum & Herbæ. Syrupus Florum.

DORONICUM PARDALIANCHES. L.

Doronicum. Ph. Gänswurzel. Doronykum, kamzykowý kořen.

Doronicum. Recept. nudum. *Pappus* ſimplex. *Cal.* ſquamæ duplicis ordinis æquales, diſco longiores. *Sem.* radii nuda pappoque deſtituta.

D. Pardalianches. Folii cordatis obtuſis denticulatis: radicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus.

Indigenum. Perenne.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix* tuberoſa, ovata, vix pollicaris, alba, glabra, rugis annularibus, ciliatis; *parencymate* carnoſo, albo, poſt ſectionem tranſverſalem notato diſco æquali, annulo concentrico prope peripheriam, e punctis diſcretis ſerie annulari diſpoſitis. *Siccata* dura, fragiliuſcula. (*a*)

PROPRIETAS. *Rec. Odor* debilis, aromaticus in ſemen Nigellæ incidens; *Sapor* dulceſcens, gratus.

BEL-

a) Hæc olim dicebatur Doronici Romani radix, a qua radix Doronici Longi ſic dicti in alpinis ſub nomine Gemſenwurzel cogniti ut plurimum differt.

Bellis perennis. L. (a)

Bellis Minor. Ph. Gänseblümel, Maßlieben, Rückerl. Sedmikráſa, matečnjk menſſj.

Bellis. *Recept.* nudum, conicum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemiſphericus; ſquamis æqualibus. *Sem.* ovatum.

B. *Perennis.* Scapo nudo.

Hortenſis. Perennis.

Off. Herba. Flores. (*b*)

Forma. *Folia* radicalia in circulum expanſa, petiolo longo, folioſo, ipſo folio fere ovato, circum crenato, ſirmulo, ſubhirſuto. Scapus nudus uniflorus, dodrantalis. *Flores rec.* ſolitarii, pedunculati, pleni. Cal. communis polyphyllus: foliolis ovali—linearibus, obtuſis, ciliatis, apice barbatis, viridibus, glabris, ſimplici ſerie imbricatis, erectis. Cor. compoſita, rubro—incarnata, plena: corollis lingulatis, cuneiformibus, retuſis, bi vel tripartitis, baſi tubuloſis, tubo pubeſcenti, brevi. Stam. nulla. Pist. *Germ.* ovatum, compreſſum, glabrum. *Styl.* cylindricus, longitudine tubi, albidus. *Stigm.* bifidum, acutum, luteſcens. R*ecept.* nudum.

Proprietas. R*ec.* *Odor* nullus; *Sapor* vix ullus.

Matricaria parthenium. L.

a) Bergio Bellis Arvenſis.

b) Pro ſuccis herbarum etiam recens adhibetur.

Matricaria. Ph. Mutterkraut. Matečnjk, Řjm. baba.

Matricaria. Recept. nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus: marginalibus solidis, acutiusculis.

M Parthenium. Foliis compositis planis: foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis.

Hortensis. Perennis.

Off. Herba. Flores.

Forma. Rec. *Caulis* teres, erectus, undique striato — angulatus, glaber, bipedalis, virgatim ramosus. *Rami* alterni, striato — angulati, erecti minutim pubescentes. *Folia* alterna, ad ramos, petiolata, plana, utrinque glabra, undique adspersa punctis parvis, excavatis, frequentibus; pinnatifida: pinnis suboppositis, ovato — oblongis, pinnatifidis, inciso — serratis. *Petioli* subtriquetri. *Corymbus* terminalis in ramis, erectus, inferne foliosus, pedunculis elongatis, sulcato — angulatis, pubescentibus. *Bracteæ* lineares, angustæ, ad basim pedunculorum, & in ipsis pedunculis, solitariæ. Cal. communis, hemisphæricus, sulcatus, cinereus, arcte imbricatus: squamis parvis linearibus, convexo — carinatis, margine membranaceis, subciliatis, apice scariosis, adpressis. Cor. composita, radiata. *Discus* luteus, hemisphæricus, hermaphroditus. *Radius* albus, deflexus, hermaphroditus, *Propria disci* tubulosa, angu-

gulata, ſcabriuſcula, incurvata, calyce paullo longior, ore 5 — fido; *radii*, ligulata, ovali orbiculata, apice retuſa, tridentata, ſupra glabra, carinata, longitudine calycis, ſubtus rugoſa, tubo breviuſculo, utrinque marginato. STAM. *Diſc*. *Filam*. 5, capillaria; *Anthera* tubulata. PISTIL. utriſque. *Germ*. oblongum, ſtriato — angulatum, glabrum, nudum, *Stilus* filiformis, ſtaminibus paullo longior. *Stigm*. 2, acuta, revoluta. *Semina* oblonga, angulata, nuda. *Receptac*. nudum.

PROPRIETAS. Totius herbæ *Odor* fragrans, validus, graviuſculus, in Chamomillam & Tanacetum incidens; ſed florum odor fortior; *Sapor* amaricans, aromaticus, odori congruens, calidiuſculus, præcipue florum.

PRÆPARATA. *Fol*. Aqua.

COMPOSITA. *Herb*. Aqua hyſterica fœtida.

MATRICARIA CHAMOMILLA. L.

Chamomilla vulgaris. Ph. **Gemeine Chamille.** **Rmen aneb heřmánek.**

M. Chamomilla. Receptaculis conicis, radiis patentibus, ſeminibus nudis, ſquamis calycinis margine æqualibus.

Indigena. Annua.

Off. Flores.

FORMA. *Rec*. *Flores* terminales, ſubpaniculati; pedunculati: pedunculis ſtriatis, nudis, unifloris. CAL. communis hemiſphæricus, arcte imbrica-

catus: ſquamis lineari—oblongis, obtuſis, apice acutis membrana ſcarioſa. COR. compoſita, radiata; *Diſcus* hermaphroditus, luteus, conico—hemiſphæricus. *Radius* fœmineus, reflexus, albus. *Propria diſci*: tubulata, infundibuliformis, tubo craſſiore membranaceo, rugoſo, ore 5—fido; *radii* ligulata, lineari ſubcuneiformis, obtuſa, retuſa, tridentata STAM. ſyngeneſiæ. PIST. utriſque. *Germ.* oblongum, nudum. *Styl.* breviuſculus. *Stigm.* 2, revoluta. *Receptac.* nudum.

PROPRIETAS. *Rec. florum.* *Odor* fragrans, gratus, fortior; *Sapor* aromaticus, calidiuſculus; *ſicc.* conſimilis.

PRÆPARATA. Aqua.
Oleum Coctum.—Deſtillatum.—Infuſum.
Syrupus.

COMPOSITA. *Flor.* Aqua Vulneraria cum aceto.
Emplaſtrum de Meliloto.
Species Emollientes.
Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.
Unguentum Carminativum.—Nervinum.
Ol. inf. Emplaſtrum Diachylon cum Gummatibus.—de Meliloto.—ad Rupturas.

AN-

ANTHEMIS NOBILIS. L.
Chamomilla Romana. Ph. Römische Chamille.
Rmen aneb heřmánek Ržjmský.

Anthemis. Recept. paleaceum. *Pappus* nullus. *Calyx* hemiſphæricus, ſubæqualis. *Floſculi* radii plures quam 5.

A. Nobilis. Foliis pinnato — compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis.

Hortenſis. Perennis.

Off. Flores.

FORMA. *Rec. Flores* pedunculati, ſæpe pleni. CAL. communis hemiſphæricus, minutim lanuginoſus, undique ſulcatus, imbricatus; ſquamis linearibus, adpreſſis; inferioribus acutis, margine ſcarioſis; ſuperioribus paullo majoribus, pariter apice ſcarioſis, obtuſo — rotundatis. COR. compoſita, radiata. *Radius* fœmineus, albus, calyce duplo longior, corollis ligulatis, linearibus, obtuſis, crena duplici emarginatis, patentibus. *Diſcus* luteus, hermaphroditus, corollis infundibuliformibus, ore crenato. STAM. ſyngeneſiæ, corolla breviora. PIST. utriſque. *Germ.* lineare, nudum. *Styl.* ſubbulatus. *Stigm.* 2, acuta reflexa. *Receptac.* paleaceum, paleis ſcarioſis, linearibus, concaviuſculis, obtuſis, floribus brevioribus.

PROPRIETAS. *Rec. & ſicc. Odor* fragrans, fortis, balſamicus, gratus, cephalicus, in Chenopodium Botrytidem incidens; *Sapor* odori congruens, amaricans, calidiuſculus. COM-

COMPOSITA. Aqua Carminativa Communis & Regia.

Essentia Carminativa.

ANTHEMIS PIRETRUM. L.

Pyretrum. Ph. Bertram. Peltrám.

A. Piretrum. Caulibus simplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato — multifidis. Exotico. Perenne.

Off. Radix. (*a*)

FORMA. *Rec. Radix* descendens, digitalis vel ultra, crassitie pennæ anserinæ, sæpe cygneæ, cylindrica, recta, vix flexuosa, extus longitudinaliter rugosa, fusco -- cinerea, fibrillis capillaribus, sparsis, apice setis & petiolis resectis (in siccata) terminata. *Parencyma* album, subcarnosum, post sectionem transversalem notatum centro medullari orbiculato, stellato, radiis obsoletis; siccatæ durum, fragile.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* vix ullus. *Sapor* peculiaris, acidus, acris, inhærens; *masticata* dura, comminuitur, acida primum, dein acris, pungens, linguæ labiisque inhærens, salivam copiosam alliciens, postea fauces irritans; recentis sapor mitior.

ACHILLEA MILLEFOLIUM. L.

Millefolium. Ph. Schaafgarbe. Rzebřjček.

Achi-

a) Apud nos fere semper substituitur radix Artemisiæ Dracuuculi,

Achillea. *Recept.* palleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* ovatus, imbricatus. *Flosculi* radii circiter 4.

A. Millefolium. Foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis. Indigeno — Perennis.

Off. Herba. (a) Flores albi & rubri.

FORMA. *Rec.* *Caulis* erectus, pedalis, teretiuſculus, ſtriatus, ſubangulatus, lanuginoſus, ſimplex, ſuperne parce ramoſus. *Folia* ſeſſilia, amplexicaulia, lineari — lanceolata, alterna, pinnata: pinnulis obovatis, oppoſitis, bipinnatifidis, acutis, obliquis, ſupra minutim pubeſcentibus, ſubtus lanuginoſis; inferiora petiolata: petiolis membranaceis, ſubvaginatis. *Corymbus* florum terminalis, faſtigiatus, lanuginoſus. *Bracteæ* lineares, pinnatifidæ vel integræ, pubeſcentes parviuſculæ, ad ramos corymbi & pedunculos. CAL. communis ovatus, pubeſcens, arcte imbricatus: ſquamis ovalibus, concavis, pubeſcentibus, obtuſiuſculis, ſuperne margine ciliatis. COR. compoſita, radiata: *Diſcus* 12—florus, longitudine calycis hermaphroditus albus. Radius 5 — florus albus, fœmineus, laxe imbricatus. *Propria diſci* tubulata, infundibuliformis, tubo ſordide luteſcente, limbo ſubdiaphano, campanulato, albido, 5 — fido: laciniis ovato — acutis, revolutis; *Radii* ligulata, tubo cylindrico, viriдeſcente, ſtriato, ſubpubeſcente, longitudine calycis. STAM. ſyngeneſiæ,

a) Herbæ recentis uſus etiam ad ſuccos herbarum.

corolla paullo longiora, filamentis albis, anthera lutea. Pist. utrisque. *Germ.* oblongum, compressiusculum, subtetragonum, album, nudum, glabrum. *Styl.* capillaris, staminibus longior. *Stigm.* 2, linearia, truncata, patentia. *Receptac.* paleaceum: paleis teneris, membranaceis, oblongis, floribus brevioribus.

Proprietas. *Rec. Folior.* *Odor* debilior, in odorem mucronis incidens; *Sapor* consimilis, amaricans. *Florum*: *Odor* foliorum, verum longe gravior; *Sapor* amaricans, subcalidiusculus, leniter aromaticus; *sicc.* sapor consimilis, leniter acriusculus.

ORDO

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

CENTAUREA CYANUS. L.

Cyanus. Ph. Blaue Kornblumen. Chrpa, modrák.

Centaurea. *Recept.* setosum. *Pappus* simplex. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares.

C. Cyanus. Calycibus serratis: foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis.

Indigena. Annua.

Off.

Off. Flores. (*a*)

Forma. *Rec. flores* in ramis terminales, solitarii, pedunculati, erecti Cal. communis ovatus, cinereus, tomentosus, undique imbricatus: squamis adpressis; inferioribus minoribus ovatis, acutis, margine undique serratis: serraturis membranaceis, albidis, acutis, apice fuscis; superioribus sensim longioribus, apice duntaxat serratis, obtusis; supræmis linearibus, pariter obtusis, minutim serratis. Cor. composita radiata, pulcerrime dilute cœrulea. *Discus* hermaphroditus, Calyce duplo longior. *Radius* sterilis. *Propria* disci: tubulata, tubo cylindrico, albo, longitudine calycis; limbo cernuo, cœruleo, 5—angulari: angulis 5 gibbosis; 5—fidus: laciniis linearibus, angustis, obtusiusculis, tubo longioribus, erectis; *Radii* infundibuliformis, tubo filiformi, calyce longiore, inferne albo, superne cœruleo, inæquali, circiter 8—fido: laciniis 5 exterioribus altioribus lanceolatis, acutis, patentibus; 3 interioribus, longe minoribus, profundius divisis, superne serratis. Stam. *Filam.* 5, alba, tubo paullo longiora, apice barbata. *Anthera* tubulata, cylindrica, saturate cœrulea, corolla paullo longior. Pist. *hermaphro. Germen* obovatum, album, minutim pubescens, compressiusculum, coronatum *Pappo* simplici, sessili, albo, longitudine

a) Radii steriles.

dine fere ſtaminum, ſuperne cœruleſcens. *Stigm.* 2, cœrulea, erecta. *Fœmineis: Germ.* obſoletum. *Recept.* ſetoſum: ſetis paleaceis, anguſtiſſimis, albis.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* remiſior, parum gratus; *Sapor* vix amaricans; *maſticati* ſalivam violaceo colore tingunt. Flores recentes in papyro fricati, maculam relinguunt dilute cœruleam.

COMPOSITA. Pulvis fumalis ordinarius. — Sternutatorius variegatus.

CENTAUREA BENEDICTA. L.

Cardus Benedictus. Ph. Kardus Benedikt. Kardbenedykt, Kardus neb bodlák požehnaný, přimětnjk Wlaſký, kráſowláſek.

C. Benedicta. Calycibus duplicato — ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato — ſpinoſis.

Hortenſis. Annua.

Off. Herba. Semen.

FORMA. *Rec. Caulis* ſubbipedalis, erectus, teretiuſculus, ſulcato — angulatus, hiſpidus, ſuperne ramoſus. *Rami* ſparſi, ſulcato — angulati erecti, ſuperne brevius ramoſi. *Folia* ſpithamæa, obtuſa rugoſa, hiſpido — ſcabra, ſubtus reticulatim venoſa, runcinata: lobis oppoſitis, oblongis, obtuſis cum mucrone, margine ciliatis, denticulato — aculeatis, inferiora petiolata; ſuperiora ſeſſilia, erecta. *Sem.* oblongum, leviter incurvum,

vum, basi ad latus exsectum, striatum, supra margine serrato coronatum, cortice griseo vestitum, intra quem medulla alba.

PROPRIETAS. *Rec*. *Odor* nullus; *Sapor* foliorum intense amarus, non nauseosus inhærens.

PRÆPARATA. Conserva.

Extractum.

Sal medius.

COMPOSITA. *Herb*. Essentia Absinthii composita.

Extractum amaricans.

Oleum Viride.

Pulvis Vitæ.

Species Decocti Antifebriles.

Extract. Elixirium Stomachicum temperatum.

Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

ORDO
POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDULA OFFICINALIS. L.
Calendula. Ph. Ringelblume. Měsýček.
Calendula. *Recept*. nudum. *Pappus* nullus. *Cal*. polyphyllus æqualis. *Sem*. disci membranacea.

C.

C, Officinalis. Seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis, omnibus.
Hortensis. Annua.
Off. Flores.

FORMA. *Rec. Flores* solitarii, pedunculati, nudi, erecti. CALYX communis polyphyllus, pubescens, simplici serie imbricatus, squamis linearibus, acutis, apice fuscis, erectis, extus convexis, intus concavis, subæqualibus, laxiusculis. COR. composita fulva, radiata. *Discus* hermaphroditus, longitudine calycis; radius fœmineus, patens,(inculta) 20—florus, imbricatus; *Propria* disci: infundibuliformis, tubo brevi, pubescente, limbo turbinato, glabro, 5 — fido: laciniis ovato — acutis, margine undique incrassato, erectis; *radii*: ligulata. obverse lanceolata, plana, striata, calyce duplo longior, basi tubulata, pubescens, apice obtuso. STAM. syngenesiæ, lutea, corollæ circiter longitudine. PIST. disci: *Germen* cylindricum. *Stylus* cilindricus, corolla paullo longior. *Stigma* simplex capitatum, luteum. Radii: *Germen* subcylindricum, incurvum, villosum. *Stylus* cylindricus, longitudine tubuli radii. *Stigm.* 2, linearia, acuta revoluta. *Receptac.* nudum.

PROPRIETAS. *Rec. Florum. Odor* suaviter subnarcoticus; *Sapor* leniter acidulus, saliva lutescente; *sicc.* odor vix ullus, nec sapor.

COM-

Composita. Fulvis Fumalis ordinarius. — Sternutatorius variegatus.

Unguentum Balſamicum.

ORDO.

MONOGAMIA.

VIOLA ODÓRATA. L.

Viola. Ph. Blaue Veilchen, Veigel, Fiola woná neb modrá.

Viola. *Cal.* 5 — phyllus. *Cor.* 5 — petala, irregularis, poſtice cornuta. *Caps.* ſupera, 3 — valvis, unilocularis.

V. Odorata. Acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus.

Indigena. Perennis.

Off. Herba. Flores. Semen.

Forma. *Rec.* *Folia* omnia radicalia, petiolata, patentia, cordata, obtuſa, margine crenata, minutim ciliata, ſupra glabra, nervis & venis arcuatis lineata, ſubtus nervis pubeſcentia, pollicaria vel ultra. *Petioli* erecti, pubeſcentes, ſubtus convexi, ſupra plano — canaliculati, foliis longiores: *Stipulæ* 2. radicales, membranaceæ, lanceolatæ, acutæ, ſerrato — ciliatæ. *Caulis* nullus. *Sto-*

 lones

lones palmares, procumbentes, teretes, palide viridescentes, foliosi. *Pedunculi* radicales, filiformes, pubescentes, purpurascentes, hinc convexi, inde sulcati, foliis breviores, uniflori. *Bracteæ* 2, lineares, opposit æ in medio pedunculi. *Flores* nutantes. CAL. *Perianth.* 5—phyllum, foliolis adnatis, ovali—linearibus, obtusis, glabris, sed atomis elevatis adspersis, viridi—fuscescentibus, erectis, 2 utrinque lateralibus, imbricatis, unico superiore. COR. violacea, 5 petala, calyce duplo longior, irregularis, petalis obovatis, obtuso—rotundatis, subæqualibus, basi unguiculatis, albicantibus, subbarbatis; quarum 2 superiora reflexa sursum spectantia; lateralia 2 opposita, patentia; infimo deorsum spectante, versus basim striis fuscis, subparallelis picto, & callis 2 linearibus concavitatem includentibus, instructo, pone cornuto: cornu conico, obtuso, incurvato, intra folia calycina prominente. STAM. *Filam.* vix ulla. *Antheræ* 5, pallidæ, conniventes, subtetragonæ, in medio sulcatæ, latere utrinque hiantes, apice acutæ, squama ovato—oblonga, obtusa, lutescente, erecta; harum antherarum duæ basi excurrunt in apendices 2 subulatas, incurvas, compressas, cornu intrusas. PIST. *Germ.* superum, conicum, subangulatum, pubescens. *Stylus* obverse subulatus, glaber, apice hamatus. *Stigma* laterale, subulatum, obtusum, terminatum

seta

ſeta pubeſcente, molli. *Capſula* ovata, obutuſa, dilute pubeſcens, ſexangularis : angulis 3 alternis, incraſſatis, rotundatis, 3 alternis parvis ; unilocularis, trivalvis. *Semina* plura, obovata, obtuſa, glabra, trifariam longitudinaliter diſpoſita, pedunculata.

PROPRIETAS. *Rec. folior.* *Odor* vix ullus. *Sapor* herbaceus, maſticata mucilaginoſa. *Flor.* *Odor* ſvaveolens, Iridis florentinæ ; *Sapor* debilis, violaceus, ; *maſticati* teneri, ſaliva violacea. *Sicc.* inodori.

PRÆPARATA. *Flor.* Syrupus.

COMPOSITA. *Herb.* Unguentum Populeum. *Syrup.* Pilulæ de Cynogloſſo.

VIOLA IPECACUANHA. L. (*a*)

Ipecacuanha. Ph. Hypoakanna, Brechwurzel. Hypekakoána, dawić.

V. Ipecacuanha. Foliis ovalibus margine ſubtuſque piloſis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Radix ſicc.* cylindrica, digitalis vel ultra, craſſitiæ pennæ anſerinæ, cinerea, rurſum prorſum flexa, annulis ſ. rugis toruloſis tranſverſalibus, approximatis ; *parencymate* reſinoſo, brunneo, fragili, fibra lignea centrali, longitudinali.

t 2 PRO-

(*a*) Hæc ſpecies ſuppeditat Svecis Ipecacuanhæ albæ radicem dum LONICERA caule procumbente repente foliis obverſe ovatis, acutis ſcabris, dat radicem Ipecacuanhæ.

Proprietas. *Sicc. Odor* graviuſculus, ſubnauſeoſus. *Sapor* amaricans, graviuculus; *maſticata* radix acriuſcula, faucibus inhærens. Inter pulverandum orti cricum circa pulviſculi ſtimulant in naſo, & ſternutationem cient, pulmonibus etiam moleſti.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

ORDO DIANDRIA.

Orchis morio. L.

Salep. Satyrium. Ph. Salapwurzel. Wſtawač králowſký.

Orchis. Nectarium corniformæ pone florem.

O. Morio. Bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis coniventibus.

Indigenum & Exoticum. Perenne.

Off. Radix variarum Orchidis ſpecierum.

Forma. *Rec. Bulbus* ovatus, magnitudine nuclei Perſici, ſæpe etiam Amygdalæ, undique al-

albus; *parencymate* albo, minutim ſpongioſo; *ſiccat.* extus cinereus, minutim rugoſus; *parencymate* faciei corneæ.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* hircinus; *Sapor* vix ullus: bulbus *maſticatus* tener, mucilaginoſus, fere inſipidus, inter dentes crepulus, ſolvitur uſquequoque, ſaliva mucilaginoſa.

* EPIDENTRON VANILLA. L.

Vanilla. Ph. Wanille, Vanilie. Wanylie.

Epidentron. Nectarium turbinatum, obliquum reflexum.

E. Vanilla. Scandens, fol. ovato — oblongis nervoſis ſeſſilibus, caulinis, cirrhis ſpiralibus.

Exotica. Frutex Paraſiticus.

Off. Siliqua. (*a*)

FORMA. *Sicc. Siliqua* dodrantalis, craſſitie pennæ cygneæ, recta, cylindrica, compreſſiuſcula, fuſco — brunea, longitudinaliter undique rugoſa (hic a ſiccatione) lucidiuſcula, flexilis, unilocularis, apice cernuo obtuſo — truncata, baſi ſenſim paullulum anguſtata, incurvata; *parencymate* carnoſo — coriaceo, pinguiuſculo, centro longitudinaliter cavo, repleto paſta molli, pingui, nigra, e ſeminibus condenſatis conſtante. *Semina* tantum non innumera, minutiſſima, ſubrotunda, nigra, ſplendentia.

PROPRIETAS. *Odor* perquam fragrans, inhæreus,

t 3

a) An in alium uſum quam pro cl[illegible]?

rens, exacte Balſami Peruviani. *Sapor* aromaticus, validus, ſubdulceſcens, ab odore non abludens, calidiuſculus, balſamicus, gratus; *maſticata* ſiliqua coriaceo mollis, tenaciuſcula, emollitur, tardius comminuitur.

ORDO
HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA. L.

Serpentaria Virginica. Ph. Virginische Schlangenwurzel. Hadj kořen, hadj ged hogicý kořen.

Ariſtolichia. *Cal.* o. *Cor.* 1 — petala, lingulata, integra. *Caps.* 6 — locularis, infera.

A. Serpentaria. Folis cordato — oblongis planis, caulibus infirmis, flexuoſis teretibus, flor. ſolitariis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix. (*a*)

FORMA. *Sicc.* *Radix* fibroſa, deſcendens, bipollicaris, vix palmaris, ferruginea: fibris plurimis filiformibus, fragilibus, flexuoſis, ſubæqualibus, deſcendentibus, fibrilloſis: fibrillis criſpis. *Parencyma* album, ſolidiuſculum, poſt ſectionem tranſ-

a) Radix cum foliis proſtat.

transſverſalem notatum diſco æquali, puncto centrali ferrugineo.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, fortis, balſamicus, fere ut tæda ligni Pini. *Sapor* aromatico — balſamicus, odori congruens, calidiuſculus, inhærens.

PRÆPARATA. Eſſentia.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA. L.

Ariſtolochia Rotunda. Ph. Runde Osterluzey. Podražec okraublý.

A. Rotunda. Fol. cordatis ſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, flor. ſolitariis.

Hortenſis. Perennis.

Off. Radix. (*a*)

FORMA. *Sicc. Radix* ſubrotunda, noduloſa: nodis obtuſo — rotundatis, pollicariis vel ultra, extus ferrugineo — cinerea, ſubrugoſa; *parencymate* duro, albido — citrino, poſt ſectionem transſverſalem centro medullari amplo.

PROPRIETAS. *Odor* gravis; *Sapor* amarus ſubaromaticus.

COMPOSITA. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi. — Diateſſaron.

Pilulæ de Succinio Crocatæ.

* ARISTOLOCHIA CLEMATITIS. L.

Ari-

a) Sub nomine Ariſtolochiæ rotundæ vulgaris proſtant radices Fumariæ bulboſæ in officinis noſtris.

Ariſtolochia Vulgaris. Ph. Gemeine Oſterluzey. Podražec dlauhý neb obecnj.

A. Clematitis. Fol. cordatis obtuſiuſculis hirtis, flor. ſolitariis pedunculis recurvatis ſubtruncatis.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix* cylindrica, ſimplex, longa, ſubtetragona, deſcendens, parce fibrilloſa, craſſitie vix digiti minimi, extus glabra, olivacea, *parencymate* albido, poſt ſectionem tranſverſalem diſtincto centro medullari ampliſſimo, orbiculato, ſtellato: radiis cinereis, ſuperne ſenſim latioribus, apice obtuſo truncatis, crenulatis, ferrugineis.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* fragrans, ſubgraveolens; *Sapor* aromatico—gravis herbæ magis amarus, inhærens.

ORDO.

DODECANDRIA.

CYTINUS HYPOCISTIS. L.

Hypociſtis. Ph. Hypociſten. Hypociſtis.

Cytinus. Cal. 4—fidus, ſuperus. *Cor.* o. *Antheræ* 16, ſeſiles. Bacca 8—locularis, polyſperma.

Exoticus. Paraſiticus in Ciſto. Off.

Off. Succus inſpiſſatus.

Forma. *Succus* inſpiſſatus in maſſam nigricantem, plaſticam, ſubfragilem, fragmentis opacis, atomis ſubſplendentibus.

Proprietas. *Odor* vix ullus; *Sapor* acerbus, in ſaporem atramenti leviter incidens, ſtypticus, acidulus; *maſticatus* dentibus ſubadglutinatus, ſolvitur in ore: ſaliva fuſco nigricante.

Composita. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

ORDO.

POLYANDRIA.

* Arum maculatum. L.

Arum. Ph. Aron, Zehrwurzel. Aron, aronowá bylina, Aronowé brady kořen, twář S. Jana.

Arum. *Spatha* monophylla, cucullata. *Spadix* ſupra nudus, inferne femineus, medio ſtamineus.

A. Maculatum. Acaule, fol. haſtatis integerrimis, ſpadice clavato.

Hortenſe. Perenne.

Off. Radix.

For-

Forma. *Rec. Radix* recens tuberoſa, magnitudine vix ovi columbini, obducta tunica tenera; membranacea, ovata, extus alba, parce fibrilloſa: fibris ſparſis; tuberculis undique ſparſis, diſtantibus, ſubrotundis, ſc. totidem bulbulis parvis, ætate ſenſim excreſcentibus; apice inſtructa. *Squamis* plurimis albis, membranaceis, imbricatis, adpreſſiuſculis; quarum interiores minores, intra quas latet denticulus vivax, ſolitarius, ſubulatus, acutus, ſubincurvatus. *Parencyma* album, carnoſum, poſt ſectionem traſverſalem æquale, ſubſucculentum: ſucco maculas albidas, amylaceas, in cultro deponente. *Siccata* radix dura, ſubdiaphana; *vetuſta* ſ. diu ſervata nivea, farinoſa, ſicca, fragilis, friabilis, ſubinquinans, facie cretæ albæ.

Proprietas. *Rec. Odor* nullus; *Sapor* primum inſipidus, mox vero pungens, qui ſenſus punctorius ſenſim increſcit, haud aliter ac mille acus pungerent, atque inhæret etiamſi os eluitur aqua pura, oleoſis vero mitigatur. Recens radix reſecta lacteſcit, lacte amylaceo, quiete *amylum* album deponente, ſupernatante liquido limpido. Recenter *ſiccatæ* radicis *Sapor* adhuc pungens, paullo tamen remiſſior quam recentis; *diu* vero *ſiccatæ* & aridæ farinaceus, vix pungens; hæc *maſticata*, farinacea ſentiur & inter dentes friabilis, facile comminuitur, ſolvitur fere : ſaliva lacteſ-

ctescente; immo hæc, contusa, ex aqua frigida superfusa resolvitur in *amylum* album, recentis radicis amylo simillimum. Omnis radix ori, siccata & contusa, atque in aqua cocta, abit in *Gelatinam* mitem, dulcescentem, sapidam, alimentarem, glutinantem. Sic tota radix annosa amylum constituit.

COMPOSITA. Pulvis Stomachicus Birkmanni.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

ORDO

TETRANDRIA.

✠ BETULA ALBA. L.

Betula. Ph. Birke. Bříza.

Betula. MAS. *Cal.* 1 — phyllus, fidus, 3 — florus. *Cor.* 4 — partita.

FEM. *Cal.* 1 — phyllus, sub 3 — fidus, 2 — florus, *Sem.* utrinque membrana alata.

B. *Alba.* Fol. ovatis acuminatis serratis.

Indigena. Arbor.

Off. Gemmæ recentes pro Unguento Mendicorum.

BUXUS SEMPERVIRENS. L.

Buxus. Ph. Buchsbaum. Pusspan.

Buxus. MAS. *Cal.* 3—phyllus. *Petala* 2. *Germinis* rudimentum.

FEM. *Cal.* 4—phyllus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Caps.* 3—roſtris, 3—locularis. *Sem.* 2.

Hortenſis. Arbuſcula.

Off. Lignum.

FORMA. *Lignum* ſolidum, duriuſculum, ponderoſum, pallido—citrinum, venis longitudinalibus; veſtitum cortice cinereo, rugoſo; poſt ſectionem tranſverſalem notatum venis tranſverſalibus, parallelis, & ſtriis decuſſantibus, minutiſſimis.

PROPRIETAS. *Odorem* vix habet, nec *Saporem.*

PRÆPARATA. Oleum Epyreumaticum.

URTICA DIOICA. L.

Urtica Major. Ph. Brenneſſel. Kopřiwa páliwá neb wětſſj.

Urtica. MAS. *Cal.* 4—phyllus. *Cor.* o. *Nectarium* centrale, cyathiforme.

FEM. *Cal.* 2—valvis. *Cor.* o. *Sem.* 1. nitidum.

U. Dioica. Fol. oppoſitis cordatis, racemis geminis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FOR-

Forma. *Rec.* *Caules* plures ex una radice erecti, ſimplices, vix ramoſi, tetragoni : angulis ſubrotundis, 4 — ſulcatis, pubeſcenti — hiſpidis : pilis rigidiuſculis, inferne craſſis, cylindricis, in medio articulatis, apice ſubulato, acuto, pungente. *Folia* oppoſita, petiolata, cordata, acuta, groſſe ſerrata, bi — vel tripollicaria, ſupra lineata, rugoſa, ſaturate viridia, ſubtus pallidiora, utrinque hiſpida : pilis breviuſculis, rigidis, ſubulatis, baſi globoſis ; ſuperiora proximiora. *Petioli* tetragoni, hiſpidi. *Stipulæ* oppoſitæ, bipartitæ : laciniis linearibus, obtuſiuſculis, ſubmembranaceis, ciliatis, patenti — reflexis.

Proprietas. *Rec.* *Herbæ* : *Odor* & *Sapor* herbacei.

Composita. Unguentum Mendicorum.

✠ Morus nigra. L.

Morus. Ph. Maulbeerbaum. Maruſſe.

Morus. Mas. *Cal.* — partitus. *Cor.* o.

Fem. *Cal.* 4 — partitus. *Cor.* o. *Styli* 2. *Cal.* baccatus. *Sem.* 1.

M. Nigra. Fol. cordatis ſcabris.

Hortenſis. Arbor.

Off. Fructus recens.

Forma. *Rec.* *Baccæ* axillares e foliis, brevius pedunculatæ, ovales, obtuſæ, fuſco — nigræ, glabræ, lucidiuſculæ, ſubpollicares, pondere Scrup. 2 — 4, compoſitæ e *Bacculis*, diſpoſitis ſerie

rie longitudinali, inæquali, obovatis, compressis, truncato obtusis, terminatis pistillo, undique imbricatis in receptaculo carnoso, cylindrico; singulis constantibus e 4 lobis vesiculosis, teneris, succosis, superne convexis, inferne attenuatis, imbricatis, arcte coniventibus; quorum 2 exteriores oppositi, concavi, margine rotundato — adpresso, minutim pubescente; 2 interiores conniventes, paralleli, directione contraria ad exteriores. *Semen* unicum in medio, intra lobos, triangulari — ovatum, acutum, glabriusculum, compressum, dorso plano, antice acie acuta, inferne truncatum, cavum, auctum apophysi gelatinosa, involutum propria tunica subexsucca.

PROPRIETAS. *Baccar.* rec. *Odor* vix ullus; *Sapor* acidulus, insimul in concumerinum incidens. Baccæ *masticatæ* valde succosæ, extrahitur succus remanent pelliculæ, receptaculum & semina exspuenda: saliva nigro — violacea.

PRÆPARATA. Roob.

Syrupus.

ORDO

POLYANDRIA.

POTERIUM SANGUISORBA. L.

Pimpinella Rubra. Ph. Roth Bibernel. Bedrnjk, krwawé kořenj.

Poterium. MAS. *Cal.* 4—phyllus. *Cor.* 4—partita. *Stam.* 30—40.

FEM. *Cal.* 4—phyllus. 4—partita. *Pist.* 2. Bacca e tubo corollæ indurato.

P. Sanguisorba. Interme, caulibus subangulatis. Hortensis. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Rec.* *Caules* plures ex una radice, erecti, pedales, angulati, virides, angulis linea fusca notatis; glabri, ramosi. *Rami* alterni, erecti, compressiusculi, angulati. *Folia* altena, petiolata, pinnata cum impari, septemjuga: foliolis petiolellatis, oppositis, ovatis, obtusis, inciso—serratis, utrinque glabris, venulosis, subtus glaucis, carinatis, supra obscure viridibus, concaviusculis; inferioribus minoribus. *Petioli* communes fuscescentes, parce pilosi, subtus convexi supra canaliculati, basi concavi, ciliati. *Stipulæ* utrinque 3, ex pari foliorum solitario, basi petioli.

PROPRIETAS. *Rec.* *Odor* fragrans, graviusculus, gratus; *Sapor* congruens.

COMPOSITA. Species Decocti Althææ Fernelii.

QUERCUS ROBUR. L.

Quercus. Eiche. Dub.

Quercus. MAS. *Cal.* 5—fidus fere. *Cor.* 0. *Stam.* 5—10.

FEM.

Fem. *Cal.* 1—phyllus, integerrimus, ſcaber. *Cor.* 0. *Styli* 2—5. *Sem.* 1. ovatum.

Q. *Robur.* Fol. deciduis oblongis ſuperne latioribus; ſinubus acutioribus, angulis obtuſis.

Indigena. Arbor.

Off. Cortex. Gemmæ recentes (Oculi vulgo) Folia. Glandes.

Forma. *Cortex* trunci planiuſculus, craſſitie ſemipollicari, ſubligneus, undique cinereus, extus longitudinaliter ſubfiſſus, ſæpe conſpurcatus lichenibus. *Folia* alterna, breviter petiolata, fere digitalia, cuneiformia, runcinato—lobata: lobis oppoſitis, obtuſis, inferioribus ſenſim minoribus; utrinque glabra, minutiſſime venuloſo—reticulata, margine ſubrecurvato, integerrimo. *Pedunculi* axillares, in ſummitate ramulorum ſolitarii, foliis breviores, nudi, glabri. *Perianth.* fructus (cupulæ) cineraſcens, craſſiuſculum, corticoſum, communiter geminum, ſæpe ſolitarium, pateriforme, integerrimum, margine truncato, æquali minutiſſime ciliato, extus rugoſum: ſquamulis imbricatis, ovato—acutis, ſubcarinatis, adpreſſis, apice obtuſiuſculis; intus læve, centro deraſo in fundo pallidiore. *Nux* ovalis, calyce triplo longior, undique lævis, nitidiuſcula, colore ſtramineo, ſtriis rubicundis longitudinalibus, baſi macula orbiculato—deraſa, apice obtuſa, ſubvilloſa, cum umbilico cylindrico

pro-

prominente; *testa* pergamena, fragili; *nucleo* duplici tunica obvelato, extus rugoso: vestigiis venulosis; bipartibili, solido; plumula in apice: puncto subrotundo, subprominente. (*)

PROPRIETAS. *Corticis*: *Odor* vix ullus; *Sapor* acerbus, stypticus. *Glandis rec*. *Odor* nullus; *Sapor* acerbus, stypticus; *Siccata* dura.

COMPOSITA. *Gem.* Unguentum Mendicorum.

JUGLANS REGIA. L.

Juglans. Ph. Welscher Nußbaum. Wlaský ořech.

Juglans. MAS. *Cal.* 1 — phyllus, squamiformis *Cor.* 6 — partita. *Filamenta* 18.

FEM. *Cal.* 4 — fidus, superus. *Cor.* 4 — partita: *Styli* 2. *Drupa* nucleo sulcato.

J. Regia. Foliolis ovalibus glabris subserratis subæqualibus.

Hortensis. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Rec. Nux* matura majuscula, pollicaris, subrotunda, ossea, sulcis reticulata, bivalvis, semiquadrilocularis; *nucleo* albo, quadrilobo: lobis longitudinalibus, anfractuosis, auriformibus undique gibbulis rugosis, binis utrinque latere parallelis; membrana obvelato.

PROPRIETAS. *Nucleorum* matur. *Odor* nullus; *Sapor* subdulcescens; *masticati* firmi, comminu-

*) Huic parasiticus est Agaricus Chirurgorum.

untur, ſaliva emulſiva. *Nucleus* immaturus, diſſectus, inter anfractus plurimum mucilaginis fovet.

PRÆPARATA. Oleum expreſſum.

COMPOSITA *Ol.* Balſamum Sulphuris Rulandi. Unguentum de Styrace.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. L.

Styrax Liquida. Ph. Flüßiger Storax. Tekancý ſſtýrax.

Liquidambar. MAS. *Cal.* communis 4—phyllus. *Cor.* o. *Filam.* numeroſa.

FEM. *Cal.* in globum, 4—phylli. *Cor.* o. *Styli* 2. *Caps.* multæ in globum, bivalves, polyſpermæ.

L. Styraciflua. Fol. palmato—angulatis; lobis indiviſis acutis.

Exotica Arbor.

Off. Balſamum ſive Reſina liquida.

FORMA. *Reſina* griſeo—brunnea, fuſceſcens, homogena, conſiſtentia unguenti, plaſtica, tenaciuſcula, rigidiuſcula, opaca, lucida, pinguiuſcula. *Purior* Storax liquida in officinis ſubinde occurrit, facie Terebinthinæ, conſiſtentia mollis, ſubdiaphana, tenax, lutea, odore validiore. (*a*)

PRO-

a) Liquidambar & Styrax liquida auctorum, quantum liquet, ejuſdem arboris progenies ſunt in eo modo diſcrepantes, quod in hac naturæ ars ſubvenerit. Hinc utrunque jungam.

LIQUIDAMBAR. Eſt reſina craſſa inciſione corticis proveniens, cui cortex comminutus odoris tanto diutius ſervan-

Proprietas. *Odor* fragrans, in Storacem Calamintham incidens; *Sapor* unctuosus, acriusculus, odori congruens. Accensa flagrat, odore grato, balsamico, remanente carbone tenui, atro, parum inquinante.

Præparata. Unguentum de Styrace.

Composita. Emplastrum Diabotanon.

ORDO.

MONADELPHIA.

PINUS SYLVESTRIS. L.

Pinus Sylvestris. Fichtenbaum. Lesnj borowice.

Pinus. Mas. *Cal.* 4 — phyllus. *Cor.* o. *Stam.* plurima. *Antheræ* nudæ.

di causa admiscetur (Monardes *simpl.* Clas. p. 324) Ætate indurescit in resinam solidam fragilem (Lewis M. in p. 361.

STYRAX LIQUIDA. Venalis quantum constat, ramorum comminutivorum coctione elicitur, sub qua superficiem ascendit (Monard. p. 325) Purior per colum transmissa fuit, fere transparens, mellis consistentiæ, & coloris rubri vel grisei, odoris fragrantis styracem calamintam referrentis, saporis acris. Quæ in officinis occurrit quibusdam factitia videtur, solutione styracis calamintæ in vino ac oleo admistaque resina laricea (Kaii, Hist l. c.), Ita Murray. Apparat. Medicaminum.

FEM. *Cal.* ſtrobili : ſquama 2–flora. *Cor.* o. *Piſt.* 1. *Nux* ala membranacea excepta.

P. Sylveſtris. Fol. geminis : primordialibus ſolitariis glabris.

Indigena. Arbor.

Off. Turiones. Reſina liquida (Terebinthina communis vulgo) Reſina ſolida. Pix.

FORMA. *Turiones*, ſ. ramulorum rudimenta, terminales, plures aggregati, ferruginei, cylindrici, acuti, latitudine pollicis vel ultra, undique imbricati : ſquamis anguſtis, linearibus, acutis, albido — membranaceis, ſubdiaphanis, dorſo viridulis, adpreſſis, margine ciliato — laceris ; undique (excepto apice) contaminati Reſina tenui, in frigore ſolidiuſcula, in calore molli, digitis ſe adglutinante ; *parencymate* viridi, molliuſculo, ſicciuſculo. *Reſina Liquida* (Terebinthina communis) maſſa eſt reſinoſa, opaca, butiracea, mollis, pallida, cineraſcenti–ſubcitrina, quaſi unguentum liquidius. *Reſina communis ſolida*, rubicunda, nitidiuſcula, facie Quartzi, fragilis fracturis planis ; digitis ſe adglutinans, odore tædæ Pini. *Pix atra* fit ex pice liquida per inſpiſſationem, & eſt reſina ſolida in maſſa grandi, atra, lucida, homogenea, facie vitri nigri, in frigore fragilis : fracturis planiuſculis, nitidis ; in calore leni molliuſcula, flexilis, digitis tenaciter adhærens, extenſilis, in filum ductilis.

PRO-

Proprietas. *Turionum* rec. *Odor* fragrans resinosus, graviusculus; *Sapor* non ingratus, debilius resinosus, amaricans; *masticati* subpulposi, medullaris pars mollior, comminuitur, subsolvitur; corticalis pars tenax, vix comminuitur.

Resinæ liquid. *Odor* validior ligni Pini resina abundantis, s. tædæ; *Sapor* pinguiusculus, resinosus, subamaricans, odori congruens. *Picis Odor* in tædam incidens; *Sapor* debilissimus vix ullus.

Præparata. Oleum destillatum.
Spiritus.
Terebinthina cocta.

Composita. *Terebinth.* Ceratum pro Ceraturis balsamicis.
Electuarium seu Theriaca Andromachi.
Emplastrum Citrinum.—deCicuta simplex & compositum.—Diabotanon—ad Fonticulos rubrum.—Diachilon.—de Galbano Crocatum.—de Labdano.—Malacticum.—de Meliloto.—Mercuriale.—de Minio.—Oxicroceum.—ad Rupturas.—Vesicatorium.
Oleum Hyperici.—Viride.
Pilulæ Balsamicæ Stahlii.
Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus.
Unguentum Althææ.—seu Balsamum Ar-

Arcæi. — Baſiliconis. — Digeſtivum. — Nervinum.

Tereb. coct. Ceratum pro Cereolis digeſtivis. — pro Cereis exſiccantibus.

Reſin. Emplaſtrum Citrinum. — Diachilon cum gummatibus — Malacticum. — de Meliloto. — ad Rupturas.

Unguentum Althææ. — Balſamicum.

Pix nigr. Emplaſtrum Diabotanon. — Diachilon cum gummatibus.

Pix naval. Unguentum Balſamicum.

Ol. Balſamum Sulphuris Terebinthinatum.

PINUS PINEA. L.

Pinus Sativa. Ph. Pinole, Zirbesnüſſelbaum. Domácý borowice.

P. Pinea. Fol. geminis: primordialibus folitariis ciliatis.

Exotica. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Nuclei* albi ſunt, oblongi, compreſſi altera parte paullo latiores, pollicem dimidium longi, tenui epidermide veſtiti, intra putamen ligneum reconditi, quod vero ante venditionem ſeparatur.

PROPRIETAS. *Odor* & *Sapor* ſubacidulus, dulcis, amygdalarum æmulus; oleo pariter fœti, ut ad tertiam ſui ponderis partem fundant. Pr-

PINUS LARIX. L.

Larix. Ph. Lerchenbaum. Dřjn.

P. Larix. Fol. fasciculatis acutis.

Indigena rarius. Arbor.

Off. Balsamum sive Resina liquida (Terebinthina veneta (*a*) vulgo.

FORMA. *Resina* liquida, diaphana, consistentia mellis vel syrupi spissioris, colore aqueo vel pallide lutescente, pro diversa ætate, in fila ductilis, tenax. (*b*)

PROPRIETAS. *Odor* debilius fragrans; *Sapor* amarus, faucibus inhærens, resinosus, subpinguiusculus, acriusculus.

PINUS ABIES. L.

Pinus Picea. *vulgo* Abies rubra. Ph. Rothe Tanne. Smrk.

P. Abies. Fol. solitariis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis.

Indigena. Arbor.

Off. Resina. (*c*) Colophonia.

a) *Tebrebinthina veneta* male dicta, justius semper *Larigna* dicenda, quum non per Venetas solos transferatur. Locus hic est generatim de Terebinthina dicendi; cujus triplex vulgo assumitur species. 1.) *Cypria* ex Pistacia Terebinthino L. 2.) *Communis*, plerumque ex Pino Picea, cui & originem suam tribuit *argentoratensis*; & 3) *Veneta* ex præfixa arbore Celebris etiam evasit recentius Conadensis. Murray. Appar. Med.

b) Huic parasiticus est *Agaricus Albus* officinarum.

c) *Resina* hæc etsi ex aliis quoque coniferis nominatim pino sylvestri proveniat, pinus tamen picis uberiorem copiam lar-

Forma. *Resina* abietis *nativa*, qualis e trunco arboris hieme abraditur, albida est, mollis, pinguiuscula, subdiaphana; æstate siccatur & durior fit; Alia ex trunco arboris inciso extrahitur; quæ si decoctione in aqua igne moderato, funditur, & deinde per sacculos ex linteo densiore cum expressione colatur, ut a sordibus bene purgetur, *Pix burgundica* vocatur. Si vero resina hæc ad consumptionem aquæ, h. e. ad siccitatem coguitur, addito sub fine coctionis, aceto vini, obtinetur massa sicca, quæ *Colophonium* appellatur: Estque resina solida in frustis majoribus, fusco-rubescens, subdiaphana, nitida, facie vitri obscuri, fragilis: fracturis planis nitidis, subfriabilis: granulis quasi deauratis, micantibus, pulverata abit in pulverem lutescentem.

Proprietas. *Resinæ*: *Odor* fragrans, ligni abietis; *Sapor* amaricans, balsamicus, satis gratus; digitis contractata pinguedine illos inficit. *Coloph. Odor* Pini, sed debilior, *Sapor* nullus.

Præparata. *Resin. Liquid.* Oleum destillatum.

Composita. *Resina*. Ceratum pro Ceraturis balsamicis.

Emplastrum Citrinum. — Diachilon cum gummatibus. — Malacticum. — de Meliloto. — Oxicroceum. — ad Rupturas. Unguitur, prout abies rursus resinæ subpeditandæ aptior. Murray T. I. p. 30.

Unguentum. Althææ. — Balſamicum.
Coloph. Emplaſtrum Oxicroceum.
Unguentum de Styrace.

CROTON CASCARILLA. L.

Caſcarilla. Ph. Schakarille. Kaſkarilla.

Croton. MAS. *Cal.* cylindricus 5 dentatus. *Cor.* 5 — petala. *Stam.* 10 — 15.
FEM. *Cal.* polyphyllus. *Cor.* o. *Styli* 3, bifidi. *Caps.* 3 — locularis. *Sem.* 1.

C. Caſcarilla. Fol. lanceolatis acutis integerrimis petiolatis ſubtus tomentoſis, caule arboreo.

Exotica. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Sicc. Cortex* durus, cineraſcenti — bruneus, lineæ vix craſſitudine, ſubrugoſus, lineis tranſverſalibus ſparſis, ſæpe lichenibus conſpurcatus, ſectus in ſegmenta bipollicaria, ſemiconvoluta; fragilis; fractura plana, fuſca.

PROPRIETAS. *Odor* aromaticus, non ingratus; *Sapor* aromaticus; *maſticatus* ſatis facile comminuitur, ſub maſticatione ſenſim amarior: amaritie inhærente. Ignis flammæ admotus accenditur, flagrat flamma vivida, mox tamen ab igne remoto extincta fumat: fumo grato, in ambram incidente, temulante.

COMPOSITA. Candelæ fumales.

BEN-

BENZOIFERA planta incognita adhuc: nam non eſt LAURUS BENZOIN neque CROTON BENZOIN. L. (*a*)

Benzoe. Aſa odorata ſeu dulcis. Ph. Wohlriechender Aſand. Benzoe.

C. Benzoin. Fol. linearibus ſubrepandis nudis; venis rubris.

Exotica. Arbor.

Off. Reſina.

FORMA. *Gummi Reſina* in maſſa grandiori, virideſcens, rubicunda, marmorea: maculis glandulisque albicantibus, undique nitidiuſcula, fragilis, friabilis.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, non ingratus, balſamicus; *maſticata* inter dentes friabilis, comminuitur in ore, non ſolubilis, ſapore ſubdulceſcente, reſinoſo, balſamico. Manibus tractata digitis non adhæret.

PRÆPARATA. Flores.
Oleum deſtillatum.
Tinctura.

COMPOSITA. *Reſin.* Candelæ Fumales.

Pi-

(*a*) Pharmacopæa Auſtr. Prov. pag. 23.
Juxta Bergium, qui ita agit: Authoritete Ill. v. LINNE nixus, arborem Benzoiferam ad Crotonis genus refero. Dubium tamen Ar. SYLVII. deſcriptio fructus, qui tricocus non eſt, verum drupa ſicca, intra quam continetur Nux cinerea, nucleo albido — virideſcente ſaporis amaris, & nigrati.

Pilulæ de Styrace.

Pulvis Fumalis ordinarius. — Specierum pro Cucupha.

Spiritus Balſamicus vulgo Schauerianus.

Unguentum Nervinum.

Flor. Pilulæ Balſamicæ Mortoni.

Ol. Unguentum, ad Scabiem.

CROTON LACCIFERUM. L.

Lacca. Ph. Gummilack. Laka.

C. Lacciferum. Fol. ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, caule arboreo.

Exotica. Arbor.

Off. Reſina. Præfertur granulata in ramulis.

FORMA. *Reſina* rubicunda dura, fragiliuſcula, ſubdiaphana, læviuſcula, ramulis undique incruſtata: cruſtis craſſis, ſubcylindricis, rugoſis, noduloſis, ſæpe lacrymis adnatis, diaphanis, rubris, nitidiuſculis, ſcabridis; pollicaribus vel ultra, ramulo longitudinaliter perforatis; *parencymate* celluloſo: cellulis ſimplicibus, tranſverſalibus. approximatis, refertis exuviis inſectorum ut puppis excluſis, tela ſ. lana a larvis nata, & ſæpe ſtercore. Hinc. G. Lacca in bacculis eſt galla reſinoſa, ſive nidus inſecti cujuſdam.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* nullus. *Maſticata* reſina inter dentes dura, friabilis, minime emollitur. PRÆ-

PRÆPARATA. Tinctura Laccæ.

COMPOSITA. Pulvis Dentifricius ruber.

RICINUS COMMUNIS. L. (a)

Ricinus vulgaris. Ph. Wunderbaum, Kreuzbaum, Purgierkerner. Skočec wětſſj.

Ricinus. MAS. *Cal.* 5 — partitus. *Cor.* o. *Stam.* numeroſa.

FEM. *Cal.* 3 — partitus. *Cor.* o. *Styli* 3, bifidi. *Caps.* 3 -- locularis. *Sem.* 1.

R. Communis. Foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis. Exotico — Biennis.

Off. Semen.

FORMA. *Nux* ovata, utrinque obtuſa, magnitudine ſeminis Phaſeoli ſaccharati, utrinque compreſſa, nitida, & ſpadiceo & viridi variegato — marmorea, terminata hilo prominente, pallide luteſcente, acutiuſculo, latere utrinque excavato. *Nucleus* niveus, pinguiuſculus, centro cavo, obductus membrana alba, intra *teſtam* tenuem, fragilem.

PROPRIETAS. *Sem. Odor* nullus; *Sapor* debilis, vix dulceſcens, acriuſculus; *maſticata* ſemina tenera, facile comminuuntur, & quaſi ſolvuntur ſaliva emulſiva; ſed acrimonia rodens poſtea in faucibus ſentitur & aliquantum inhæret. Si ranceſcunt ſemina, ſapor eorum in ſaporem ſeminum Canabis incidit.

PARATUR inde Oleum preſſum. OR-

a) Cum tantæ deprædicentur de Ricini oleo laudes, hinc veniam dabit Lector, quod etiam hinc oleum conceſſerim.

ORDO
SYNGENESIA.

✠ MOMORDICA BALSAMINA. L.

Momordica. Ph. Balsamäpfel, Momordike. Momordyka.

Momordica. MAS. *Cal.* 5—fidus. *Cor.* 6—partita. *Filamenta* 3.

FEM. *Cal.* 5—fidus. *Cor.* 5 partita. *Stylus* 3—fidus. *Pomum* elaſtice diſſiliens.

M. Balſamina. Pomis angulatis tuberculatis, fol. glabris patenti—palmatis.

Hortenſis. Annua.

Off. Fructus recens pro oleo.

FORMA. *Fructus* ſublongus, qui maturus rubet vel; (ut ait Lobelius) ſuperficie, carneque intentis purpureæ phœniceæ, turbinatus, cucumeris forma, eodemque modo tuberculis horridis bullatus: *Semine* Citruli vulgo dicti, copioſo, fuſco, longiore quam latiore, modice acuminato, compreſſoque & aſpero.

PROPRIETAS. *Odor* vix ullus; *Sapor* pinguis, mucilaginoſus ſemini Lini ſimilis.

PRÆPARATA. Oleum coctum.

✠ MOMORDICA ELATERIUM. L.

Cucumis Aſininus. Ph. Eſelskukumern. Stŕikawá aneb planá Tykwice.

Hor-

Hortense. Annuum.

Off. Radix. Fructus recentes.

FORMA. *Rad.* longa, crassa, alba, paucis adnatis donata. *Fructus* oblongus, pollicem circiter crassus, ex viridi flavidus, qui maturescens ad levem flexionem prope pedunculum dissilit, violenter semina cum succo in cavo latente explodens. Huic præprimis insignis amarities insidet. Duplex Elaterii species officinis Svecicis assumitur; *album* & *nigrum* (*a*) Prior succo lactescente pomi submaturi. Alterum ex succo pomi expresso. *Album* est massa terrea, in frustis planis crassitudine linearum circiter 2, cinerea, leviuscula, sicca, fragilis, friabilis. *Nigrum* massa sicca, viridescenti-nigra, subsplendens, in frustulis inæqualibus, fragilis: fracturis planiusculis.

PROPRIETAS. *Albi: Odor* nullus; *Sapor* vix amaricans, acris; *masticatum* solvitur in ore, & mordet in lingua. *Nigri: Odor* nullus; *Sapor* acris, debilior quam albi, subsalsus; *masticatum* tenaciusculum, ægre comminuitur, adglutinatur dentibus, solvitur; saliva brunea; mordet postea in faucibus.

PRÆPARATA. *Fruct.* Extractum.

COMPOSITA. *Rad.* Unguentum de Arthanita, sive contra Vermes.

Extract. Emplastrum Diabotanon.

Cu-

a) Nobis solumodo nigrum.

CUCURBITA LAGENARIA. L.

Cucurbita. Ph. Kürbs, Flaschenkürbs. Tykew domácý.

Cucurbita. MAS. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor.* 5 — fida. *Filamenta* 3.

FEM. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor.* 5 — fida. *Pist.* 5 — fidum. *Pomi* semina margine tumida.

C. Lagenaria. Fol. subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, (*a*) pomis lignosis.

Exotica etiam Hortensis. Annua.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* cinerea, minutim rugosa, linearia, vix pollicaria, utrinque plana, bisulcata: sulcis apice conniventibus; utrinque obtusa, apice profunde retusa. *Parencyma* album, cotiledoneum, bipartibile, intra testam fragilem.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* pingniusculus, amygdalinus; *masticata* comminuuntur, saliva emulsiva.

COMPOSITA. Semina IV. frigida majora. Species Decocti Althææ Fernelii.

CUCURBITA PEPO. L.

Pepo. Ph. Türkenkopf, Pfeben, Plutzer. Dyně, melaun.

C. Pepo. Fol. lobatis, pomis lævibus.

Colitur. Annuus.

Off. Semen.

FOR-

a) Folia hæc Moschi odorem valide spargunt.

Forma. *Semina* albida, obovalia, undique compressa margine incrassato.

Proprietas. *Odor* nullus; *Sapor* subdulcis, pinguiusculus; *masticata* comminuuntur, saliva emulsiva.

Cucurbita citrullus. L.

Citrullus. Ph. **Angurie, Wassermelaune. Cytrüle, Angurye.**

C. Citrullus. Fol. multipartitis.

Exoticus etiam Hortensis. Annuus.

Off. Semen.

Forma. *Semina* plurima, pedicellata: pedicello carnoso, molli; fusco — brunea, lævia nitida, ovata, ontusa, apice summo decorticata, utrinque compresso — plana, in singulo loculo membrana tenui interstincta.

Proprietas. *Seminum: Odor* nullus; *Sapor* amygdalinus.

Composita. Semina IV. frigida majora.
Species decocti Althææ Fernelii.

Cucumis colocynthis. L.

Colocynthis. Ph. **Koloquinte. Koloquintida, Kágské gablko.**

Cucumis. Mas. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor.* 5 — partita. *Filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor.* 5 — partita. *Pist.* 3 — fidum. *Pomi* semina arguta.

C. Colocynthis. Fol. multifidis, pomis globosis glabris.

Exotico — Annuus. Off.

Off. Fructus decorticatus. Semen.

FORMA. *Sicc. Pomum* decorticatum, ſubrotundum, magnitudine ovi gallinacei, ſiccum, albidum, læviuſculum, conſtans ex ſubſtantia papyraceo — ſpongioſa, molli; ſexloculare: loculis refertis *ſeminibus* numeroſis, ovatis, obtuſis utrinque compreſſis, lævibus, olivaceis, longitudine circiter 2 linearum; *parencymate* albo, cotyledoneo.

PROPRIETAS. *Pulpæ: Odor* debilis, ingratus; *Sapor* amariſſimus, nauſeoſus, acriuſculus. *Seminum Odor* nullus; *Sapor* amygdalinus, dulceſcens, pinguiuſculus.

PRÆPARATA. Pulpa? (*a*)

COMPOSITA. *Fruct.* Extractum Catholicum, hoc pro Pilulis Mercurialibus. — Panchymagogum,

Unguentum de Arthanita ſive contra vermes.

Sem. Suppoſitoria compoſita.

CUCUMIS MELO. L.

Melo. Ph. Melone, Melaune. Melaun.

C. Melo. Foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis.

Colitur. Annuus.

Off. Semen.

X FOR-

a) Pro componendo Oleo Colocynthidis compoſito vulgo Habacucino. Unguento de Arthanita. Pulvere Trochiſcorum Alchandar.

Forma. *Semina* plurima, pedicellata, ovalia, acuta, utrinque compressa, glabra, albida, laevia, in pulpa mollissima & succosa nidulantia.

Proprietas. *Odor* nullus; *Sapor* pinguiusculus, amygdalinus; *masticata* comminuuntur, saliva emulsiva.

Composita, Emulsio Laxativa.
Semina IV. Frigida majora.
Species Decocti Althaeae Fernelii.

Cucumis sativus. L.

Cucumis. Ph. Cucumern, Gurken, Omurken. Okůrky.

C. *Sativus*. Foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris.

Colitur. Annuus.

Off. Semen.

Forma. *Semina* (matura) ovato — oblonga, utrinque obtusa, compressa, circiter tres lineas longa, alba, laevia; *parencymate* cotyledoneo albo, bipartibili.

Proprietas. *Seminum Odor.* nullus; *Sapor* amygdalinus, magis tamen pinguis; *masticantur* saliva emulsiva.

Composita. Semina IV. Frigida majora.
Species Decocti Althaeae Fernelii.

Bryonia alba. L.

Bryonia. Ph. Zaunrübe. Posed.

Bryonia. Mas. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor.* 5 — partita. *Filamenta* 3. Fem.

FEM. *Cal.* 5—dentatus. *Cor.* 5—partita. *Stylus* 3—fidus. *Bacca* ſubgloboſa polyſperma.

B. *Alba.* Fol. palmatis utrinque calloſo—ſcabris.

Indigena. Perennis.

Off. Radix.

FORMA. *Rec. Radix* fuſiformis, ſubpedalis, ſæpe ramoſa, apice obtuſo—rotundata, albido—luteſcens, tranſverſaliter rugoſa: rugis obſoletis, ſubapproximatis, ceterum glabriuſcula. *Parencyma* album, carnoſum, ſuccoſum, poſt ſectionem tranſverſalem æquale, undique punctatum: punctis ſubrotundis, ſerie radiali a centro ad peripheriam undique diſpoſitis; ſerie autem annulari, ſolitaria, centrum medullare includente.

PROPRIETAS. *Rec. Rad. Odor* nauſeoſus; *Sapor* nauſeoſus odori congruens, acriuſculus: ſubſtypticus. Radix recens lacteſcit; ſiccata vero recenti longe debilior.

COMPOSITA. Aqua Bryoniæ compoſita? (*a*)

a) Olim, licet adhuc hodie ſat uſualis.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

ORDO MONANDRIA.

SALIX ALBA. L.

Salix vulgaris. Ph. Weiße Weide, Felber. Weba.

Salix. MAS. *Amenti* ſquamæ. *Cor*. o. *Glandula* baſeos nectarifera.

FEM. *Amenti* ſquamæ. *Cor*. o. *Stylus* 2 — fidus. *Caps*. 1 — locularis, 2 - valvis. *Sem*. papposa.

S. Alba. Fol. lanceolatis acuminatis, ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glandulosis.

Indigena. Arbor.

Off. Cortex.

FORMA. *Cortex* peraſperus, rami fuſci & ſubvirides.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* auſterus, adſtringens, *maſticatus* ſalivam cinnamomeo imbuit colore.

OR-

ORDO.

PENTANDRIA.

PISTACIA VERA. L.

Pistacia. Ph. Pistazie, Pimpernüßlein. Pistacý, klokočka.

Pistacia. MAS. Amenti. *Cal.* 5—fidus. *Cor.* o. FEM. distincta. *Cal.* 3—fidus. *Cor.* o. *Styli* 2. Drupa monosperma.

P. Vera. Fol. impari—pinnatis: foliolis subovatis recurvis.

Exotica. Arbor.

Off. Nuclei.

FORMA. *Nux* ossea, alba, glabra, basi macula oblonga, rugoso—spongiosa, albidiore; *nucleo* amygdalino, albido—viridscente, obducto tunica albida, sæpe subfusca.

PROPRIETAS. *Nuclei*: *Odor* nullus; *Sapor* amygdalinus, dulcescens, subpinguisculus, subbalsamicus; *masticati* teneri, comminuuntur, saliva emulsiva.

COMPOSITA. Morsuli Imperatoris.

PISTACIA LENTISCUS. L.

Lentiscus. Mastiche. Ph. Mastixbaum. Lentyssius, mastixowý strom.

P. Lentiscus. Fol. abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis.

Exotica. Arbor.

Off. Lignum. Resina (Mastiche vulgo.)

Forma. *Lignum* siccum difficile fractu, ponderosum, extus cinereum, intus album. *Resina* solida, pallide lutescens, homogenea, in lachrymis ovatis lævibus, diaphanis, magnitudine varia, a seminis canabini ad Fabæ magnitudinem, superficie plerumque undique subopaca, fragilis: fracturis planis, instar gemmæ pellucidis, nitentibus, vitriformibus.

Proprietas. *Ligni* : *Odor* non ingratus; *Sapor* adstringens. *Resinæ odor* balsamicus; *masticata* Mastix subfriabilis, & inter mandendum colligitur, coit in massam siccam, subrigidiusculam albam, ceræ albæ similem, non solubilem.

Composita. *Rec.* Candelæ Fumales.

Emplastrum defensivum rubrum. — Diabotanon. — de Labdano. — Oxycroceum. — ad Rupturas. — Vesicatorium.

Oleum Viride.

Pilulæ de Succino Crotonis.

Pulvis Fumalis ordinarius. — Specierum Hieræ Picræ.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus. — Matricalis.

Tinctura Mastiches composita.

Unguentum Digestivum.

Ca-

CANNABIS SATIVA. L.

Cannabis. Ph. Hanf. Konopě, semenec.

Cannabis. MAS. *Cal.* 5 —partitus. *Cor.* o.

FEM. *Cal.* 1—phyllus, integer, latere hians. *Cor.* o. *Styli* 2. *Nux* 2 — valvis, intra calycem clausum.

Colitur. Annua.

Off. Semen.

FORMA. *Semina* ovata, utrinque compressiuscula, undique testacea, lævia, nitidiuscula, utrinque obtusa, sed altera extremitate excavata linearum 2 longitudine, margine utrinque prominulo pallidiore; *parencymate* cotyledoneo, albo, pinguiusculo, bipartibili, intra crustam corticalem siccam, fragilem, obvelato pellicula fuscescente.

PROPRIETAS. *Odor* vix ullus; *Sapor* subfatuus.

ORDO.

HEXANDRIA.

SMILAX SARSAPARILLA. L.

Sarsaparilla. Ph. Sassaparille. Sarsaparylle kořen neb Wlaské hřjwy kořen.

Smilax. MAS. *Cal.* 6 — phyllus. *Cor.* o.

FEM.

Fem. *Cal.* 6 — phyllus. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Bacca* 3 — locularis. *Sem.* 2.

S. Sarſaparilla. Caule aculeato angulato, fol. inermibus ovatis retuſo — mucronatis trinerviis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

Forma. *Sicc. Fibræ* radicis longiſſimæ plurimum ulnarum, craſſitie pennæ anſerinæ, teretes, longitudinaliter undique ſulcatæ, flexibiles, cortice tenui rubicundo — cineraſcente, fibrillis ſparſis, filiformibus, breviuſculis, ſubramoſis; *parencymate* albo, farinaceo, ſicco ſubinquinante, intra corticem; tum ſubligneo: medulla ſubfarinacea, alba, compacta; poſt ſectionem tranſverſalem notato centro medullari albo, *majuſculo*, obducto annulo ferrugineo, undique punctato; circumdato margine albo.

Proprietas. *Odor* vix ullus; *Sapor* debilis, ſubamaricans; *maſticata* ſicca, ſub maſticatione ſolvitur ſubſtantia farinoſa, & ſubmucilaginoſa ſentitur, remanet lignea pars tenax.

Composita. Species Decocti Lignorum.

Smilax china. L.

China nodoſa. Ph. Chinawurzel. Kořen chyny.

S. China. Caule aculeato teretiuſculo fol. inermibus ovato — cordatis quinquenerviis.

Exotica. Perennis.

Off. Radix.

For-

Forma. *Sicc.* *Radix* ovato oblonga, compressiuscula, palmaris vel ultra, nodulosa, ponderosa, obducta cortice tenui rubicundo—bruneo; *parencymate* solidiusculo, pallide rubicundo post sectionem transversalem æquali.

Proprietas. *Odor* nullus; *Sapor* vix ullus; *masticata* sicca, duriuscula, comminuitur.

Composita. Essentia Lignorum.

Species Decocti Lignorum.

ORDO.

OCTANDRIA.

* Populus nigra. l. (*a*)

Populus. Ph. Pappelbaum. Topol.

Populus. Mas. Amenti. *Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, obliqua, integra.

Fem. Amenti. *Cal.* & *Cor.* maris. *Sem.* multa, papposa.

P. Nigra. Fol. deltoidibus acuminatis serratis. Exotica. Arbor excelsa.

Off. Gemmæ recentes (Oculi vulgo.)

Forma. *Rec.* *Gemmæ* majusculæ, ovato—oblongæ, acutæ spadiceæ, imbricatæ: squamis firmis, oblongis, concavis.

Pro-

a) Bergio loco hujus Populus Balsamifera. L.

PROPRIETAS. Gemmæ, tempore vernali tumidæ, ſimul ac inter digitos comprimuntur, balſamum limpidum, ſpiſſiuſculum, aurei coloris largiter fundunt, *Odore* fragrante, vere gratiore æſtate ingratiore, fere Rhei veri, *Sapore* ſubaromatico, amaricante, calidiuſculo.

COMPOSITA. Unguentum Mendicorum. — Populeum.

ORDO

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS ANNUA. L.

Mercurialis. Ph. Bingelkraut. Merkuryalis, neb planá bazalička.

Mercurialis. MAS. *Cal.* 3 — partitus. *Cor.* o. *Stam.* 9 — ſ. 12. *Antheræ* globoſæ, didymæ.

FEM. *Cal.* 3 — partitus. *Cor.* o. *Styli* 2. *Caps.* dicocca. 2 — locularis, 1 — ſperma.

M. Annua. Caule brachiato, fol. glabris, flor. ſpicatis.

Indigena. Annua.

Off. Herba.

FORMA. *Caulis* erectus, pedalis, glaber, geniculatus; internodiis compreſſis, alternis; late-

ri-

ribus 2 oppoſitis compreſſiuſculis; 2 aliis oppoſitis planis, angulatis, carina longitudinali. *Rami* ad genicula, ſtriato — ſulcati, oppoſiti, ſuperne folioſi. *Folia* oppoſita, petiolata ovata, obtuſiuſcula, margine obtuſe ſerrata, minutim ciliata, utrinque glabra, lucidiuſcula, nervoſa, vix bipollicaria, patentia. *Petioli* ſemiteretes, ſupra canaliculati, glabri. *Stipulæ* 4 ad genicula, utrinque binæ, oppoſitæ, parvæ, lanceolatæ, concaviuſculæ, erectæ ſubmembranaceæ.

Proprietas. *Rec. Odor* graveolens, fœtidus; *Sapor* ingratus, amaricans, ſubſalſus.

Præparata. *Succ.* Mel Mercurialis herbæ.

ORDO

MONADELPHIA.

Juniperus sabina. L.

Sabina. Ph. Sewenbaum, Sedel oder Sadelbaum. Sawina neb kláſſterſká chwogka.

Juniperus. Mas. Amenti Calyx ſquamæ. *Cor.* 0. *Stam.* 3.

Fem. *Cal.* 3 — partitus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Bacca* 3 — ſperma, tribus tuberculis calycis inæqualibus.

J. Sa-

J. Sabina. Fol. oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis.

Hortensis. Arbuscula.

Off. Frondes. (*a*)

FORMA. *Rec. Frutex* ramosus, diffusus, 3 — vel 4 pedalis, vel ultra. *Rami* fuscescentes, teretes, sparsi, valde ramulosi: ramulis tectis squamis emarcidis, e foliis emortuis, subimbricatis; *teneri* ramuli, distiche patentes, virides, tecti *foliis* acerosis, alternatim opositis, linearibus, acutis, 2 lineas longis, convexis, medio dorso obsoolete sulcatis, glabris sessilibus, longitudinaliter adpresso—adnatis, apicibus liberis verum latere utrinque adpressiusculis; *tenerimi* vero ramuli imbricati foliolis consimilibus, sed duplo minoribus.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* fœtidus, gravis, fortis; *Sapor* amaricans, gravis.

PRÆPARATA. Aqua.

Oleum destillatum.

COMPOSITA. Pulvis fumalis Arthriticus.

JUNIPERUS COMUNIS. L.

Juniperus. Ph. Wacholder, Kranowet. Galowec.

J. Communis. Fol. ternis patentibus mucronatis, baccæ longioribus.

Indigenus. Arbuscula.

Off. Lignum. Baccæ virides & maturæ. Resina (vulgo Gummi Sandarac.).

a) Herbæ aut folii nomine etiam insigniuntur.

Forma. *Caulis* fruticosus, diffusus. *Frutex* altitudine plurimum pedum, sæpe arborescens, caule crassitie brachii vel ultra. *Rami* teretes, patuli, cortice tecti subolivaceo, læviusculo, squamoso. *Rami* ad angulum rectum fere patentes, sparsi, vix determinati, inæquales, squamosi; *Surculi* tenelli viridescentes, glabri, articulati; internodiis triquetris; angulis subsuccosis, glabris, rotundatis, superne attenuatis. *Baccæ* laterales in ramulis, solitariæ, subsessiles s. brevissime pedunculatæ: pedicello crasso, undique imbricato squamis ovato—acutis, adpressiusculis; magnitudine seminis Pisi, nigro—violaceæ, globosæ, glabræ, lucidiusculæ, apice instructæ macula subrotunda, subrugosa, sulcis tribus, trifariam spectantibus; *peroncymate* constante e pulpa spongioso—subsucculenta, ferruginea, tenuiuscula, intra corticem papyraceum. *Semina* 3, majuscula, hinc plana, inde convexa, in hemisphærium conniventia, intra pulpam. *Resina* pallide lutescens, homogenea, facie vitri, fere Mastiches, solida, diaphana, in lachrymis oblongis subpollicaribus, subcylindricis, compressiusculis, lævibus, sæpe rugosis; fragilis, subfriabilis: fracturis planis, instar vitri pellucidis, nitentibus.

Proprietas. *Summit. rec. Odor* gratus, balsamicus; *Sapor* balsamicus, vix amaricans. *Bacc. Odor* gratus balsamicus; *Sapor* dulcis, aromaticus,

cus, calidiusculus, odori consentaneus. *Sem.* *Odor* debilis; *Sapor* aromaticus, non dulcis; *masticata* fragiliuscula, sicciuscula. Baccæ non maturantur nisi bienni spatio, tota prima æstate virides sunt. *Resinæ* *Odor* balsamicus, gratus, fere Mastiches, sed paullo fortior; *Sapor* debilis; masticata inter dentes friabilis comminuitur in pulverem tenuissimum & masticatione non coit.

PRÆPARATA. *Bacc. virid.* Aqua.
Oleum destillatum.
Spiritus.
Bacc. matur. Roob.

COMPOSITA. *Lign.* Species Decocti Lignorum.
Bacc. virid. Oleum Viride.
Pulvis Fumalis Arthriticus. — Vitæ.
Unguentum Nervinum.
Bacc. mat. Electuarium seu Theriaca Diatessaron.
Res. Pilulæ Balsamicæ Stahlii.
Pulvis Fumalis ordinarius.
Ol. Unguentum Nervinum.
Roob. Electuarium Purgans, seu Hydragogum.

JUNIPERUS LYCINA. L.

Olibanum. Thus. Ph. Weihrauch. Kadidlo.

J. Lycina. Fol. ternis undique imbricatis ovatis obtusis.

Exotica. Arbor. Off.

Off. Resina.

FORMA. *Gummi — Resina* pallide lutescens s. rubicunda, in lachrymis majoribus ovato – oblongis, utrinque obtusis, magnitudine seminis Fabæ vel ovi columbini, solitariis vel geminis, sæpe pluribus aggregatis, lævibus, subopacis; fragilis: fracturis planiusculis. Vilior *varietas* occurrit in massa majuscula, marmorea.

PROPRIETAS. *Odor* balsamicus resinosus; *Sapor* balsamicus, subamaricans; *masticata* comminuitur, emollitur, dentibus adglutinatur, alba fit, solvitur lente: solutione lactescente.

COMPOSITA. Candelæ Fumales.

Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Emplastrum defensivum rubrum. — Diabotanon. — Diapompolygos, hoc pro Unguento Diapompoligos. — Oxycroceum. — ad Rupturas.

Oleum Viride.

Pilulæ de Cynoglosso. — de Styrace.

Pulvis Fumalis Arthriticus & ordinarius. — Vitæ.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus. — Matricaris.

Tinctura sive Balsamum Comentatoris. — Mastiches composita.

Unguentum Digestivum.

OR-

ORDO SYNGENESIA.

RUSCUS ACULEATUS. L.
Ruſcus. Ph. Mausdorn. Leſnj myrtus, gedli-ce Wlaſká.
Ruſcus. MAS. *Cal.* 6—phylus; *Cor.* o. *Nectarium* centrale, ovatum, apice perforatum.

FEM. *Calyx*, *Corolla* & *Nectarium* maris. *Stylus* 1. *Bacca* 3—locularis. *Sem.* 2.

R. Aculeatus. fol. ſupra floriferis nudis.
Exoticus. Suffrutex.

Off. Radix.

FORMA. *Sic. Radix* facie radicis aſparagi, cylindrica, ſubrotunda, cineraſcens, ſibris pluribus cylindricis, deſcendentibus, elongatis, frequentibus, cineraſcentibus.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* nullus; *Sapor* graviuſculus, ſubamaricans.

COMPOSITA. Radices V aperitivæ. Hæc pro Speciebus Decocti aperitivi.—Syrupo ſ rad. aperientium.

* RUSCUS HYPOGLOSSUM. L.
Uvularia. Ph. Zäpfleinkraut. Cžjpkowá bylina.
R. Hypogloſſum. Fol. ſubtus floriferis ſubfolioſis.
Indigenus. Suffrutex.

Off. Folia raro.

FOR-

Forma. *Rec.* *Folia* ſparſa, ſæpe gemina, ovato — oblonga, acuta, in petiolos breves deſinentia, virideſcentia, venuloſo—reticulata, integerrima, bipollicaria, patentia, utrinque glabra, nitidiuſcula.

Proprietas. *Odor* nullus; *Sapor* amaricans, acriuſculus.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

ORDO

MONOECIA.

Veratrum album. L.

Helleborus albus. Ph. Weiſſe Nieſswurzel. Ellebor, neb čemeřice, anebo keychawka bjlá.

Veratrum. Hermaphrod. *Cal.* o. *Cor.* 6—petala. *Stam.* 6. *Piſt.* 3. *Caps.* 3. polyſpermæ.

Mas. *Cal.* o. *Cor.* 6—petala. *Stam.* 6. *Piſt.* rudimentum.

V. Album. Racemo ſupradecompoſito, corollis erectis.

Indigenum & Hortenſe. Perenne.

Off. Radix.

Forma. *Rec. Radix* carnoſa, fuſiformis, digitalis, albido — ſubluteſcens, undique inſtructa fibris teneribus, longis; *Sicc.* occurrit fibris reſectis undique ſcabra, cinerea; *parencymate* ſolido pallide cinereo, poſt ſectionem tranſverſalem undique punctato.

Proprietas. *Odor rec.* ingratus; *Sapor* recent. & ſicc. nauſeoſus, acerrimus, diu inhærens; *maſticata* fauces adurit.

Composita. Unguentum ad Phthiriaſim ſeu contra pediculos.

An Veratrum sabadilla? Phar. P. (*a*) Sabadilla. Ph. Sabadille, Capucinerſaamen. Sabadylla neb kapucinſké ſemeno.

Exotica.

Off. Semen.

Forma. *Sicc. Capſulæ* tres æquales, tereti-uſculæ, acutæ, ſemiunguiculares, glabræ, bivalves, latere interiore longitudinaliter dehiſcentes, uniloculares, ſubdiſpermæ. *Semina* oblonga, ſubcylindrica, propria tunica obvelata.

Proprietas. *Odor* vix ullus; *Sapor* capſulæ ipſius nullus, ſed ſeminum amariſſimus, & acerrimus: acrimonia diu inhærente. Inter maſticandum

a) Veratrum quod Mexicanum Sabadilli ſemen. VANDERBECK Act phyl. med. A. N. C. vol. I. app. p. 126. vide Berg. pag. 822.

dum linqua & fauces ſubito afficiuntur acrimonia cauſtica, & valde pungente, ſed ſub maſticationis fine aliquid etiam ſubdulcis inter amarum prominet. Acerrimus ſtimulus durat poſtea ſatis diu, etiamſi fauces aqua frigida probe eluuntur, cum ſenſu intermixto ſubdulci ſaporis. *Bergio* maculam excoriatam in lingua fecerunt ſemina quæ paullo diutius perſtabat.

COMPOSITA. Unguentum ad Phtiriaſim ſeu contra pediculos (*a*)

PARIETARIA OFFICINALIS. L.

Parietaria. Ph. Tag: und Nacht. Den a noc, ſtlenná bylina.

Parietaria. HERMAPHROD. *Cal.* 4—fidus. *Cor.* o. *Stamina* 4. *Styl.* 1. *Semen* 1, ſuperum, elongatum.

FEM. *Cal.* 4—fidus. *Cor.* o. *Stam.* o. *Stylus* 1. *Stamen* 1. ſuperum, elongatum.

P. Officinalis. Fol lanceolato—ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis.

Indigena. Perennis.

Off. Herba.

FORMA. *Rec. Caulis* teres, pedalis vel ſupra, undique ſtriatus, pubeſcens, inferne ramoſus. *Rami* alterni, erecti, ſimplices. *Folia* alterna, petiolata, ovata, acuta, utrinque attenuata, integerrima,

(*a*) Quod ex Religioſis quidam capſulas Delphinii elati in hunc ſcopum optato ſucceſſu adhibeant, in evictis eſt.

rima, ſupra ſaturate viridia, lucida, rugoſa, ſubtus venis pubeſcentia, luci expoſita undique punctata, bipollicaria vel ultra, patentia. *Petioli* pallidi, ſtriati, ſupra canaliculati, minutim pubeſcentes.

PROPRIETAS. *Rec. Odor* nullus; *Sapor* herbaceus in Urticam incidens.

MIMOSA NILOTICA. L.

Acacia vera. Ph. Arabiſcher Schottendorn. Egiptſké trnky.

Mimoſa. HERMAPHROD. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor* 5 — fida. *Stam.* 5 ſ. plura. *Piſt.* 1. Legumen.

MAS. *Cal.* 5 — dentatus. *Cor.* 5 — fida. *Stam.* 5, 10. plura.

M. Nilotica. Spinis ſtipularibus patentibus, fol. bipinnatis; partialibus 8 — jugis, ſpicis globoſis ſeſſilibus.

Exotica. Arbor.

Off. Succus inſpiſſatus. Gummi arabicum quod tamen raro ad nos adfertur, ſed ejus loco habetur Gummi Senegal ex Mimoſa Senegal L. de qua paullo infra.

FORMA. *Gummi* in fruſtulis ſubrotundis vel hemiſphæricis, magnitudine ovi columbini vel nucis juglandis extus ſubrugoſum rufeſcens diaphanum; *parencymate* pellucido, luteſcente, facie

Ad Mimoſæ Species etiam amandatur Terra Catechu juxta recentiores; vide Murray. Appar. Med. T. II. pag. 425.

cie vitri colorati, ſplendente, fragili: fracturis planis.

M. Senegal. Spinis ternis: intermedia reflexa, fol. bipinnatis, flor. ſpicatis.

FORMA. *Gummi* in fruſtulis majoribus, ſæpe magnitudine pomi minoris, ſubrotundatis vel hemiſphæricis, præcedenti magis pallidum, colore albo, ſubcitrino, ſuperſſicie rugoſa; *parencymate* facie vitri, diaphano, fragili: fracturis pariter planis.

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* nullus; *maſticatum* inter dentes primo duriuſculum, fragile; dein ſubemollitur, dentibus adhæret, tandem ſolvitur.

COMPOSITA. Electuarium Diaſcordii. — Elect. ſeu Theriaca Andromachi.

Paſta de Althæa.

Pulvis Haly.

Species Diatragacanthæ, hæc pro Pulvere Diaireos.

ORDO

DIOECIA.

FRAXINUS EXCELSIOR. L.

Fraxinus. Ph. Eſche, Eſchenbaum. Geſen.

Fraxinus. HERMAPHROD. *Cal.* o. f. 4 — partitus; *Cor.* o. f. 4 — petala. *Stam.* 2. *Pist.* 1. *Sem.* 1, lanceolatum.

FEM. Pist. 1. lanceolatum.

F. Excelsior: Fol. serratis, flor. apetalis. Indigenus. Arbor.

Off. Cortex. (Semen raro.)

FORMA. *Rec. Cortex* ramulorum extus olivaceus s. brunneus, lævis punctis elevatis pallidioribus, sparsis, intus pallide cinereus. *Semen* pendulum, linguæ avis simile, ita ut fructum in officinis vocant.

PROPRIETAS. *Rec. Cort. Odor.* nullus; *Sapor* acerbus. *Sem. Odor* nullus; *Sapor* acris aromaticus, sapori corticis peruviani non quidem similis sed & multo acrior.

FRAXINUS ORNUS. L.

Manna. Ph. Manna, Mannaschbaum. Manna.

F. Ornus. Foliolis serratis, flor. corollatis. Exotica. Arbor.

Off. Succus nativus, seu Substantia gummoso — mellea.

FORMA. *Succus* melligenus, exsiccatus, facie mellis crystallisati, subfriabilis, albido — lutescens, occurrens vel in frustulis solidis, oblongis, subtubulosis, molliusculis, fragilibus: fracturis granulatis, albidioribus; vel in frustulis laxe conglomeratis, mollibus, plasticis, fragiliusculis.

PRO-

Proprietas, *Odor* nullus; *Sapor* melligenus, dulcis, ſubaceſcens; *maſticata* primum ſubfarinoſa ſentitur: inter dentes molliter ſubarenuloſum quid mentitur, mox ſolvitur, acuteque ſapidus evadit.

ORDO

TRIOECIA.

Ceratonia siliqua. L.

Siliqua dulcis. Ph. St. Johannesbrod, Bocksʰörnel. Sw. Jana chléb.

Ceratonia. Hermaphrod. *Cal.* 5 — partitus. *Cor.* nulla. *Stamina* quinque. *Stylus* filiformis. *Legumen* coriaceum, polyſpermum.

Dioica. *Maſ.* & *Femina* diſtincta.

Exotica. Arbor.

Off. Fructus.

Forma. *Sicc. Legumen* palmare vel ultra, undique fuſco — bruneum, glabrum, nitidiuſculum, lineare, latitudine apicis digiti, obtuſum cum puncto convexo, multiloculare; *parencymate* leguminis pulpoſo: pulpa ſiccata rufa. *Semina* ſolitaria in ſingulo loculamento, ovato, obtuſa, glabra.

Pro-

PROPRIETAS. *Odor* nullus; *Sapor* dulcis melligineus; *masticata* siliqua sicca, fragiliuscula, comminuitur, extrahitur pulposum: saliva rubicunda. Siccatæ siliquæ sapidiores quam recentes.

COMPOSITA. Syrupus de Siliquis seu Diacodii Liquidus; hic pro Electuario Infantum seu Requie Nicolai, & Pilulis Balsamicis Mortoni.

Syrupus de Siliquis sive Diacodii Crocatus.

FICUS CARICA. L.

Carica. Ficus. Ph. Feige. Fjky.

Ficus. Receptaculum commune turbinatum, carnosum, conivens, occultans, flosculos vel in eodem vel distincto.

MAS. *Cal.* 3 — partitus. *Cor.* 0. *Stam.* 3.

FEM. *Cal.* 5 — partitus. *Cor.* 0. *Pist.* 1. *Semen* 1.

F. Carica. Fol. palmatis.

Hortensis. Arbor.

Off. Fructus.

FORMA. *Rec. Bacca* magna, turbinata, e receptaculo carnoso orta, magnitudine fructus Pyri vel supra, colore viridi — lutescente vel violaceo, pro ingenio cujusque varietatis, nitidiuscula, apice obtuso — rotundata, undique striata, umbilicata: umbilico orbiculato, vix prominente, perforato, sed simul subclauso: squamis plurrimis, ovatis, acutis subcarnosis, glabriusculis subæqua-

æqualibus, imbricatis, adpressis; in bene vero matura bacca umbilicus hiat. *Parencyma* rite maturæ baccæ carnoso—succulentum, molle, rubicundum, centro cavo, intus undique vestito seminibus; *siccatæ* vero baccæ turgidum pulpa melligena, rubicunda, subdiaphana, tenaci, digitis se adglutinante, & referta *seminibus* numerosis, parviusculis, ovatis, obtusis, lutescentibus, dorso convexis, antice margine acutiusculo, compressiusculis, glabris, hilo marginali, prope apicem, punctato parvo.

Proprietas. *Rec. Odor* vix ullus; *Sapor* dulcis in cucumerinum leniter incidens masticata bacca recens mucilaginosa, solvitur qua majorem partem. *Sicc. Odor* subunguentarius; *Sapor* dulcis melligenus, odori consentaneus, gratus; Caricæ *masticatæ* glutinosæ; solvitur pulpa melligena, corticali parte molli, subpulposa, comminuenda.

Composita. Hydromel Infantum.
Species Decocti Pectoralis.

CLAS-

CLASSIS XIV.

CRYPTOGAMIA.

ORDO

FILICES.

ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. L.
Scolopendrium. Ph. Hirschzunge. Gelenj gazyk, psaný trank, Ceterák.

Asplenium. Fructific. in lineolis disci frondis sparsis.

A. Scolopendrium. Frond. simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipit. hirsutis.

Exoticum. Perenne.

Off. Herba.

FORMA. *Filix* stipite cylindrico, crassitie vix culmi secalini, palmari, glabro, hinc convexo, inde planiusculo, erecto apice scabro: squamis plurimis linearibus, acutis, ferrugineis. *Frons* integerrima, spithamæa, lanceolata, acuta, utrinque glabra, instructa nervis tenuibus, furcatis, subtransversalibus, parallelis, versus basim paullulum angustior, basi excavata. *Fructificationes* inversa pagina lineares, subtransversales, parallelæ, frequentes.

PRO-

Proprietas. *Rec. Odor* ingratus; *Sapor* acerbus; *ficcatione* odor prorſus perit.

Composita. Pulvis Vitæ.

Species Decocti Aperitivi.

Polypodium vulgare. L.

Polypodium. Ph. Steinwurzel, Engelſüß. Oſládyč.

Polypodium. Fructific. in punctis ſubrotundis, ſparſis per diſcum frondis.

P. Vulgare. Frond. pinnatifidis: pinn. oblongis ſubſerratis obtuſis, radic. ſquamata.

Iudigenum. Penenne.

Off. Radix.

Forma. *Rec. Radix* horizontalis, repens, cylindirca, craſſitie pennæ anſerinæ, undique tuberculata: tuberculis elevatis, truncatis, ſparſis, remotis; undique veſtita tegmine e ſquamis ferrugineis, emarcidis, lanceolatis, acutis, imbricatis; radicans fibris tomentoſis, ferrugineis, deſcendentibus, longitudinaliter diſpoſitis. *Parencyma* carnoſum; albidum, ſubrubeſcens, poſt ſectionem tranſverſalem æquale, punctis ſparſis.

Proprietas. *Rec. Odor* ipſius radicis nullus; tegminis vero mucoſus. *Sapor* prædulcis, remiſior quam Liquiritæ; *maſticata* comminuitur, dulcis ſentitur, ſed inſimul ſubamaricans.

Composita. Species Decocti Aperitivi.

Polipodium filix mas. L.

Filix Maſ. Ph. Farrenkraut. Kapradj.

P. Filix mas. Frond. bipinnatis : pinn. obtusis crenulatis, stipit. paleaceo.

Indigeno — Perenne.

Off. Radix.

Forma. *Rec. Radix* oblonga, crassa, subhorizontalis, undique extus conflata e bullis paralelis, approximatis, ovato—oblongis, acutis, nigricantibus, læviusculis, sive obtectis squamis paleaceis emarcidis, ferrugineis, oblongis, nudis, sive in stipites frondium se exserrentibus, ex ipsa radice protrusis. *Parencyma* subcarnosum, albido — lutescens, post sectionem transversalem notatum disco æquali, margine lobato.

Proprietas. *Rec. Odor* debilis, subnauseosus; *Sapor* substypticus, non ingratus, *masticata* comminuitur, linguæ imprimit saporem peculiarem, debiliter subaromaticum, vix dulcescentem acriusculum.

Adianthum capillus veneris. L.

Capillus Veneris. Ph. Frauenhaar. Zenský wlas.

Adianthum. Fructific. in maculis terminalibus sub replicato margine frondis.

A. Capillus Veneris. Frond. decompositis : foliol. alternis : pinn. cuneiformibus lobatis pedicellatis.

Indigeno — Perennis.

Off. Herba.

Forma. *Filix* magnitudine varia, palmaris, spithamæa, pedalis. *Stipes* longitudine frontis,

niger, glaber lucidus, filiformis, ſubangulatus, erectus. *Frons* decompoſita. *Rachis* e ſtipite continuato, ramoſa, ſtipiti concolor: *Folia* alterna. erecta, petiolata, cuneiformia, ovato—rotundata, inſtructa nervis parallelis, tenuibus, glabra, inferne longius producta, ſenſim anguſtiora, integra, ſuperne inciſo—lobata: lobis parallelis, apice crenatis. *Petioli* capillares, fuſci, læves. *Fructificationes* lunulatæ, marginales, in apice foliorum ſitæ, reflexæ, adpreſſiuſculæ.

Proprietas. *Odor* debilis; *Sapor* ſubdulceſcens, ſubadſtringens, leniter amaricans, non ingratus.

Præparata. Syrupus.

ORDO.

MUSCI.

Lycopodium clavatum. L.

Lycopodium. Ph. Bärlapp, Erdschwefel. Mechowé semeno.

Lycopodium. Anthera. bivalvis, ſeſſilis. *Caliptra* nulla.

L. Clavatum. Fol. ſparſis filamentoſis, ſpic. teretibus pedunculatis geminis.

In-

Indigeno — Perenne, Muſcus.

Off. Semen?

Forma. *Pollen.* (farina) farinaceum, ſub-luteſcens, tenue, inter digitos molliuſculum.

Proprietas. *Farinæ: Odor* nullus; *Sapor* nullus.

ORDO.

ALGAE.

Lichen islandicus. L.

Lichen Islandicus. Muſcus Sanguin. Ph. Blut-lungenmoos, Lungenſchwamm. (*a*) Gaternjk.

Lichen. Mas. *Receptaculum* ſubrotundum, pla-niuſculum, nitidum.

Fem. *Farina* foliis adpreſſa.

L. Islandicus. Foliaceus adſcendens lacinatus; marginibus elevatis ciliatis.

Indigeno — Perennis.

Off. Planta integra.

Forma. *Lichen* foliaceus, ſubcoriaceus, erectus, pallidus, ſubolivaceus, glaber, lacunuloſus, circiter palmaris, lævis, lacinatus: laciniis ſublinea-ribus,

a) *Sub.* hoc Titulo, & contra hujus viſceris morbos per ſæ-cula fere dixero jam celebris eſt hic lichen alpicolis mon-tium Giganteorum Bohemiæ,

ribus, obtusis, marginibus omnibus ciliatis; apice fusco — olivaceus. *Scutella* orbiculata, integerrima, supra folium posita, plana, solitaria.

Proprietas. *Odor* nullus; *Sapor* leniter amaricans; *masticatus* emollitur, comminuitur, vix acris.

Lichen pulmonarius. L.

Pulmonaria arborea. Ph. Baumlungenmoos. Plicnjk stromowý.

L. Pulmonarius. Foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunulosus; subtus tomentosus. Indigeno — Perennis.

Off. Planta integra.

Forma. *Lichen* foliaceus, coriaceus, supra lacunosus: lacuniis retiformibus; viridis, glaber, sæpe exasperatus verucis parvis, in eminentiis inter lacunas sitis; subtus bullatus, leniter tomentosus, viridescens, sed bullis pallidioribus, albidis, glabriusculis; lacinatus: laciniis lanceolatis, obtusis, sublacinatis. *Scutella* orbiculata, plana, marginalia.

Proprietas. *Odor* debilis; *Sapor* debilis, mucidus, subnauseosus, acriusculus; *masticatus* emollitur in ore, difficilius comminuitur, acriusculus sentitur, remanente acri sensu & mordente in faucibus, diu inhærente.

OR-

ORDO.

FUNGI.

BOLETUS LARICIS. L. *(a)*
Agaricus Albus. Ph. Weiſſer Lerchenſchwamm.
Bjlá dřjnowá hauba.
Boletus. Fungus horizontalis, ſubtus poroſus.
Exoticus ſupra Larices.
Off. Fungus decoriatus.

FORMA. B*oletus* ſeſſilis, ſubrotundus, convexo — planus, magnitudine pugni, ſæpe capitis infantis ex annulis albidis luteſcentibus & fuſcis variegatus, lævis, ſubtus poris innumeris pertuſus. In officinis occurrit purgatus & undique circumſectus, unde albus læviuſculus. *Parencyma ſicc.* album, ſiccum, æquale, ſpongioſum, ſubfarinaceum, friabile, inquinans.

PROPRIETAS. *Odor* vix ullus; *Sapor* dulceſcenti — amarus, nauſeoſus, inquinans.

COMPOSITA. Electuarium ſeu Theriaca Andromachi.

Exractum Catholicum. — Panchimagogum.

Pi-

a) In pulcherrima Diſſertatione D. Rubel Viennæ habita de Agarico officinali evincitur, fungum hunc ſaltem eſſe notabilem varietatem Boleti igniarii, ſi non diverſam omnino ſpeciem.

Pilulæ de Succino Cratonis.
Species Decocti aperitivi.

* Boletus igniarius. L.

Agaricus Chirurgorum. Ph. Feuerschwamm. Dubowá hauba, koterče.

B. *Igniarius*. Acaulis pulvinatus lævis, poris tenuissimis.

Indigenus.

Off. Fungus parasiticus in Betulis & Quercubus frequens.

Forma. *Sicc.* & *præparat.* *Fomes* coriaceus, mollissimus, lenissimus, viridescens, consistentia coriaceo—tomentosa. Boletus, qui in Fragorum truncis crescit, mollissimus fit dum præparatur.

Proprietas. *Odor* nullus, neque *Sapor*.

Peziza auricula. L.

Auricula Judæ. Fungus sambuci. Ph. Holderschwamm. Bezowá hauba.

Peziza. *Fungus* campanulatus, sessilis.

P. Auricula. Concava rugosa auriformis. Elevata sessilis membranacea rugosa & crispa, forma concava.

Indigena supra arbores putridas. (*a*)

Off. Fungus integer.

a) Quot annis in magna copia crescit in vaporariis horti Botanici super corticibus lignorum, quibus fimus equinus tegitur, & quibus ollæ pro parte imerguntur.

Forma. *Rec. Fungus* ſeſſilis, umbilicatus, concavus, campanulatus, ſæpe explanatus, magnitudine circiter ovi gallinacei, baſi plicatus, ſuperne margine integro terminatus, extus minutiſſime tomentoſus, intus lævis, conſiſtentia gelatinoſo — cartilaginea, undique Kermeſinus ſ. purpuraſcens.

Proprietas. *Rec. Odor* vix ullus; *Sapor* nullus; *maſticatus* comminuitur, ſubcartilagineus ſentitur, vix ſolvitur. *Siccatus* fit ſatis tenuis, cineraſcens, fragilis, rugoſus, qui maſticatus gelatineſcit. In aquam tepidam immiſſus brevi emollitur, expanditur, & eandem, quam recens habuerat, reſumit formam, conſiſtentiam & colorem.

* Lycoperdon bovista. l.

Crepitus lupi. Ph. Boſiſt, Bubenſiſt.

Lycoperdon. Fungus ſubrotundus. *Seminibus* farinaceis repletus.

L. Boviſta. Subrotundum: lacerato — dehiſcens.

Indigenus in campis ſterilibus.

Off. Fungus cum polline.

Forma. *Rec. Fungus* ſubrotundus, ſtipitatus, læviuſculus, magnitudie varia; *parencymate* ſpongioſo — ſucculento, niveo. *Siec.* lævis, ſiccus, lividus; parencymate ſpongioſo, pulverulento: pulvere brunneo, inquinante, ſicciſſimo, in auras obvolitante, dum fungus comprimitur. Si fungus hic ſiccatus pedibus calcatur, crepitum edit,

&

& fumum emittit pulverulentum. In ſolo propingui, aere pluvioſo, in enormem perbrevi tempore excreſcere poteſt magnitudinem, ut obſervavit CL. BENEDIC. BERGIUS, qui hujuſmodi fungum habuit, cujus ambitus 2 ulnis & 3 digitis reſpondit, cujusque gravitas 18 librarum ſvec. modum exceſſit.

PROPRIETAS. *Sicc. Odor* nullus, neque *Sapor.*

APPENDIX.

PALMAE.

PHENIX DACTYLIFERA. L.

Dactylus. Ph. Datteln. Datle.

Phenix. MAS. *Cal.* 3 — partitus. *Cor.* 3 — petala. *Stam.* 3.

FEM. *Cal.* 3 — partitus. *Cor.* 3 — petala. *Piſt.* 1. *Drupa* ovata.

P. Dactylifera. Frond. pinnatis : foliolis complicatis enſiformibus.

Exotica. Arbor. Palma.

Off. Fructus.

FORMA. *Sicc. Drupa* cylindrica, ſæpe conica, pollicaris, pollicis craſſitie, apice obtuſo — rotundata, tuberculo terminata, rubicunda, ſubdia-

diaphana, glabra basi truncata, sæpe subalbida (sc. ubi calyce tecta fuit) unilocularis. *Nucleus* cylindricus, osseus, extus cinereo — brunneus, intus plumbeo — subviolaceus, solidus utrinque obtusus, undique minutim rugosus, læviusculus tamen, subtuberculatus, dorso convexo — teres, hilo progerminante orbiculato, depressiusculo in medio dorsi, antice fusco longitudinali profunde exaratus. *Parencyma* drupæ pulposum, melligeneum, crassitie lineæ vel ultra, pariete interiori, nucleum spectante vestitum tunica tenera, nivea, subsplendente, membranacea, sub qua latet substantia alba, minutissime spongiosa, subpulposa.

PROPRIETAS. *Sicc. drupæ* : *Odor* nullus; *Sapor* melligenus, dulcissimus; *masticata* drupa solvitur in ore, excepta tunica interiore, quæ emollitur quidem, sed tenax fit, & ægre comminuitur.

ARECA CATECHU. L.

Catechu. Terra Japonica. Ph. Catechu. Katechu.

Areca. MAS. *Cal*. *Cor*. 3 — petala. *Stam*. 3.
FEM. *Cal*. *Cor*. 3 petala, *Drupa* calyce imbricato.

A. Catechu. Frond. pinnatis: foliolis replicatis oppositis præmorsis.

Exotica. Arbor. Palma.

Off.

Off. Succus inſpiſſatus. An potius e Mimoſæ ſpecie? (a)

Forma. *Gummi Reſina* in fruſtulis majoribus, fuſco—nigra, nitidiuſcula, dura, fragiliuſcula, homogenea, ſæpe ligni ramentulis conſpurcata, fragilis: fracturis irregularibus; in pulverem facile reſolubilis: pulvere brunneo—rubro.

Proprietas. *Odor* nullus; *Sapor* ſubſtipticus, dein amaricans, poſtea ſubdulceſcens; *maſticata* inter dentes dura, fragilis, comminuitur, ſolvitur: ſaliva rubra.

Præparata. Eſſentia.

FRUCTUS.

Myristica. L.

Moſchata Nux. Ph. **Mußkatnuß, Muſſkátowa kulka.**

Exotica. Arbor ignota!

Off. Fructus.

Forma. *Drupa* magnitudine fere ovi gallinacei, pedunculata, axillaris, ſubſolitaria, ſubrotunda vel turbinata, glabra, gilva, utrinque longi-

a) Mimoſa (Catechu) ſpinis ſtipularibus geminis diſtinctis, foliis bipinnatis, utrinque multijugis, ſpicis geminis axillaribus cylindricis. Phar. Svec.

gitudinaliter ſulcata, tandem bivalvis, ſulcis dehiſcentibus; *parencymate* carnoſo, albicante, repleto ſucco tenui, ſeroſo, ſapore auſtero, ſtyptico, minime eduli. *Nux* ſubrotunda, decidua, intra valvulas drupæ dehiſcens, magnitudine ovi columbini vel ultra, fuſca, ſcabriuſcula, inſcripta ſulcis longitudinalibus, ſubreticularis; *teſta* dura, craſſitie lineæ dimidiæ, fragilis: fracturis fuſcis, nitidiuſculis, ſuperne obvelata tunica (Macis dicta) membranaceo pulpoſa, pinguiuſcula, teſtæ adpreſſæ adhærente, undique glabra; recente ſanguinea, ſiccata luteſcenti — coccinea, fragili, multifida: laciniis linearibus, ſingulis apice multifidis, acutis, inflexis. *Nucleus* (Nux Moſchata) liber intra teſtam, bruneo — cineraſcens, ſubrotundus, magnitudine Pruni minoris, utrinque obtuſis, læviuſculis, reticulatus ſulcis, quorum longitudinales validiores; *parencymate* recentis carnoſo, pingui, oleum plorante ex acu intruſo; *ſiccati* vero ſolido, duriuſculo, ſubfragili, poſt ſectionem tranſverſalem cinereo, undique picto venis fuſcis, longitudinalibus, inæqualibus.

Proprietas. *Nucis Myriſt. Odor* fragrans gratus; *Sapor* pinguiuſculus, aromaticus, odori congruens, calidus; *maſticata* inter dentes friabilis, facile comminuitur, ſolvitur fere in ore, calet in faucibus. *Macis odor* nucis Myriſticæ, verum

rum fortior; *Sapor* nuce fortior, magis aromaticus, magis calidus, vix ſubamaricans; *maſticata* ſubito emollitur, comminuitur, inter dentes ſubpulpoſa ſentitur, ſed non ſolvitur; calet in faucibus.

PRÆPARATA. *Nux* Oleum deſtillatum & preſſum.

MACIS. Eſſentia.

Oleum deſtillatum.

COMPOSITA. NUX. Acetum antiſepticum.

Aqua Embryonis. — Meliſſæ composita.

Elixirium Vitrioli.

Emplaſtrum de Labdano.

Pulvis dentifricius albus. — Specierum Aromaticarum. — pro Morſulis Imperatoris.

Spiritus Aromaticus. — Balſamicus vulgo Schauerianus.

Ol. preſ. Balſamum Appopleҫticum. — Caryophyllorum. — Saxonicum.

MACIS. Aqua Embryonis. — Hyſterica fœtida.

Eſſentia Abſinthii compoſita. — Carminativa.

Pulvis Vitæ.

Ol. Balſamum Saxonicum.

Eſſentia ſive Balſamum Vitæ Hoffmanni.

Liquor ſeu Sal volatilis oleoſus.

GUMMATA.

PERUIFERA. L.

Balſamum Peruvianum. Ph. Schwarzer Peruwianiſcher Balſam. Peruwſký balſam.

Exoticum.

Off. Balſamum. An arte compoſitum? Ita ex aliis.

FORMA. *Reſina* liquida, lente fluida, obſcure rubra, conſiſtentia ſyrupi ſpiſſi vel Terebinthinæ, in calore ignis fluidior, diaphana ſi vitro illinita, alias opaca.

PROPRIETAS. *Odor* fragrans, exacte ſiliquæ Vanillæ; *Sapor* balſamicus, pinguiuſculus, amaricans, acriuſculus, odori congruens.

COMPOSITA. Balſamum Apoplecticum.
Ceratum pro Ceraturis balſamicis.
Emplaſtrum de Labdano.
Eſſentia ſive Balſamum Vitæ Hoffmanni.
Pilulæ Balſamicæ Mortoni
Tinctura Balſamica. — Tinct. ſive Balſamum Commentatoris.

AMMONIACUM. L.

Ammoniacum. Ph. Gummi Amoniak. Amonyak.

Exoticum.

Off. Gummi — Reſina.

FOR-

Forma. *Gummi—resina* ſolida, in fruſtis majoribus, lucidiuſcula molliuſcula in calore & plaſtica, in frigore fragilis; virideſcens, variegata: maculis ſ. glandulis inæqualibus, albidis, homogeneis, læviſſimis, nitidiuſculis.

Proprietas. *Odor* fragrans, gravis in Galbanum incidens; *Sapor* americans, graviuſculus, acriuſculus, inhærens; *maſticata* emollitur, dentibus ſubadhæret, præcipue glanduloſa pars, alba evadit, ſolvitur: ſaliva lacteſcente. Digitis tractata iis adhæret.

Composita. Emplaſtrum de Cicuta.—Diabotanon.—Diachylon cum gummatibus.—Malacticum.— de Meliloto.— Oxycroceum.

Pilulæ Balſamicæ Mortoni.

Myrrha. L.

Myrrha. Ph. Myrrhen. Myrrcha.

Off. Gummi — Reſina.

Forma. *Gummi—reſina* ſolida, in fruſtis minoribus, rubicunda, ſubdiaphana, extus læviuſcula, vel verucis elevatis ſcabrida, fragilis: fracturis ſubrugoſis, lucidiuſculis; ſubfriabilis.

Proprietas. *Odor* fragrans, vix ingratus; *Sapor* amarus, odori congruens; *maſticata* primum inter dentes friabilis, dein dentibus adhæret, ſolvitur ſaliva lacteſcente, halitu oris fragrante.

Præparata. Eſſentia.

Ex-

Extractum.

Liquor, seu Oleum Myrrhæ per deliquium.

COMPOSITA. *Mirr.* Aqua Hysterica fœtida.

Electuarium seu Theriaca Andromachi & Diatessaron.

Emplastrum Oxycroceum.

Pilulæ de Cynoglosso. — Ruffi. — de Styrace.

Pulvis Fumalis Arthriticus. — Specierum Confectionis hyacinthinæ.

Spiritus Balsamicus vulgo Schauerianus. — Matricalis. — Theriacalis.

Tinctura sive Balsamum Commentatoris. — Masticbes composita.

Unguentum de Arthanita sive contra Vermes. — Digestivum.

Extract. Pilulæ Balsamicæ Stahlii.

BDELLIUM. L.

Bdellium. Ph. Bdellienharz. Bdellium.

Exoticum. Arbor. Palma.

Off. Gummi — Resina.

FORMA. *Gummi — resina* in frustulis minoribus, magnitudine vix fructus Cerasi, angulatis, extus rugosis; obscure rubicunda, subdiaphana, fragilis: fracturis planis, homogeneis, lævibus, nitidiusculis.

PROPRIETAS. *Odor* gravis, debilior; *Sapor* graviusculus amaricans, in Terebinthinam vene-

tam incidens; *masticata* tardissime emollitur, dentibus adhæret.

Composita. Emplastrum de Meliloto.

Sagapenum. L.

Sagapenum. Ph. Sagapen, Serapinharz. Sagapenum.

Exoticum.

Off. Gummi — Resina.

Forma. Duplex in nostris officinis reperitur Sagapenum. *Prius* Gummi — resina solida in frustulis minoribus, magnitudine circiter fructus Cerasi vel ultra, rubra, subdiaphana homogenea, læviuscula, facie cornea, lucidiuscula, consistentia ceræ, in moderato calore molliuscula, in frigore duriuscula fragiliuscula; cultro secta resolvitur in scobem albidam quasi ex cornu. *Vulgare* sagapenum occurrit in frustis majoribus, magis opacum, rubicundum, non homogeneum, verum glandulis albidis impastatis, & ligni recrementi, aliisque heteropeneis sæpe onustum.

Proprietas. *Odor* fortior, graveolens, fere G. Ammoniaci; sed vulgare magis fœtidum. *Sapor* gravis, inhærens, in Assam fœtidam incidens; *masticatum* sagapenum dentibus subadglutinatur, mox album evadit, solvitur sensim: solutione lactescente.

Compositа. Electuarium seu Theriaca Andromachi.

Em-

Emplaſtrum Diachylon cum gummatibus.

CÆSALPINA? L.

Santalum rubrum. Ph. Rothes Sandelholz. Cžerwený Santal neb čerwené ſantalowé dřewo.

Exoticum. Arbor.

Off. Lignum arboris incertæ.

FORMA. *Lignum* ſolidum, pulchre rubrum, in fruſtis majoribus, extus fuſcis, ponderoſum, ſubſonorum; longitudinaliter fiſſum, fiſſura undulata; poſt ſectionem tranſverſalem, nitidiuſculum, nebuloſum, faſciis longitudinalibus.

PROPRIETAS. *Odor* debilis; *Sapor* debilis, ſubadſtringens; inter maſticandum *ſaliva* rubra evadit.

COMPOSITA. Eſſentia Lignorum.

Pulvis Specierum Confeictonis hyacinthinæ.

Species Decocti Avenæ. — — Lignorum.

INDEX.

A.

Abies rubra *pag.* 311.
Abrotanum 266.
Absinthium ponticum 267.
Absinthium vulgare 268.
Acacia nostras 156.
Acacia vera 340.
Acetosa vulgaris 111.
Acetosella 142.
Acorus vulgaris 107.
Agaricus albus 352.
Agaricus chirurgorum 353.
Agrimonia 148.
Alchimilla. 39.
Alliaria 223.
Allium 100.
Aloe 105.
Althæa 228.
Ammi verum 80.
Ammoniacum 360.
Amomum 80.
Amygdalæ amaræ 154.
Amygdalæ dulces 153.
Anagallis 44.
Anchusa lutea 42.
Anethum. 87.
Angelica sativa 78.
Anime 127.
Anisum stellatum 186.
Anisum vulgare 93.
Anthophylli 179.
Anthos 12.
Apium 94.
Arabicum gummi 340.
Aristolochia rotunda 295.
Aristolochia vulgaris 296.

pag.

Armoracia 221.
Arnica 274.
Artemisia 269.
Arthanita 43.
Arum 297.
Asa dulcis 314.
Asa fœtida 77.
Asa odorata 314.
Asarum 143.
Asparagus 103.
Avena 28.
Aurantium 250.
Auricula judæ 353.

B.

Balaustrium 151.
Balsamita 264.
Balsamum copaivæ 137.
Balsamum de Mecha 115.
Balsamum Peruvianum 360.
Balsamum de Tolu 133.
Barba capræ 159.
Bardana 260.
Basilicum 214.
Bdelium 362.
Beccabunga 10.
Bella donna 54.
Bellis minor 277.
Benzoe 314.
Berberis 109.
Betonica 206.
Betula 299.
Borsdorfiana poma 158.
Botrys 68.
Branca ursi vera 218.
Brio-

	pag.
Brionia	322.
Buxus	300.

C.

Cacao	247.
Calamintha montana	213.
Calamus aromaticus	107.
Calcatripa	183.
Calendula	287
Camphora	120.
Canella alba	144.
Canabis	327.
Capillus veneris	348.
Capparis	169.
Cardamomum minus	2.
Cardus Benedictus	286.
Cardus Mariæ	261.
Carica	344.
Carthamus	262.
Carvi	91.
Caryophylata	168.
Caryophyllus,	178.
Caſcarilla	313.
Caſſia fiſtula	128.
Caſſia lignea	120.
Catechu	356.
Celtica ſpica	19.
Centaurium minus	71.
Ceraſa nigra	154.
Cerefolium	84.
Chamædrys	194.
Chamæpitys	191.
Chamomilla romana	281.
Chamomilla vulgaris	279.
Cheiri	224.
Chelidonium majus	170.
China Chinæ,	48.
China nodoſa	328.
Cicer	240.
Cichorium	259.
Cicuta vulgaris	74.

	pag.
Cina	265.
Cinnamomum	118.
Citrullus	320.
Citrus	248.
Cochlearia	220.
Colchicum	112.
Colocynthis	320.
Conſolida major	41.
Conſolida regalis	183.
Conſolida ſaracenica	272.
Contra	265.
Contrajerva	38.
Copaiva	137.
Coriandrum	83.
Cortex Magelanicus ſeu Winteranus	144.
Cotoneum	158.
Craſſula	140.
Crepitus lupi	354.
Crocus	21.
Cubebæ	17.
Cucumis	322.
Cucumis aſininus	317.
Cucurbita	319.
Curcuma	4.
Cuſcuta	39.
Cyanus	284.
Cyclamen	43.
Cydonia	158.
Cyminum	82.
Cynogloſſum	40.
Cynosbaſtos	162.
Cyperus	24.

D.

Dactyllus	355.
Datura	50.
Daucus creticus	76.
Daucus ſylveſtris	73.
Dictamnus albus	131.
Dictamnus creticus	207

Doro-

pag.

Doronicum 276.
Draconis sanguis 108.
Dulcamara 55.

E.

Ebulus 96.
Elaterium 317.
Elemi 114.
Enula 273.
Epithymum 39.
Eruca 226.
Eryngium 72.
Euphorbium 149.

F.

Faba 239.
Faba inversa 140.
Farfara 270.
Ficus 344.
Filix mas 347.
Flamula jovis 189.
Fœniculum dulce, majus 88.
Fœniculum vulgare, minus 89.
Fœnugræcum 245.
Fragaria 166.
Fraxinus 341.
Fumaria 234.
Fungus sambuci 353.

G.

Galanga 3.
Galbanum 81.
Genista 237.
Gentiana 70.
Gramen 31.
Grana Paradisi 3.
Granatum 151.
Gratiola 10.
Guajacum 130.
Gummi Gutta 175.

H.

pag

Hedera arborea 59.
Hedera terestris 203.
Helleborus albus 337.
Helleborus niger 190
Hepatica nobilis 187.
Hirundinaria 67.
Hordeum 29.
Hyosciamus 52.
Hypericum 253.
Hypocistis 296.
Hyssopus 196

I.

Ialapa 46.
Imperatoria 85.
Ipecacuanha 291.
Iris floretina 22.
Iris nostras 23.
Iuglans 305.
Iujubæ 57.
Iuniperus 332.

L.

Lacca 315.
Lactuca 256.
Lactuca silvestris 257.
Ladanum 180.
Lamium 204.
Lapatum acutum 111.
Larix 311.
Lavandula 197.
Laurus 121.
Lentiscus 325.
Levisticum 77.
Lichen Isladicus 350.
Lilium album 101.
Lilium convalium 104.
Limonia 248.
Linnaria 217.

Li-

pag.

Linum 241.
Lupinus 238.
Lycopodium 349.
Lysimachia purpurea 146.

M.

Macis 358.
Magelanicus cortex 144.
Majorana 209.
Malicorium 152.
Malva arborea 231.
Malva vulgaris 232.
Manna 342.
Marrubium album 207.
Marum verum 192.
Mastiche 325.
Matricaria 278.
Mechoacanna 47.
Melilotus 244.
Melissa 212.
Melo 321.
Mentha crispa 200.
Mentha piperitis 202.
Mentha rubra 201.
Mentha saracenica. 264.
Mercurialis 330.
Meum 83.
Mezereum 117.
Millefolium 282.
Momordica 317.
Morsus diaboli 32.
Morus 301.
Moschata nux 357.
Muscus sanguineus 350.
Myrrha 361.
Myrtillus 116.

N.

Napellus 185.
Naphæ flores 250.
Napus 225.

pag.

Nasturtium aquaticum 222.
Nepeta 197.
Nicotiana 53.
Nigella 186.
Nux moschata 357.

O.

Olea 7.
Olibanum 334.
Opium 172.
Opobalsamum 115.
Opopanax 86.
Origanum 208.
Orleana 176.

P.

Papaver album 171.
Papaver erraticum 174.
Paradisi grana 3.
Parietaria 339.
Passulæ majores 61.
Passulæ minores 61.
Pastinaca 86.
Pepo 319.
Persica 152.
Petasites 272.
Petroselinum 94.
Petum 53.
Phu 19.
Pimpinella alba 92.
Pimpinella rubra 303.
Pinus picea 311.
Pinus sativa 310.
Pinus sylvestris 307.
Piper longum 16.
Piper rotundum 15.
Piperitis 202.
Pistacia 325.
Plantago 36.
Pœonia 181.
Polygala 236.
Polypodium 347.

Po-

	pag		pag
Poma Borſdorfiana	158.	Sambuci fungus	353.
Populus	329.	Sanctum lignum	130.
Prunella	214.	Sandaraca	332.
Prunus	155.	Sanguis draconis	108.
Pſyllium	37.	Santalum citrinum	115.
Pulegium	203.	Santalum rubrum	364.
Pulmonaria arborea	351.	Santonicum	265.
Pulſatila nigricans	188.	Saponaria	138.
Pyretrum	282.	Sarcocolla	35.
Q.		Sarſaparilla	327.
Quercus	303.	Saſſafras	123.
R.		Satureja	195.
		Satyrium	292.
Raphanus niger	221.	Scabioſa	33.
Raphanus ruſticanus	221.	Scamonium	45.
Rhabarbarum	124.	Scolopendrium	346.
Rapa alba	225.	Scordium	193.
Raponticum	123.	Scorzonera	255.
Rhodium	237.	Scrophularia	217.
Rhoeas	174.	Secale	29.
Ribeſium nigrum	59.	Sedum majus	150.
Ribeſium rubrum	58.	Sedum minus	141.
Ricinus vulgaris	316.	Sedum vermiculare	142.
Roſa palida	163.	Sempervivum	150.
Roſa rubra	160.	Senega noſtras	236.
Roſa ſylveſtris	162.	Senegal gummi	341.
Roſmarinus hortenſis	12.	Senna	129.
Rubia	33.	Serpentaria virginica	294.
Rubus	165.	Serpyllum	210.
Ruſcus	336.	Seſeli creticum	72.
Ruta	132.	Siliqua dulcis	343.
S.		Simaruba	69.
Sabadilla	358.	Solanum	55.
Sabina	331.	Solanum furioſum	54.
Sacharum	25.	Spica	197.
Sagapenum	363.	Spica celtica	19.
Salep	292,	Spina cervina	56.
Salicaria	146	Squilla	102.
Salix vulgaris	324.	Staphiſagria	184.
Salvia	14.	Stramonium	50.
Sambucus	91.	Stirax calaminta	135.

pag.

Styrax liquida 306.
Sumach 95.
Symphytum 41.

T.

Tabacum 53.
Tacamahaca 37.
Tamarindus 20.
Tamariscus 99.
Tanacetum 263.
Taraxacum 258.
Telephium 140.
Terebinthina communis 308.
Terebinthina veneta 311.
Terra Japonica 356.
Thee orientale 178.
Thlaspi 220.
Thus 334.
Thymus 221.
Tilia 176.
Tolu 133.
Tragacantha 242.
Trifolium fibrinum 43.
Triticum 30.

pag.

Tunica 159.
Turpethum 46.
Tussilago 270.

V.

Valeriana major 19.
Valeriana vulgaris 18.
Vanilla 293.
Verbascum 49.
Verbena 11.
Veronica 9.
Viola 289.
Virga aurea 272.
Viscum Quercinum 110.
Vitis 60.
Urtica major 300.
Urtica mortua 204.
Uva ursi 134.
Vulvaria 68.
Uvularia 336.
Winteranus cortex 144.

Z.

Zedoaria 5.
Zingiber 1.

Register.

A.

Seite

Aepfel Borsdorfer 188.
Aepfel maschansker 158.
Alant 273.
Alikantisches Aschensalz 69.
Aloe 105.
Ammey 80.

Seite

Ammömlein 80.
Ammoniak Gummi 360.
Andorn weißer 207.
Aneis gemeiner 93.
Angelike 78.
Angurie 320.
Animenharz 127.

Apich

	Seite
Apich	94.
Apostemkraut	33.
Arabischer Schottendorn	340.
Aron	297.
Asand stinkender	77.
Asand wohlriechender	314.
Aschensalz alicantisches	69.
Attig	96.
B.	
Bachbungen	10.
Bärenklaue	218.
Bärentatze	218.
Bärlapp	349.
Bärwurzel	83.
Baldrian gemeiner	18.
Baldrian grosser	19.
Balsamäpfel	317.
Balsam Copai	137.
Balsam peruanischer	360.
Balsam schwarzer	360.
Balsam tolutanischer	133.
Basilie	214.
Bauchampfer	142.
Bauersenf	220.
Bamlungenmos	351.
Bdellienharz	362.
Benediktwurzel	168.
Bergmünze	213.
Bertram	282.
Bethonie	206.
Beyfüß	269.
Bibernel roth	303.
Bibernel weisser	92.
Bilsenkraut	52.
Bingelkraut	330.
Birke	299.
Bittere Mandeln	154.
Bitterklee	43.

	Seite
Bittersüß	55.
Blaue Kornblumen	285.
Blaue Veilchen	289.
Blauschwertel	23.
Blutlungenmoos	350.
Boksdorn	243.
Bokshörnel	343.
Bokshorn	245.
Bofist	354.
Bohne	239.
Borsdorfel Aepfel	158.
Braunwurzel	217.
Brechwurzel	291.
Brennessel	300.
Brenkraut	189.
Brunelle	214.
Brunenkresse	222.
Brustbeerlein	57.
Bubenfist	354.
Buchampfer	142.
Buchsbaum	300.
C.	
Caccau	247.
Capucinersamen	338.
Catechu	356.
Celtischer Nardus	19.
Chamille gemeine	279.
Chamille römische	281.
Chinarinde	48.
Chinawurzel	328.
Cichorie	259.
Citrone	248.
Copaibalsam	137.
Cretischer Diptam	207.
Cretischer Sesel	72.
Cretischer Vogelnest	76.
Creutzbeere	56.
Creutzblümlein	236.
Cubeben	17.

Cu:

	Seite
Cukumern	322.
Cyperwurzel	24.
D.	
Datteln	355.
Dille	87.
Diptam cretischer	207.
Diptam weißer	131.
Dolläpfel	50.
Dollkraut	54.
Drachenblut	108.
E.	
Edel-Leberkraut	187.
Ehrenpreis	9.
Eiche	303.
Eichenmistel	110.
Eisenhüttel	185.
Eisenkraut	11.
Elemiharz	114.
Engelsüß	347.
Engeltrank	274.
Enzian	70.
Ephey	59.
Eppig	94.
Erdbeere	166.
Erdrauch	234.
Erdschwefel	349.
Esche. Eschenbaum	341.
Eselskukumern	317.
Eupforbium	149.
Eybisch	228.
F.	
Faltrian	104.
Färberöthe	33.
Färber Ochsenzunge	42.
Farrenkraut	347.
Feige	344.
Feigbohne	238.
Felber	324.
Feldcypresse	191

	Seite
Fenchel gemeiner	89.
Fenchel römischer	88.
Fette Henne	140.
Feuerschwamm	353.
Fichtenbaum	307.
Fieberklee	43.
Fieberrinde	48.
Flachsseide	39.
Flaschenkürbs	319.
Fleischleim	35.
Flieder	97.
Flohsammenkraut	37.
Flüssiger Storax	306.
Franzosenholz	130.
Frauenblatt	264.
Frauendistel	261.
Frauenhaar	348.
Frauenmantel	39.
Frauenmünze	264.
G.	
Gämswurzel	276.
Gänseblümel	277.
Gärberbaum	95.
Galban Gummi	81.
Galgant	3.
Gamanderle	194.
Gartenpapeln	231.
Gartheil	266.
Gauchheil	44.
Geißbart	159.
Gelbes Sandelholz	115.
Gelbe Violen	224.
Gemeine Chamille	279.
Gemeine Käsepapeln	232.
Gemeine Osterluzey	296.
Gemeiner Aneis	93.
Gemeiner Baldrian	18.
Gemeiner Fenchel	89.
Gemeiner Saueramp	111.
Gemeiner Vogelnest	73.

Ge-

Seite

Gemeiner Wermuth 268.
Genester 237.
Gerste 29.
Gewürznägeln 178.
Giftwurzel 38.
Gilbwurz 4.
Granatbaum 151.
Granatblüthe 151.
Granatäpfel 31.
Graswurzel 31.
Gredel in der Staude 186.
Grindwurzel 111.
Große Hauswurzel 150.
Große Kardamomen 2.
Große Wallwurzel 41.
Großer Baldrian 19.
Großer Terpentinbaum 134.
Groß Schellkraut 170.
Gummi Amoniak 360.
Gummi Galban 81.
Gummi Gutt 175.
Gummiladan 180.
Gummilack 317.
Gummiopopanax 86.
Gürtel 256.
Gündelreben 203.
Gundermann 203.
Gurken 322

H.

Haber 28.
Hagelbutten 163.
Hanf 327
Hanf wilder 191.
Haselwurz 143.
Hauswurzel große 150.
Hauswurzel kleine 141.
Heidelbeere 116.
Heiligen Geistwurzel 78.
Hetschepetsch 162.
Heidnisch Wundkraut 272.

Seite

Himmelbrand 49.
Hinbeere 165.
Hinschkraut 55.
Hirschzunge 346.
Holder, oder, Holunder 97.
Holderschwamm 353.
Hünerdarm 44.
Huflattig 270.
Hundszunge 40.
Hypoakanna 291.
Hypocisten 296.
Hyssop 196.

J.

Jalappe 46.
Jalappe weiße 47.
Johannesbeeren rothe 58.
Johanneskraut 253.
Imber. Ingwer 1.

K.

Käsepapeln gemeine 232.
Kalmes Kalmus 107.
Kampfer 120.
Kappern 169.
Kardamemlein 2.
Kardamömen große 3.
Kardusbenedykt 286.
Kassie 120. 128.
Katzenmünze 197.
Kerfelkraut 84.
Kichern 240.
Kirschen schwarze 151.
Klapperrose 174.
Kleine Hauswurzel 141.
Klette 260.
Knoblauch 100.
Knoblauchkraut 223.
Königskerze 49.
Koloquinte 320.
Koriander 83.

(B) Korn

	Seite
Korn	29.
Kornblumen blaue	285.
Kornblumen rothe	174.
Kranowet	332.
Krausmünze	200.
Kreen	221.
Kreuzbaum	316
Kreuzbeere	56.
Krenzblümlein	236.
Küchernschelle schwärzliche	188.
Küm	91.
Kümmel	91.
Kümel römischer	82.
Kümel schwarzer	186.
Kürbs	319.
Kütten	158.
Küttelkraut	210.
Küttelkraut welsches	211.
L.	
Lachenknoblauch	193.
Langer Pfeffer	16.
Lattiz	256.
Lattig wilder	257.
Laussaamen	184.
Lawendel	197.
Leberkraut, edel	187.
Lein	99.
Leinkraut	217.
Lerchenbaum	311.
Lerchenschwamm weißer	352.
Liebstöckel	77.
Lilie weiße	101.
Linde Lindenblume	176.
Lungenschwamm	350.
Löffelkraut	220.
Löwenzahn	258.
Lorberbaum	121.
M.	
Majorana	209.
Mandelbaum	153. 154.

	Seite
Mandeln bittere	154.
Mandeln süße	155.
Manna Mannaäschbaum	342.
Mannstreüwurzel	72.
Margran	209.
Maschanster äpfel	158.
Maßlieben	277.
Mastixbaum	325.
Mauerpfeffer	142.
Maulbeerbaum	301.
Mausdorn	336.
Masenblümel	104.
Mechoakannewurzel	47.
Meeretig	221.
Meerzwibel	102.
Meisterwurzel	85.
Melisse	212.
Melaune Melone	321.
Melte stinkende	68.
Mohn weißer	171.
Momordike	317.
Münze rothe	201.
Muskatnuß	357.
Mutterkraut	278.
Mutternägelein	179.
Mutterzimmet	120.
Myrrhen	361.
N.	
Nachtschatten	55.
Nägelein	139.
Nägelein Gewürz	178.
Nardus celtischer	19.
Nelke	139.
Neßel taube	204.
Nießwurzel schwarze	190.
Nießwurzel weiße	337.
Nußbaum welscher	305.
O.	
Odermenig	148.

Oel-

Oelbaum 7.
Omurken 322.
Opobalsam 115.
Opopanax Gummi 86.
Orientalischer Thee 178.
Orlean 176.
Osterluzey gemeine 296.
Osterluzey runde 295.

P.

Pappelbaum 329.
Pappeln schwarz rothe 231.
Paradeiskerner 3.
Pasternak 86.
Peonie 181.
Peruwianischer schwarzer Balsam 360.
Pestilenzwurzel 272.
Petersilie 94.
Pfaffenröhrel 258.
Pfeben 319.
Pfeffer langer 16.
Pfeffermünze 202.
Pfeffer schwarzer 15.
Pfingstroße 181.
Pfirsche 152.
Pflaumen 155.
Pfirmenkraut 237.
Pimpernüßlein 325.
Pineole 310.
Pistazie 325.
Pluzer 319.
Poley 203.
Pomoranze 250.
Purgierkerner 316.

Q.

Quecken 31.
Quendel 210.
Quendel römischer 211.
Quitten 158.

R.

Rabarbare 124.

Seite

Rapontike 123.
Raute 132.
Reinfaren 263.
Rettig 227.
Ribesel rothe 58.
Ribesel schwarze 59.
Ringelblume 287.
Rittersporn 183.
Rocken 29.
Röhrelkraut 258.
Römische Chamille 281.
Römischer Fenchel 88.
Römischer Kümmel 82.
Römischer Quendel 211.
Römischer Wermuth 267.
Rohrkassie 128.
Rosenholz 237.
Rose rothe 160.
Rose weiße 163.
Rose wilde 162.
Roßmarin 12.
Rothe Bibernel 303.
Rothe Joannesbeeren 58.
Rothe Münze 201.
Rothe Rose 260.
Rothe Kornblumen 174.
Rothes Sandelholz 364.
Rothe Tonne 311.
Ruben weiße 225.
Rückerl 277.
Runde Osterluzey 295.

S.

Sabadille 338.
Sadelbaum 331.
Saflor 262.
Safran 21.
Safran wilder 262.
Sagapenharz 363.
Salapwurzel 292.
Salwey Salwer 14.

St

	Seite.
St. Johannesbrod	343.
St. Johanneskraut	253.
Sandelbeere	134.
Sandelholz gelbes	115.
Sandelholz rothes	364.
Sassafraßholz	123.
Sassaparille	327.
Saturey	195.
Saubrod	44.
Sauerampf gemeiner	111.
Sauerklee	142.
Saurauch	109.
Scabiose	33.
Scammonie	45.
Schaafgarbe	282.
Schakarille	313.
Schellkraut groß	170.
Scherübel	225.
Schierling	74.
Schlagkräutlein	192.
Schlangenmord	255.
Schlangenwurzel Vierginische	294
Schlehen	156.
Schottendorn arabischer	340.
Schwalbenwurzel	67.
Schwarze Kirschen	154.
Schwarze Nießwurzel	190.
Schwarze Ribesel	59.
Schwärzliche Küchenschelle	188.
Schwarzer Balsam	360.
Schwarzer Kümmel	186.
Schwarzer Pfeffer	15.
Schwarzer Senf	227.
Schwarzrothe Papeln	231.
Schwarzwurzel	41.
Schweinbrod	43.
Schwindelkerner	17.
Sedel	331.
Seifenkraut	138.
Senf schwarzer	227.

	Seite
Senf weißer	226.
Sennesblätter	129.
Serapinharz	363.
Sesel cretischer	172.
Sewenbaum	331.
Simarube	134.
Sinau	39.
Skorzonere	255.
Spargel	103.
Stabwurzel	266.
Steckruben	225.
Steffanskerner	184.
Steinklee	244.
Steinwurzel	347.
Sternaneis	186.
Stinkender Asand	77.
Stinkende Melte	68.
Storax	134.
Storax flüssiger	306.
Süsse Mandeln	153.
Süßholz	244.
Sumach	95.
T.	
Tabak	53.
Tacamahakharz	37.
Tag und Nacht	339.
Tamarinden	20.
Tamarisken	99.
Tanne rothe	311.
Taube Nessel	204.
Tausendguldenkraut	71.
Terpentinbaum großer	134.
Teufels Abis	32.
Teufelsdreck	77.
Thee Orientalische	178.
Thymian	211.
Thymseide	39.
Tolutanischer Balsam	113.
Tormentille	167.
Tragant	242.
Traubenkraut	68.

	Seite.
Turbit	46.
Türkenkopf	319.

V.

Vanilie	293.
Veilchen. Veigel blaue	289.
Veigelwurz	22.
Violen gelbe	224.
Virginische Schlangenwurzel	294.
Vogelnest Cretischer	76.
Vogelnest gemeiner	73.
Vürgerig	185.

W.

Wacholder	322.
Wallwurzel große	41.
Wanille	293.
Wasserbungen	10.
Wasserlauch	193.
Wasser Melaune	320.
Wegbreit	36.
Wegerig	36.
Wegwart	259.
Weiderich	146.
Weide weiße	324.
Weihrauch	334.
Wein, Weinrebe	60.
Weinbeeren große	61.
Weinbeeren kleine	61.
Weinrute	132.
Weinschädling	109.
Weißbibernel	92.
Weiße Jalape	47.
Weiße Lilie	101.
Weiße Nießwurzel	337.
Weiße Rose	163.
Weiße Ruben	225.
Weiße Weide	324.
Weißer Andorn	207.

	Seite.
Weißer Diptam	131.
Weißer Lerhenschwamm	352.
Weißer Mohn	171.
Weisser Senf	226.
Weißer Zimmet	144.
Weitzen	30.
Welscher Nußbaum	305.
Welsches Küttelkraut	211.
Wermuth gemeiner	268.
Wermuth römischer	267.
Wildaurin	10.
Wilder Hanf	191.
Wilder Lattig	257.
Wilde Rosen	162.
Wilder Safran	262.
Wohlgemuth	208.
Wohlriechender Asand	314.
Wolverley	274.
Wullkraut	49.
Wunderbaum	316.
Wurmkraut	263.
Wurmsamen	265.

Z.

Zäpfleinkraut	336.
Zaucken	104.
Zaunrübe	322.
Zehrwurzel	291.
Zeidelbast	117.
Zeitloße	112.
Zeller	94.
Zibeben	61.
Zimmet	118.
Zimmet weißer	144.
Zirbesnüsselbaum	310.
Ziserlein	240.
Zitwersamen	265.
Zitwerwurzel	5.
Zucker	25.
Zweschpen	155.

Re-

Regstřjk.

A.

strana.

Akant 218.
Aleluga. 142.
Alikantská sauchawá sůl 69.
Aloes 105.
Ammi 80.
Ammonyak 360.
Angelička 78.
Angelský trank 274.
Angurye 320.
Anýme 127.
Anýz 93.
Apich weliký 77.
Archangelicka 78.
Aron 297.
Aronowá bylina 297.
Aronowé brady kořen 297.

B.

Badian 186.
Balsam Kopagský 137.
Balsam Peruwský 360.
Balsam Tolutský 133.
Balssam zahradnj 200.
Bazalička planá 330.
Bazýlika 214.
Bdellium 362.
Bedrnjk 92.
Benedykt neb Benedyktowy kořen 171.
Benzoe 314.
Beylj 237.
Bez 97.
Bezowa hauba 353.
Bjlá čemeřice 337.
Bjlá dřinowa hauba 352.
Bjlá horčice 226.

str.

Bjlá Galapa 47.
Bjlá řegchawka 337.
Bjlá růže 162.
Bjlá řipa 225.
Bjla skořice 144.
Bjlá třewdowa 131.
Bjlé fasolý 239.
Bjlé Lilium 101.
Bjlý ellebor 337.
Bjlý gablečnjk 207.
Bjlý mák 171.
Blaznowý kilek 54.
Blessnjk 37. 184.
Blyn 52.
Bob 121. 239.
Bodlak požehnaný 286.
Bodlawé gablko 50.
Bolehlaw 74.
Borowice domácý 310.
Borowice lesnj 307.
Božj Matky bylina 264.
Brada Aronowá 293.
Brada kozý 159.
Brotán 266.
Brunétná wrbina 146.
Břečtan 59.
Břeskew 152.
Břiza 299.
Bukwice 206.
Bylina Aronowa 297.
Bylina česnekowá 223.
Bylina čipkowa 336.
Bylina hroznowa 68.
Bylina Matky božj 264.
Bylina sklenna 339.

C.

C.

Celidonya 170.
Celtycký Nardus 19.
Ceterák 346.
Cukr 25.
Czekanka 259.
Czemeřice bjlá 337.
Czemeřice černá 190.
Czerná čemeřice 197.
Czerná růže 160.
Czerná řetkew 227.
Czerné gahody 116.
Czerné třeſſně 154.
Czernobýl 269.
Czernohláwek 183. 214.
Czerný ellebor 190.
Czerný kmjn 186.
Czerný konjklec 188.
Czerný pepř 15.
Czertkus 32.
Czertowo howno 77.
Czerwená máta 201.
Czerwené ſantalowé dřewo 364.
Czerwený ſantal 364.
Czerwený wolowý gazyk 42
Czerwený zwonečck 253.
Czeſnek 100.
Czeſnek planý 193.
Czeſnek wodnj 193.
Czeſnekowá bylina 223.
Czipkowá bylina 336.
Cybule morſká 102.
Cycwar 5.
Cycwarowé ſemeno 265.
Cypris planj 191.
Cytrule 320.
Cytryn 248.
Cytrynowé gablko 248.
Cyzrna 240.

D.

Daktyle indyanſké 20.

ſtr.

Dar nebeſký 170.
Datle 355.
Dawič 291.
Den a noc 339.
Détel kýſelý zagečj 142.
Dewéſyl 272.
Deyworec domácý 73.
Deyworec kretſký 76.
Diwizna 49.
Dlauhý pepř 16.
Dobrá myſl 208.
Domácý borowice 310.
Domácý Deyworec 73.
Domácý růže 160.
Domácý tykew 319.
Doronykum 276.
Drac 109.
Drakowa krew 108.
Dřewo francowſké 130.
Dřewo růžowé 237.
Dřewo ſantalowé čerwené 364.
Dřewo ſantalowé žluté 115.
Dřewo ſaſſafraſowé 123.
Dřewo ſladký 241.
Dřjn 311.
Dřjnowa hauba bjla 352.
Dřjſtal 109.
Dub 39.
Dubowa hauba 353.
Dubowé melj 110.
Ducha ſwatého kořenj 190.
Dýne 319.
Dýptam 131.
Dýptam kretſky 207.

E.

Egiptſké trnky 340
Elemi 114
Ellebor bjli 337.
Ellebor černý 190.

(b2) Ku-

str.
Euforbium 149.

F.

Fasoly bjlé 239.
Fenykl 88.
Fialowý kořen 22.
Fjky 344.
Fiola modrá 289.
Fiola woná 289.
Fiola žlutá 224.
Francowské dřewo 130.

G.

Gablečnjk bjlý 207.
Gablko bodlawé 50.
Gablko cytrynowé 248.
Gablko granátowé 151.
Gablko missenské 158.
Gablko Rágské 320.
Gahodnjk 166.
Gahody 166.
Gahody černé 116
Gahody psý 56.
Galapa 46.
Galapa bjlá 47.
Galban 81.
Galgant 4.
Galgant planý 24.
Galowec 332.
Ganoffit 237.
Gaternjk 187. 350.
Gazyk gelenj 346.
Gazyk psý 40.
Gazyk wolowý čerwený 42.
Gdaule 158.
Gečmen 29.
Ged hadj hogicý kořen 294.
Gedhog 38.
Gedle 311.
Gedlice Wlaská 336.
Gelenj gazyk 346.
Gesen 341.
Gésskowa palice 50.
Getel hořký 43.
Getel wodnj 43.
Gitrocel proředný neb ssiroký 36.
Granátowé Gablko 151.
Guguby 57.
Gummigutta 175.
Gummi panacowé 86.
Gummi takamahaka 37.

H.

Hadj kořen 294.
Hadj ged hogicý kořen 294.
Hadj mordowý kořen 255.
Hauba bezowá 353.
Hauba dubowá 353.
Hauba dřinowá 352.
Heřmánek 279.
Heřmánek Rzjmský 281.
Hlucha kopřiwa 204.
Horčice 227.
Horčice bjlá 226.
Horčice sedlská 220.
Hornj máčka 72.
Hornj marulka 213.
Hořec 70.
Hořké mandle 154.
Hořký getel 43.
Hořký lupen 260.
hořký řepjk 260.
Howno čertowo 77.
Hrach Rzjmský 238.
Hrach sstrkawičnj 238.
Hromowý kořenj 103.
Hroznjček neb hroznowa bylina 68.
Hřebiček krámský 178.
Hřebičkowa mata 179.
Hus nuzka 39.
Hypekakoana 891.
Hypocistis 296.

Ch.

Chebdj 96.

	str.
Chleb Sw. Jana	343.
Chléb swinský	43.
Chmeljk	37.
Chrpa	284.
Chyná	48.
Chyn kořen	328.
Chwogka klássterská	331.
J.	
Jana Sw. bylina	253.
Jana Sw. Chleb	343.
Jána Sw. Twář	297
Janofit	257.
Indyanské daktyle	20.
K.	
Kackau	247.
Kadeřawa mata	200. 264.
Kadidlo	334.
Kaffer	120.
Kalkan	3.
Kamanderle	194.
Kamzykowý kořen	276
Kappary	169.
Kapardj	347.
Kapucjnský semeno	338.
Karafilat	139.
Kardamomum mensſj	2.
Kardbenedykt	286.
Kardus Marye	261.
Kardus pyžehnany	286.
Kaskarilla	313.
Kassye	120
Kassya fistula	128
Katechu	356
Kawias	33
Kdule	158
Kegchawka bjlá	337
Kerblik	84
Keř wjnný	60
Kmen wjnný	60
Klássterská chwogka	331

	str.
Klokočka	325
Kmjn	82
Kmjn černy	186.
Kmjn laučny	91.
Kmjn zahradnj	186.
Kočičj kořenj	192.
Kokotice	39.
Kolnjk	225.
Koloquintida	3[illegible]0.
Komonice	244.
Koniklec černy	188.
Konjtrud	10.
Konopé	327.
Konske kopyto	270.
Konske kopyto wětssj	272.
Konsky sskowjk	111.
Konwakium	104.
Kopagsky balsam	1[illegible]7.
Kopr	89.
Kopr Rzimsky	88.
Kopr sladký	88.
Kopr Wlasky	88.
Kopr zahradnj	87.
Koprnjk	83.
Kopřiwa hlucha	204.
Kopřiwa mrtwá	204.
Kopřiwa paliwa	300.
Kopřiwa smradlawa	204.
Kopřiwa wětssj	300.
Kopito konské	270.
Kopito konské wětssj	272.
Koryander neb koliander	85.
Kořenj Aronowé brady	297.
Kořen Benedyktowý	168.
Kořen Chyny	328.
Kořen fialowý	22.
Kořen hadj ged hogicý	294.
Kořen hadj mordowý	255.
Kořen kamzikowý	276.
Kořen midlj	138.

str.

Kořen prsnj 107.
Kořen Sarsaparille 327.
Kořen sladký 241.
Kořen swinský 140. 217.
Kořen Wlaské řjwy 327.
Kořenj Ducha swatého 190.
Kořenj hromowé 103.
Kořenj kočičj 192.
Kořenj krwawé 303.
Kořenj natkowé 197. 213.
Kořenj raupowé 170.
Kořenj třzené 167.
Kořenj wonné 120.
Kořenj wssecko 80.
Kosatec 23.
Kostiwal 41.
Kotrče 353.
Kozljk obecnj 18.
Kozljk wětssj 19.
Kozj bradka 159.
Králowský swálnjk 83.
Kralowský wstawač 292.
Krámský hřebjček 178.
Krsowlásek 286.
Kretský deyworec 76.
Kretský Dyptam 207.
Krew drakowá 108.
Krokos 262.
Křen 221.
Krtičnjkowý kořen 217.
Krwawé kořenj 303.
Kubeb 17.
Kulka Muskátowa 357.
Kuřimor 44.
Kutna 158.
Kyselý Dětel zagečj 142.

L.

Ladanum 180.
Laka 315.
Lasskawičnjk 67.
Laučnj Kmjn 91.

str.

Lauhowa alikanská sůl 69.
Lawendule 197.
Lebeda smradlawa 68.
Lekořice 241.
Len 99.
Len Matký božj 217.
Lentjsskus 325.
Lesnj borowice 307.
Lesnj Myrtus 336.
Libeček 77.
Lilek blaznowý 54.
Lilium bjlé 101.
Lipa 176.
Listj senowy 129.
Locika 256.
Locika lesnj 257.
Locyka plana 157.
Lomikamen řecký 72.
Lžjčnjk 220.
Lupen hořký 250.
Lupen wětssj 260.

M.

Mačka hornj 72.
Mak bjlý 171.
Mak planý 174.
Mak wlčj 174.
Malé rozynky 61.
Maliny 165.
Mandle hořké 154.
Mandle sladké 153.
Manna 342.
Marulka hornj 197.
Marulka polnj 213.
Marusse 301.
Maryanka 209.
Mařena 33.
Mastixowý strom 325.
Mata červena 201.
Mata kadeřawa 200. 264.
Mata pepřowa 202.

Ma-

	str.
Mata planá	213.
Mata Rzecka	264.
Matečnjk	278.
Matečnjk menſſj	277.
Mateři dauſſka	210.
Mateři dauſſka Rzjmſka	211.
Mateřidauſſka Wlaſka	211.
Matka břebjčkowa	179.
Matky božj bylina	264.
Matky božj len	217.
Medowý ſemeno	349.
Medunka	212.
Melaun	319. 321.
Melj dubowé	110.
Meliſſa	212.
Menſſj matečnjk	277.
Menſſj můžjk tučný	141.
Menſſj ozanka	194.
Menſſj ſwalnjk	214.
Menſſj wlčj pepř polſký	117.
Menſſj země žluč	71.
Merkuryalis	330.
Měſýček	187.
Mjřjk	94.
Mjſenſké gablko	158.
Modra fiala	289.
Modrak	284.
Momordyka	317.
Mořſka cybule	102.
Mrtwa kopřiwa	204.
Mudatka	236.
Mužjk tučný menſſj	141.
Mužjk tučný ne menſſj	141.
Mužjk tučný wětſſj	150.
Muſſkatowa kulka	357.
Mužka wira	72.
Mydlj kořen	138.
Myſl dobra	208.
Myrtus	116.
Myrtus leſnj	336.
Myrrha	361.

	str.
N.	
Nardus celtický	19.
Natkowé kořenjj 197.	213.
Natržnjk	167.
Nebeſký dar	170.
Nedwědj paznocht	218.
Netřeſk	141. 142. 150.
Neymenſſj tučný mužjk	142.
Noc a den	339.
O.	
Obecny kozljk	18.
Obecný pelinek	268.
Obecný podražec	296.
Ocun	112.
Oka wranj	116.
Okraublj podražec	295.
Okurky	322.
Oleſnjkowé ſemeno	72.
Oleſſnjk	73.
Oljwa prawa	7.
Opobalſam	115.
Opopanax	86.
Orlean	176.
Origentalſký thee	178.
Ořech wlaſky	305.
Oſladič	347
Oſtropes	261.
Oſtruha rytjřſka	183.
Owes	28.
Ozanka menſſj	194.
P.	
Palice geſſkowa	50.
Panazowe gummi	86.
Paſſtrnak	86.
Paznocht nedwědj	218.
Peltram	282.
Pelinek obecnj	268.
Pelynek Rzjmſký	217.
Penjzek	220.

	ſtr.
Pepř černý	15.
Pepř dlauhý	16.
Pepř polſký wlčj menſſj	117.
Pepřowa mata	202.
Peruwſký balſam	360.
Petržel	94.
Pe r	31.
Piwonka	181.
Piſtacy	325.
Plamjnek	189.
Plana Bazalička	330.
Plana locyka	257.
Plana mata	213.
Plana ruže	162.
Plana tkwice	317.
Plsné wjno	184.
Planý česnek	193.
Planý cypris	191.
Planý galkan	24.
Planý mak	174.
Planý ſſafran	112. 262.
Pleſſka	258.
Plicnjk ſtromowý	351.
Podražec dlauhý	296.
Podražec obecný	296.
Podražec okrauhlý	295.
Poleg.	197. 203. 213.
Polnj marulka	197.
Polſký wlčj pepř menſſj	117.
Pomagaran	151.
Pomoranč	250.
Poponec	203.
Poſed	322.
Potočnik	10.
Potočnj řeřicha	222.
Požehnaný bodlak	286.
Požehnaný kardus	286.
Prawa oljwa	7.
Proſtřednj gitrocel	36.
Proſtřednj ſwalnjk	272.
Prſnj kořen	107.
Pruſtworec	107.

	ſtr.
Prutržnjk	140. 217.
Přeſkrnjk	189.
Přimětnjk Wlaſké	286.
Pſanj trank	346.
Pſý gahody	56.
Pſý gazyk	40.
Pſj wjno	55.
Pſſenice	30.
Puſſpan	300.

R.

Rabarbara	124.
Ragſka zrna	3.
Ragſké gablko	320.
Rakoſy	237.
Raupowé kořenj	170.
Rauta	132.
Rauta plana	234.
Rauta polnj	234.
Řecký lomikamen	72.
Reupontikum	123.
Řmen	279.
Řmen Řjmſký	281.
Rozhodnjk	140. 217.
Rozmarin	12.
Rozynky malé	61.
Rozynky weliké	61.
Řebřjček	282.
Řecka mata	264.
Řecké ſeno	245.
Řepjček	148.
Řepjk hořký	260.
Řepjk wětſſj	260.
Řeřicha potočnj	222.
Řeřicha wodnj	222.
Řetkew černa	227.
Řjmbaba	278.
Řjmſka mateřj dauſſka	211.
Řjmſka ſſalwěg	264.
Řjmſký heřmanek	281.

Řjm-

	ſtr.
Rʒjmſký hrach	238.
Rʒjmſký kopr	88.
Rʒjmſký pelinek	267.
Rʒjmſký řmen	281.
Rʒjmſký ſlez	231.
Rʒjpa bjlá	225.
Rʒjwě Wlaſké kořen	327.
Růže bjlá	163.
Růže čerwená	160.
Růže domácý	160.
Růže planá	162.
Růžowé dřewo	237.
Rybes černý	59.
Rybes čerwený	58.
Rytjřſká oſtruha	183.
Rywj winné	60.

S.

	ſtr.
Sabadylla	338.
Sagapénum	363.
Salát	256.
Salezowé ſemeno	72.
Santál čerwený	364.
Santál žlutý	115.
Santálowé dřewo čerwené	364.
Santálowé dřewo žluté	115.
Sarkokolla	35.
Sarſaparylle kořen	327.
Saſſafraſſowé dřewo	123.
Satureye	154.
Sawina	331.
Sedlſká horčice	220.
Sedmikráſa	277.
Semenec	327.
Semeno cycwarowé	265.
Semeno kapucinſký	338.
Semeno mechowé	349.
Sena	129.
Seno Rʒecké	245.
Skammonia	45.
Sklenná bylina	339.
Skočec wěrſſj	316.
Skořice	118.
Skořice bjlá	144.
Simaruba	134.
Sladká hořká	55.
Sladké mandle	153.
Sladký dřewo kořen	241.
Sladký kopr	88.
Slez Rʒjmſký	231.
Slez wyſoký	228.
Slez zagečj	232.
Slez zahradnj	231.
Sljwa	162.
Smradlawá lebeda	68.
Smradlawá kopřiwa	204.
Sſaffrán	21.
Sſaffrán planý	112.
Sſalomúnek	185.
Sſiroký gitrocel	36.
Sſalwěg	14.
Sſalwěg Rʒjmſká	264.
Sſkrkawičnj hrach	238.
Stěrbák	259.
Stowjk	111.
Stowjk konſký	111.
Sſweſtka	155.
Sſrpek	162.
Starček	148.
Strom maſtixowý	325.
Strom terpentinow wel	134
Stromowý plicnjk	351.
Střewce žabj	44.
Střjkawá tykwice	317.
Styrax	135.
Styrax tekaucy	306.
Sůl alikantſká lauhowá	69.
Sumach	95.
Swalnjk	41.
Swalnjk králowſký	185.
Swalnjk menſſj	214.

Swal-

Swalnjk prostřednj 272.
Sw. Ducha kořenj 190.
Sw. Jana bylina 253.
Sw. Jana Chleb 343.
Sw. Jana Twař 297.
Sw, Jana wjno černe 59.
Sw. Jana wjno čerwene 58
Swinsky Chleb 43.
Swinský kořen 140. 217.
Swinský wořech 43.

T.

Tabak 53.
Takamahaka gummi 371.
Tamaryndy 20.
Tamarissk 99.
Tekaucy sstyrax 306.
Terpentinowy strom 134.
Thee origentalsky 178.
Tolutsky balsam 133.
Topol 329.
Tragant 243.
Trank angelsky 277.
Trank psaný 346
Trank wysoký 41
Trawa 31.
Trnky 156.
Trnky Egiptske 340.
T ebule 84.
T essně černe 154.
Třewdowa bjla 131.
Tr ene ko enj 167.
Tu ný mužjk menssj 141.
Tu nj mužjk neymenssj 142.
Tu ný mužjk wětssj 150.
Turbit 46.
Twař Sw. Jana 297.
Tykew domacy 319.
Tykwice plana 317.
Tykwice střikawa 317.

W.

Weliky apich 77.
Weronyka 9.

str.
Wětssj konske kopyto 272.
Wětssj kozlik 19.
Wětssj lupen 260.
Wětssj řepjk 260.
Wětssj rozynky 260.
Wětssj skočec 316.
Wět j tu ny mužjk 150.
Wětssj wlasskawičnjk 170.
Wětssj zeměžluč 120.
Wjnne rywj 60.
Wjnny kmen, keř 60.
Wjno plane 184.
Wjno psy 55.
Wjno Sw. Jana černe 59.
Wjno Sw. Jana čerwene 58
Wira mužska 72.
Wlaska gedlice 336.
Wlaska mateřj daussKa 211.
Wlaske riwy kořen 327.
Wlasky kopr 88.
Wlas y ořech 305.
Wlasky přimětnjk 286.
Wlasskawi njk wětssj 170.
Wlas ženský 348.
Wlčj mak 174.
Wlčj pepř polský menssj 117.
Wodnj česnek 193.
Wodnj getel 43.
Wodnj řeřicha 222.
Wolowy gazyk čerwený 42.
Woman 273.
Wonna fiola 289.
Wonne kořenj 120.
Wořech swinský 43.
Wranj oka 116.
Wratič 262.
Wrba 324.
Wrbina brunatna 146.
Wrbinka 11.
Wstwač 236.
Wsta=

	str.
Wstawač kralowsky	292.
Wssecko kořenj	80.
Wssedobr	85.
Wssiwec	184.
Wysoky slez	228.
Wysoky trank	41. 272.

R.

Rwa	191.
Rzop	196.

Z.

Zabjstřewce	44.
Zagečj dětel kysely	142.
Zagičj slez	232.
Zahradnj balssan	200.
Zahradnj kopr	87.
Zahradnj kmjn	186.
Zahradnj slez	231.
Zazwor	1.
Zeměžluč menssj	71.
Zeměžluč wětssj	123.
Ženský wlas	348.
Zežhulka	236.
Žito	29.
Žluta fiola	224.
Žluty Santal neb dřewo	115.
Zrna ragska	3.
Zwoneček čerweny	253.

E r r a t a.

Pag 29.	*lin.* 3	*lege* Secale Ph. Korn, Rocken, Žito.			
— 31.	*loco*	Tŕawa	*lege*	Trawa.	
— 53.	—	Petu	—	Petum.	
— 102.	—	Quilla	—	Squilla.	
— 110.	—	Fichenmistel	—	Eichenmüstel.	
130.	—	exlositis	—	expositis.	
— 142.	—	sezariam	—	sexariam.	
— 151.	—	Pomapran	—	Pomagran.	
— 213.	—	Clamintha montana	*lege*	Calamintha montana.	
— 236.	—	Vstawač	—	Wstawač.	
— 276.	—	Gánswurzel	—	Gámswurzel.	

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Zarda, Adalbert Vincenz,

Pharmaca vegetabilia iuxta pharmacopoeam Austriaco-provincialem

Praga 1782

M.med. 1107 m
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10289230-6
VD18 13144812-002